







د لوړو زده کړو وزارت
روښان د لوړو زده کړو موسسه
معالجوی طب پوهنځی



عضوي کيميا

Organic Chemistry



انجنيير ايميل "فهم"

لمري څپرکي

د عضوی کیمیا بنسټونه

(Fundamentals of Organic Chemistry)

د عضوی کیمیا تاریخي لرلید:

د نړۍ اکثره خلکو د ځینې عضوی مرکباتو لکه قند، نشایستی، الکولو، تیلو، رنګونو، غوړیو او نورو سره د پخوا زمانې څخه اشنایې درلودله چې هغوي یې د طبیعي سرچینو څخه په لاس راوړل خو بیا هم عضوی کیمیا (Organic Chemistry) تر اتلسمې پېړۍ پورې پرمختګ ونه کړ. په شپاړسمه پېړۍ کې بنزویک (Benzoic) تیزاب او سکسینیک (Succinic) تیزاب کشف شول.

په 1675 م کال کې فرانسوي عالم لیمري (Lamery) د لومړي ځل لپاره په خپل مشهور کتاب (Couers de Chymie) کې ټول هغه مواد چې د طبیعي سرچینو څخه لاسته راټلل په درې برخو وویشل:

a. کاني مرکبات (Mineral Compounds)

b. گیایانو مرکبات (Vegetable Compounds)

c. حیواني مرکبات (Animal Compounds)

نوموړې درجه بندي په مرکباتو کې ډیره ژر او په تیزې سره ومنل شوه. فرانسوي عالم لاوازی (Antoine Lavoisier) په 1784 م کال دا وښودله چې ټول هغه مرکبات چې د حیواناتو او نباتاتو څخه لاسته راځي د کاربن او هایدروجن عناصر په خپل ترکیب کې لري او یو زیات شمیر نور مرکبات یې د اکسیجن، نایتروجن، فاسفورس او نور عناصر هم لري.

لیمري د مرکباتو طبقه بندي د منبع په اساس کړې وه چې وروسته دا معلومه شوه چې داسې مرکبات هم شته چې د حیواني او نباتي منابعو څخه لاسته راځي، نو لازمه نده چې حیواني او نباتي مرکبونه په جدا ګروپونو وویشل شي نو ځکه طبیعي مواد (Natural Substances) په دوه ګروپونو وویشل شوه:

الف : عضوی مرکبونه (Organic Compounds):

هغه مرکبات دي چې د حیواناتو او نباتاتو څخه لاسته راځي او یا هغه مرکبات دي چې د ژوندیو موجوداتو (Organism) څخه لاسته راځي.


ب : غیر عضوی مرکبونه یا کاني مواد (Inorganic Compounds):

هغه ټول مرکبات چې د ژوندي موجود څخه لاسته نه راځي د غیر عضوی مرکباتو په نوم یادېږي.

مشهور سویډني کیمیاپوه برزیلیوس (Jons Jakob Berzelius) په 1815 م کال کې په دې عقیده وه چې کوم قوانین او اصول چې دهغې په واسطه عضوی مواد جوړېږي، دهغه قوانینو سره چې دهغې په واسطه غیر عضوی مواد جوړېږي توپیر لري. نوېدې اساس برزیلیوس وویل چې عضوی مرکبونه یواځې د حیاتي قوې (Vital Force) په واسطه منځته راځي او په مصنوعي ډول (Synthesis) نشي جوړېدلي چې دغې نظریې او تیوري د Vital Force Theory یا Vitalism په نوم شهرت وموند، چې کلونه کلونه یې د عضوی کیمیا د پرمختګ او پراختیا مخه ونیوله. له نیکه مرغه په 1828 م کال کې مشهور آلماني کیمیاپوه (Chemist) فریدریک وهلر (Friedrick Wöhler) وکولایي شول چې دامونیم سیانیت څخه چې غیر عضوی مرکب دي دامونیم ایزوسیانیټ (Urea) چې عضوی مرکب دي په لاس راوړي. وهلر نړیوالو ته یې اعلان کړه چې د یو عضوی مرکب د لاسته راوړلو لپاره حیاتي قوه (Vital Force) اړینه نده او کولایي شو چې د غیر عضوی موادو څخه عضوی مواد په لاس راوړو.



Friedrich Wöhler
(1800 - 1882)




امونیم سیانیت

امونیم ایزوسیانیټ (Urea)



فریدریک وهلر (Friedrick Wöhler) د علمي نظريې او تجربې وروسته د برزیلیوس (Berzelius) د Vitalism نظریه رد کړه او له همغه وخته تر نن ورځې پورې عضوی کیمیا په نړۍ کې ځلیدونکي پرمختګ وکړ.

د پورته تعامل په پایله کې په عضوی کیمیا کې یو ستر انقلاب او تحول منځ ته راغی او ټولو کیمیاپوهانو (Chemists) ته لار هواره شوه ترڅو څیړنه وکړي او نور مختلف عضوی مرکبات په لابراتوارونو (Laboratories) کې په لاس راوړي.

وروسته له دې فریدریک وهلر او کولب (Kolbe) الماني کیمیاپوهانو په ګډه په 1838 م کال کې د میتایل سیاناید او پوتاشیم پرمنگیټ (Pottassium per manganet) د تودوخي په نتیجه کې د سرکې تیزاب (Acetic Acid) لاسته راوړل.



همدارنګه په 1856 م کال کې فرانسوي کیمیاپوه برتیلوت (Berthelot) چې د فریدریک وهلر د نظريې څخه یې پیروي وکړه، ویې کولایې شول چې د کاربن سره د هایډروجن له مستقیم ترکیب څخه د میتان (Methane) ګاز د لاندې معادلې سره سم په لاس راوړي.



پورته تجربو ته ورته نورو تجربو پر بنسټ د حیاتي قوي مفکوره رد شوه چې د کیمیا پوهانو لپاره یې د هڅې او لټې لار پرانستله چې په نتیجه کې کیمیا پوهانو د مختلفو عناصرو دیو ځای کیدو څخه مختلف عضوی مرکبونه جوړ کړل او لا هم په دې هڅه کې دي او عضوی

مرکبونه جوړوي چې د دي هڅو په پايله کي نن ورځ دعضوی مرکبونو شمير تقريباً لس گونو ميلونو ته رسېږي.

په 1856 م کال کې William Henry Perkin چې کله د quinine د لاسته راوړلو هڅه کوله، نابېره يې عضوي رنگ هم لاسته راوړ چې د پرکين روښانه ارغواني رنگ Perkin's mauve بلل کېږي. د نوموړي دغه کشف او لاسته راوړنه د عضوي کيميا په برخه کې په زياته کچه محبوبيت پيدا کړ چې د اقتصادي پلوه د پام وړ لاسته راوړنه وه.

په 1858 م کال کې Friedrich August Kekulé او Archibald Scott Couper د کاربن د اتوم د څلورگونو اړيکو د جوړښت نظريه وړاندي کړه، د کاربن سره د نورو اتومونو مشر جوړښت يې وړاندي کړ چې په عضوي کيميا کې يې د پام وړ بدلون او پرمختگ رامنځ ته کړ. کله چې د مصنوعي Indigo (نيل) سنتيز او توليد پراختيا وموندله، د Indigo توليد د نباتي سرچينو څخه منځ په کميدو شو. په 2002 م کال کې د پتروکيمياوي موادو څخه 17000 ټنه مصنوعي Indigo توليد شو.

د درمل جوړونې چارې د نولسمې پېړۍ په وروستي لسيزه کې پيل شوي. د شلمې پېړۍ په پيل کې پوليمېرونه او انزايمنونه د لويو عضوي ماليکولو په بڼه وښودل شول، نفت (petroleum) د بيولوژيکي (Biological) سرچينې په توگه وښودل شول.

د عضوي کيميا تعريف او پېژندنه:

عضوی کيميا هغه علم دي چې د کاربن اود هغه د مرکباتو څخه بحث کوي. عموماً عضوی مرکبات چې د سوزيدو (احتراق) وړ دي د هايډروکاربنونو او د هغوي د مشتقاتو څخه بحث کوي چې د هغوي په ترکيب کې د کاربن او هايډروجن د عناصرو شتون حتمي او بنيادي دي. علاوه پردي په اکثره عضوی مرکباتو کې د نايټروجن او اکسيجن عناصر او په ځينو کې سلفر، هلوجنونه او نور عناصر شتون لري.

د عضوی کیمیا (Organic Chemistry) نوم د نولسمې پیړۍ د پیل څخه راپیدا شوي دي. ځکه کاربن د موادو په جوړښت کې او په غوره توګه د نبات او حیوان د ارګانیزم (Organism) یعنې عضویت غوره برخه جوړوي.

عضوی مرکبات معمولاً د حیواني او نباتي سرچینو څخه او په صنعتي ډول (Synthesis) په لاس راوړل کېږي، د عضوی مرکباتو شمیر چې د نوموړو سرچینو څخه په لاس راځي تراوسه پوري د 57 میلیونو څخه زیات اټکل شوي دي چې د 60% سلنې څخه یې زیات په صنعتي توګه جوړ شوي دي او په کلني ډول نږدې 5% سلنه دغه شمیر ته اضافه کېږي یعنې ویلی شو چې په کلني ډول نیم میلیون مختلف عضوی مرکبونه دغه شمیر ته د کیمیاپوهانو (Chemists) او د نړي د کیمیاوي موسساتو (Chemical Organizations) په واسطه اضافه کېږي او د نړیوالو د ګټې اخیستنې لپاره وړاندي کېږي.

د عضوی مرکبونو د ډیروالي سببونه:

I. د هم ډوله اتومونو (کاربن – کاربن) ترمنځ د اشتراکي اړیکې (C – C) شته والي دي چې په غیر عضوی مرکبونو کې د هم ډوله اتومونو ترمنځ د ډول اړیکو د جوړولو خاصیت نشته، البته په استثنایي ډول په پراکسایدونو یا تیو سلفیتونو کې یواځې د دوو اتومونو اکسیجن (O – O) یا دوه اتومه سلفر (S – S) ترمنځ شته.

II. د ایزومیرونو موجودیت دي چې دا خاصیت هم په غیر عضوی مرکبونو کې نشته. هغه عضوی مرکبونه چې یو شان مالیکولي فورمول او مالیکولي وزن ولري مګر په کیمیاوي او فزیکي خواصو کې توپیر ولري د ایزومیرونو په نوم یادېږي چې دغه پېښه په کیمیا کې د ایزومیري (Isomerism) په نوم یادېږي چې لامل یې په مالیکولونو کې د اتومونو مختلف ترتیب دي.

د پولی میر (Polymer) کیدو توان د ټولو څخه زیات د کاربن په مرکباتو کې شته دي چې د کاربن د پولی میرونو له امله زیات شمیر مرکبات جوړ شوي دي.

همدارنگه په کړيو کي د کاربن د عنصر يو ځاي کيدل په خپلو کي د مرکباتو د ډيرښت لپاره ښه زمينه برابره کړي ده چي دي ټولو دلايلو کاربن ته يو ځانگړي ځاي وربخښلي دي. په عمومي توگه عضوی کيميا دهغه موادو د څيړنو سره اړيکي لري چي په ژوندي موجود کي جوړيږي همدارنگه عضوی ترکيبي مواد دهغه دي چي په طبيعت کي نه موندل کيږي، له نيکه مرغه د عضوی کيميا په پرمختيا سره دا ډول مواد زيات شول.

د عضوی کيميا اهميت (Importance of Organic Chemistry):

په پخوا وختونو کي خلکو په خپل ژوندانه کي د طبيعي عضوی موادو څخه کار اخيستلو، لکه: غذايي توکي، لرگي، کالي، او نور. مگر دغه طبيعي عضوی موادو د ټولو خلکو اړتياوي نه شوي پوره کولی بل داچي د طبيعي عضوی موادو ارزښت زيات وه چي بيا هم ټولو خلکو نشو کولاي چي هغه راويسي، خو له نيکه مرغه داچي په طبيعت کي د عضوی موادو د لاسته راوړلو لاري چاري وموندل شوي له همدې امله د طبيعي شيانو په ځای مصنوعي شيان لکه: تارونه، وري، ورينسم، درمل، رنگونه، گليسروول او شحمي مواد، وازدو څخه مصنوعي ربر د طبيعي ربر په ځای او همدارنگه د لرگو، سکارو او پطروولو د تصفيي لاري چاري او داسي نورې لويي او کوچني صنعتي کيمياوي پروژي رامنځته شوي چي د انسانانو اړتياوي يې تر يوه حده پوره او تامين کړي.

انسانانو د عضوی موادو په پيژندلو کي مهم رول لوبولي چي دخپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره يې نوي شيان جوړ کړل او په په پوره توگه يې د هغوي د توليد لپاره هلې ځلې کړي. که د کيميا علم نه وایې نو د انسانانو ژوند به ډير خراب او ستونزمن حالت کي وو نو د علومو په پرمختگ سره او په ځانگړي توگه د عضوی کيميا په پرمختگ سره د انسانانو د ژوندانه ستونزي په نسبي ډول کمی شوي.

ترڅوچي د نولسمي پيړۍ په نيمايي کي د ډبرو سکاره مهمه ماده وپيژندل شوه چي دهغه د تقطير او چاڼولو په نتيجه کي بنزول او نور اروماتيک مرکبات (Aromatic Compounds) لاسته

راغلل. چې نوموړي مرکبات د رنگونو، درملو، کرنیزو افتونو او ناروغیو ضد درملو کې مهم رول لوبوي.

طبیعی گاز (Natural gas) چې ساده هایډروکاربنونه دي او زیاته برخه یې میتان گاز جوړوي د صنعت په پرمختګ او همدارنګه د انرژۍ په لاسته راوړلو کې مهم رول لري. همدارنګه د کیمیاوي څیړنو او تجربو (Chemical researchs and expermentations) په نتیجه کې هره ورځ نوي مواد لکه نیلوني مواد، مصنوعي رختونه، رنگونه، صابون، پلاستیکونه، مصنوعي ربړ، کیمیاوي منسوجات، ځینی دواګاني لکه انتي بیوتیک (Antibiotics)، انتي سپتیک (Antiseptics) او نور مختلف مواد چې بازار ته وړاندې کېږي د کیمیا د علم محصول دی. چې ددې ټولو اړتیا وړ محصولاتو د لاسته راوړلو لپاره په کیمیاوي ټکنالوژۍ (Chemical Technology) پوهیدل اړین دي.


پخوا ډاکټره ناروغیو تشخیص (Diagnosis of diseases) ناممکن وه او د ناروغیو تداوي (Treatment) په کیمیاوي موادو او بوټو په ساده او ابتدایي شکل کیده چې غالباً دومره ګټوره نه وه مګر اوس د کیمیاوي وسایلو او تجهیزاتو (Chemical equipments) په مرسته د کیمیاوي موادو (Chemical materials) څخه حیرانوونکي درمل او دواګاني جوړېږي، چې زیات شمیر یې د همدې کیمیاوي موادو او بوټو څخه لاسته راځي. په همدې ترتیب په اوسنۍ وخت کې د کیمیاوي موادو او بوټو څخه د حیواني او نباتي ناروغیو د تداوي او کنټرول لپاره اغیزمنې دواګاني او درمل لاسته راغلي دي. د یادونې وړ خبره ده چې د ټولو کیمیاوي سرو استعمال او د نباتي محصولاتو د کچې لوړیدل د کیمیا د علم په ارزښت او اهمیت باندې دلالت کوي.

د کاربن د اټوم مهمې ځانګړتیاوي (Properties of Carbon atom)

لکه څرنګه چې عضوی کیمیا د کاربن مرکبات په مستقل او ځانګړي ډول د بحث او مطالعې لاندې نیسي، لاندې دلایلو پورې اړه لري:


1. کاربن یو فعال عنصر (Active element) دي چي په کیمیاوي تعاملاتو کي برخه اخلي، طبیعت د کاربن د گڼو مرکباتو د جوړولو لپاره گټه اخیستی ده. کاربن د مندلیف د دوراني جدول په څلورم اصلي گروپ، دویم پریود کې ځای لري، چي بل عنصر د هغه موقعیت په جدول کي نشي نیولایي.
2. د کاربن اتوم د بل عنصر سره د تعامل په وخت کي د هایبریدیزیشن (Hybridization) د عملیې په واسطه د هغه د اخی مدار الکترونونه د $(S^2 P^2)$ حالت څخه د (SP) حالت ته فعال کیږي، اود تعامل کوونکي عنصر د وروستي مدار د الکترون سره اشتراکي، کوولانسي اړیکه تشکیلوي. چي دغه حالت یو د کاربن د ځانگړتیاوو څخه دي. د کاربن اتوم الکتروني جوړښت په لاندې ډول دي:

$$C_6 = 1S^2 2S^2 2P^2$$



د الکتروني جوړښت (Electronic Configuration) څخه معلومیږي چي کاربن په نورمال حالت (Ground state) کې په اربیتالونو (Orbits) کې دوه طاقه الکترونونه لري چي دوه اړیکي جوړولي شي خو ددې برعکس کاربن څلور اړیکي جوړوي، چي د کاربن د اخی سویی الکترونونه هایبریدیزیشن کیږي چي په تحریک شوي حالت (Excited state) کې څلور طاقه الکترونونه لري.

$$^*C_6 = 1S^2 2S^1 2P^3$$



3. په الکتروني جوړښت (ارایش) (Electronic Configuration) کي د کاربن د اتوم د کوچنیوالي په وجهه د کاربن اتومونه یو د بل سره اشتراکي اړیکي جوړوي، همدارول

اوږده او کرټیز زنجیرونه (Cyclic Chains) د زیات تعداد زنجیروي یا کرټیزو مرکباتو سره رامنځته کوي. په داسې حال کې چې نور عناصر د یو ځای کیدو دا ډول خاصیت نه لري، له همدې امله د کاربن د مرکباتو تعداد فوق العاده زیات دي.


4. د کاربن عنصر د دریو ایزوتوپونو لرونکي دي چې د (C_{12}, C_{13}, C_{14}) څخه عبارت دي. (C_{12}, C_{13}) دوه ایزوتوپونه یې طبیعي او (C_{14}) ایزوتوپ یې راډیواکتیف (Radioactive) دي چې نوموړي ایزوتوپ د ځمکې د مخ د نباتاتو د عمر د ټاکلو لپاره بهترین معیار دي.

5. د کاربن عنصر د دریو مختلفو شکلونو (Allotropy) لرونکي دي چې د سکارو (Charcoal)، گرافیت (Graphite) او الماس (Diamond) په نوم یادېږي چې له ټولو څخه په زیاته پیمانه گټه اخیستل کېږي. په داسې حال کې چې د نورو عناصرو الوتروپي د کاربن د الوتروپي په اندازه نه دي.

6. کاربن د حیواني او نباتي ژوندیو موجوداتو د جوړښت بنسټیز عنصر بلل کېږي چې د غذایی توکو، طبیعي گاز (Natural Gas)، نفتي موادو، د ځمکې د قشر په ترکیب، همدارنګه صنعتي موادو لکه مختلفو درملو، پلاستيکونو، تعمیراتي رنګونو او منسوجاتو په ترکیب کې د هغه شتون حتمي دي، حتی د کاربن په مرسته بیولوژیکي او کیهاني څېړنې سرته رسیږي، چې د تکنالوژي له پلوه په مختلفو صنایعو کې ځانګړې ځای او اهمیت لري.

7. د کاربن عنصر د نورو عناصرو لکه هایډروجن او اکسیجن سره د ترکیب په نتیجه کې د اشتراکي اړیکو په تشکیل سره د لوي او مشرح زنجیر په توګه کولای شي ایزومیر (Isomere) مرکبات جوړ کړي په داسې حال کې چې د ایزومیري پېښه په غیرعضوی مرکباتو کې شتون نه لري.

8. کاربن د هایبریدزیشن (Hybridization) د خاصیت په نظر، د کاربن یو شمیر اتومونه په طبیعي یا صنعتي توګه کولای شي زیات شمیر مرکبات په لوړ مالیکولي وزن سره د پولیمیر (Polymere) په نوم جوړ کړي لکه پولی ایتلین



- $(C_2H_4)_n$ چي د ايتلين د زيات شمير ماليکولونو د تراکم څخه لاسته راځي. مصنوعي رېږ چي يو پوليمير دي د کلورو پرين په نوم ياديږي. په غير عضوي مرکباتو کي د پوليمير موادو جوړيدل صورت نه نيسي.
9. د کاربن عنصر د قوي ايونايښتن انرژي (Ionization Energy) لرونکي دي.
10. همدارنگه کاربن يو داسې اتوم دي چې په طبيعت کې د ځمکې پر مخ او همدا ډول په ټولو سيارو کې شتون لري لدې څخه معلومېږي چې يواځيني عنصر دي چې په طبيعت کې له نورو څخه ډير دي، د کاربن عنصر نه يواځي دعضوي مرکباتو اساسي رکن دي بلکې د ژوندانه اساسي رکن هم بلل کيږي. همدارنگه له دوه سوو څخه په زياتو منرالونو کې د کاربن اتوم شتون لري چې زياتره يې کاربونيټونه دي.

د عضوي مرکباتو خواص (Chemical properties of organic compounds):

1. د ټولو عضوي مرکباتو په ترکيب کي د کاربن او هايډروجن عناصر په اساسي او بنيادي توگه شتون لري.
2. ټول عضوي مرکبات اشتراکي (کولانسي) اړيکې لري.
3. اکثره عضوي مرکبات په جامد او مايع حالت وي، د جوش او ويلى کيدو ټکي يې ټيټ وي.
4. زياتره عضوي مرکبات غير قطبي دي په اوبو کې نه حل کيږي لکه ډيزل، بنزول، غوړي، موم، گريس او نور. خو ځيني عضوي مرکبات قطبي دي چې په اوبو کې حل کيږي لکه عضوي تيزابونه، ايتايل الکول، قندونه او نور.
5. ټول عضوي مرکبات په غير قطبي محلول کې حل کيږي لکه بنزول، ايتر، تالوين او نور.
6. عضوي مرکبات د تودوخې په وړاندي مقاومت نه لري په کوچنيو کوچنيو ماليکولونو تجزيه کيږي.

7. ټول عضوی مرکبات د سوځیدو وړ دي چې د سوځیدو په نتیجه کې په کاربن ډای اکساید او اوبو تجزیه کیږي.
8. ټول عضوی مرکبات په لوګي لرونکي لمبه باندې سوځیږي.
9. د عضوی مرکباتو تعاملونه په عمومي ډول ورو او بطني وي، کتلست ته اړتیا لري.
10. په عضوی مرکباتو کې د کاربن اتومونه کولای شي په خپلو منځونو کې اړیکې جوړي کړي، یو اوږد ځنځیر یا کړۍ جوړه کړي. چې دغې عملیې ته (Catenation) ویل کیږي.
11. ټولو عضوی مرکباتو کې د کاربن اتوم کولي شي چې په مختلفو طریقو یو د بل سره ونښلي يعني ایزومیري خاصیت لري. چې مالیکولي فورمول یې یو شان او ساختماني فورمول او خواص یې توپیر ولري.
12. د عضوی مرکباتو محلولونه غیر الکترولیت دي يعني د بریښنا هادي نه دي.
13. عضوی مرکبات د بکتریاوو او میکرو ارګانیزمونو (Micro organisms) په واسطه ورستیږي او تجزیه کیږي.
14. په عمومي ډول د عضوی مرکبونو مالیکولي کتلي زیاتي وي.

د عضوی مرکبونو پیژندنه

کله چې عضوی مرکبات لاسته راشي نو د هغوي د پیژندنې لپاره د یو شمیر فزیکي ثبوتونو څخه کار اخیستل کېږي. چې فزیکي مهم ثبوتونه له ویلی کیدو ټکي (m.p)، ایشیدو ټکي (b.p)، کثافت (Density) او داسې نورو څخه عبارت دي. ټول خالص مرکبات د ایشیدو او ویلی کیدو ټاکلي ټکي لري (پدې شرط چې د ویلی کیدو څخه د مخه تجزیه نشي) د موادو خالص والي د ویلی کیدو ټکی ټیټوي او ناخالصو موادو د ویلی کیدو ټکی معلوم نه وي. که چېرې یوې مادې ته ډیره تودوخه ورکړل شي چې د جامد حالت څخه په مایع او د مایع حالت څخه په غاز بدله شي، که چېرې تولید شوي گاز ته زیاته تودوخه ورکړل شي نو د هغه د جوش په نقطه کې د غلطۍ امکانات وي، نو له همدې کبله د موادو په پیژندنه کې د هغوي د جوش په ټکي باندې باور نه کېږي.

ځينې مواد د ویلي کیدو او جوش په وخت کې تخریب او تجزیه کیږي نو د هغوي د پیژندنې لپاره د نورو فزیکي ثبوتونو څخه کار اخستل کیږي لکه کثافت، چې کثافت د دقیق وزن کولو او د حجم د معلومیدو څخه وروسته معلومیږي.


د عضوي مرکباتو تجزیه او انالیز

a. د عناصرو توصیفي پیژندنه:

کله چې یوه ماده (مرکب) په خالصه توګه لاسته راوړو نو کولای شو چې معلومه کړو په هغې کې کوم عناصر شامل دي یعنې توصیفي پیژندنه یې وکړو او دهغې وروسته د هر عنصر د اتمونو تعداد او اندازه معلومه کړو یعنې مقداري پیژندنه یې وکړو چې ددې مرکب په ترکیب کې د هر عنصر څومره اندازه شتون لري.

1- د کاربن تشخیص:

د عضوي مرکب یا موادو د تودولو په نتیجه کې د کاربن عنصر تشخیص کیږي. چې د تودوڅې ورکولو په وخت کې عضوي مرکب په تور رنګه ماده بدلیږي. چې دغه تور رنګه موادو ته سکاره ویل کیږي، چې په مرکب کې د کاربن عنصر په نوم یادېږي. د مثال په ډول سکروز (Saccharose) (بورې) ته په یو لوبني کې تودوڅه ورکوو د تودوڅې په نتیجه کې اوبه ورڅخه جدا کیږي او کاربن د تور رنګي مادې په شکل پاتې کیږي.



ددې تجربې څخه په نوموړي مرکب کې د هایدروجن او اکسیجن تشخیص هم وشو چې په اوبو کې دواړه عناصر شامل دي.


2- د نایتروجن تشخیص:

هغه شمیر عضوي مرکبونه چې د نایتروجن عنصر لري د تودولو په نتیجه کې د کلسیم هایدرو اکساید یا سوډالایم (NaOH + CaO) په ملګرتیا او یوځای والی سره د امونیا مرکب جوړوي چې د خپل ځانګړي بوي له مخې پیژندل کیږي. اویا د امونیا ګاز د اوبو نل ته چې په یو

بيکر کې وي داخلوو چې د اوبو سره د تعامل په نتيجه کې امونيم هايډرو اکسايډ القلی جوړوي. القلی د فينول فتالين په واسطه تشخيص کېږي. (القلی ته سور ګلابي رنګ ورکوي).

3- د هلوځنونه تشخيص:

هلوځنونه په عضوی مرکب کې د سور شوی مسي سيم او د سلور نايتریت په واسطه تشخيص کېږي. اسانه او ساده طريقه د بايل ستين Beil Steine طريقه ده چې په دې طريقه کې سور شوی مسي سيم په عضوی مرکب کې داخلوې که چېرې شين رنګه لمبه رامنځ ته شوه نو هلوځني عناصر پيژندلې شو. پدې برخه کې د هرڅه دمخه عضوی مرکب بايد په ايونیک محلول واړول شي چې دې مقصد ته د رسيدو په منظور عضوی مرکب ته د سوديم کوچنۍ ټوټې سره تر هغه وخته تودوخه ورکړو چې په سره سکروته بدل شي. بيا نوموړی مرکب داوبو په يو لوبني کې اچوو داوبو سره مخلوط کېږي بيا د فلتر (Fillter) د عمليي په مرسته محلول تصفيه کوو. سوچه شوې محلول په درې تست تيوبونو ویشو او په هريو باندې بيلابيلي تجربې سرته رسوو، د محلول په دريمه برخه د بنوري تيزابو په واسطه تيزابي کوو او سلور نايتریت ورعلاوه کوو او د تودوخي ورکولو په نتيجه کې هلوځني رسوبات دخپل ځانګړي رنګ له مخې پيژندل کېږي. چې کېمياوي معادلې يې په لاندې ډول دي.



سپين رسوب



زير ته مايل رسوب



زير رسوب

b. د عضوی مرکبونو مقداري تجزيه:

په عضوی مرکباتو کې د کاربن او هايډروجن مقدار معلومول د Bebig بي بيګ په طريقه دا ډول کېږي چې د عضوی مرکباتو معين مقدار چې مخکې وزن شوي په يوه ځانګړي لوبني کې اکسيجن سره تودوخه ورکول کېږي چې کاربن ډای اکسايډ او اوبه توليدوي. توليد شوی مواد په

جلا جلا ډول د ځانگړو اجسامو په واسطه جذبېږي. د عمليي په پای کې دا احتراق څخه وروسته کاربن ډای اکساید او اوبه چې د اجسامو د سطحي د جذب باعث گرځيدلی وزن کوو، چې د هغوي د مقدار له مخې د کاربن سلنه په کاربن ډای اکساید کې او د هایدروجن سلنې په اوبو کې محاسبه او لاسته راوړل کېږي.

$$H_w = H_2O_w \cdot \frac{2(H_2)}{18(H_2O)}$$

$$H\% = \frac{H_w \cdot 100}{OrganicCompound_w}$$

$$C_w = CO_{2w} \cdot \frac{12(C)}{44(CO_2)}$$

$$C\% = \frac{C_w \cdot 100}{OrganicCompound_w}$$

که چېرې د کاربن او هایدروجن د سلنو مجموعه د سلو سره مساوي نه شي نو د سلنې کومه اندازه چې پاته کېږي هغه به د اکسیجن سلنه وي.

مثال :

یو عضوی مرکب 3,921g دی چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن عناصر په کې شامل دي د سوځیدو په نتیجه کې 10,594g کاربن ډای اکساید او 4,338g اوبه لاسته راغلي دي، د نوموړو عناصرو سلنې په مرکب کې معلومی کړئ او هم د عناصرو جمعي فورمول پیدا کړئ ؟

حل :

$$H_w = H_2O_w \cdot \frac{2(H_2)}{18(H_2O)} \quad H_w = 4,338 \cdot \frac{2(H_2)}{18(H_2O)} = 0,492g$$

$$H\% = \frac{H_w \cdot 100}{OrganicCompound_w} \quad H\% = \frac{0,492g \cdot 100}{3,921g} = 12,29 \quad H\% = 12,29$$

$$C_w = CO_{2w} \cdot \frac{12(C)}{44(CO_2)} \quad C_w = 10,594g \cdot \frac{12(C)}{44(CO_2)} = 2,899g$$

$$C\% = 73,68 \quad C\% = \frac{C_w \cdot 100}{\text{OrganicCompound}_w} \quad C\% = \frac{2,899 \cdot 100}{3,921} = 73,68$$

$$O\% = 100 - (73,68 + 12,29) = 14,03$$

د اټومونو نسبت = اټومي کتله / د عنصر سلنه

$$C \quad 73,69 / 12 = 6,14 / 0,88 = 7$$

$$H \quad 12,29 / 1 = 12,29 / 0,88 = 14$$

$$O \quad 14,03 / 16 = 0,88 / 0,88 = 1$$

د اټومونو نسبت	اټومي وزن	÷	سلنه	عنصر
6.14	12	÷	73.69	C
12.29	1	÷	12.29	H
0.88	16	÷	14.03	O

ددې څخه نتیجه لاسته راځي چې د عناصرو سلنې په اټومي کتله ویشو تر لاسه شوي نسبتونو څخه تر ټولو کوچني نسبت باندې لاسته راغلي نسبتونه تقسیموو چې په نتیجه کې لاندې جمعي فورمول لاس ته راځي:

$$C_7H_{14}O$$

مثال:

که د یوې آزمایش لاندې مادې د کاربن، هایدروجن او نایتروجن د سلنې اندازې د تجزیې له مخې په لاندې ډول وی. $\%C=20$, $\%H=6.7$, $\%N=46.4$ تاسې د اکسیجن سلنه او جمعي فورمول په لاس راوړي؟

ځواب:

$$\%O=26.9 \quad CH_4N_2O$$


په عضوی مرکبونو کې د تعاملاتو ډولونه

(Types of Reactions)

د عضوی مرکبونو د مطالعې په بهیر کې د یو شمیر تعاملونو او د هغوی د میخانیکیتونو سره مخامخ کیږو، باید د هر څه د مخه د هغوی په برخه کې معلومات ولرو ترڅو د کړاونو او ستونزو سره مخ نشو، چې ځینې مهم تعاملونه یې په لاندې ډول دي.



تحمض (Oxidation) تعامل:

په یو عضوی مرکب باندې د اکسیجن نصب کول او یا د هغه څخه د هایډروجن خارجولو ته تحمض وایي. د بیلگې په ډول:




ارجاع (Reduction) تعامل:

دغه تعامل د تحمض معکوس عمل دي یعنې په یو عضوی مرکب باندې د هایډروجن نصبول او یا د هغه څخه د اکسیجن خارجولو ته وایي. د بیلگې په ډول:




احتراق تعامل (Combustion):

هغه تعامل چې په هغه کې تودوخه او رڼا تولیدیږي او د تعامل محصول یې کاربن ډای اکساید او اوبه وي د احتراق یا سون تعامل په نوم یادېږي. د بیلگې په توګه:




اوبول (Hydration):

په یو عضوی مرکب باندې د اوبو مالیکول نصبولو ته هایډریشن وایي، بیلګه:




جمعي تعامل (Addition Reaction):


که چيري دوه عضوی مرکبونه سره اتحاد وکړي او په نتیجه کې یو مالیکول دریمي مرکب جوړ کړي دغه ډول تعامل ته جمعي تعامل وایي. دبیلگي په توګه:

**تعويضي تعاملونه (Substitution Reaction):**


د هغه تعاملونو څخه عبارت دي چې د دوه مرکب جوړونکو عناصرو د جذب د قوي پر بنیاد خپل ځایونه په مرکبونو کې عوض کړي او په نتیجه کې دوه نوي مرکبونه منځ ته راشي د تعويضي تعاملونو په نامه یادېږي. د مثال په توګه:

**د اوبو خارجولو تعامل (Dehydration):**


د اوبه جذبونکي مادي په بنسټ د تعامل د محیط څخه د اوبو د مالیکول خارجولو ته د دي هایدريشن تعامل وایي. د بیلگي په ډول:

**د هایدرولیز تعامل (Hydrolysis Reaction):**

د اوبو د مالیکول په واسطه د یو کیمیاوي مرکب تجزیه کول د هغې په تشکیلونکو اجزاوو چې په خپله اوبه هم تجزیه شي د هایدورلیز په نامه یادېږي. د مثال په ډول:



**تجزیوي تعامل (Decomposition):**

د هغه تعامل څخه عبارت دي چې د هغه په پایله کې یو عضوی مرکب په دوه یا څو برخو ویشل کېږي. د مثال په ډول:



پولي ميرايښن (Polymerization) تعامل:

که چیري د یوشان مرکب څو مالیکولونه سره یو ځای شي او په نتیجه کې یو نوي مرکب جوړ کړي چې دهره اړخه د اولي مرکبونو سره توپیر ولري لاسته راغلي مرکب ته پولي میر (Polymere) او تعامل ته یې پولیمیرایښن وايي. د مثال په ډول:



یا Benzol


دوهم څپرکې

فعال گروپونه يا وظيفوي گروپونه (Functional Groups)

د يو اتوم يا د اتومونو مجموعه ده چې عضوی مرکب ته خاص او ځانگړي خواص ورکوي، يا هغه گروپونه دي چې د عضوی مرکب په ماليکول کې د مشخصو اتومونو څخه جوړ شوي دي او عضوی مرکب ته يې ځانگړي فزيکي او کيمياوي خواص وربخښلي دي د وظيفوي گروپونو په نامه ياديږي.

عضوی مرکبات په لاندې فعالو گروپونو باندې تقسيمولايي شو:

1. **دهالايد وظيفوي گروپ:** چې د عضوی مرکب د کاربن سره د هلوجن اتوم اړيکه لري لکه:




چې دغه گروپ په دوه برخو ويشل کېږي:

a. **الکایل هالايد (Alkyl Halides):**

د عضوی مرکباتو هغه سلسله چې په هغې کې د هلوجن اتوم په مستقيم ډول د الکایل گروپ


سره نښتي وي. لکه:




b. **اريل هالايد (Aryl Halides):**

د عضوی مرکباتو هغه سلسله ده چې په هغې کې د هلوجن اتوم د بنزول د کرۍ سره مستقيماً

نښتي وي. لکه:



Chloro benzene




Chloro toluene


2. هایدروکسیل گروپ (Hydroxyl Groups) (- OH)

داهم د عضوی مرکباتو دوه سلسلې جوړوي.

a. هغه عضوی مرکبات چې د هایدروکسیل گروپ یې د الکیل دځنځیر سره نښتي وي. بیلگه:



b. هغه عضوی مرکبات چې هایدروکسیل گروپ یې د بنزول دکړۍ سره نښتي وي. لکه فینول.




3. کاربونیل گروپ (Carbonyl Group) C = O یا >C=O

دا گروپ هم دوه سلسلې لري:


a. الډهايد گروپ (Aldehyde):

د عضوی مرکباتو هغه سلسله ده چې په هغې کې د کاربونیل گروپ لږ تر لږه یو هایدروجن اتوم سره او بل د الکیل گروپ او یا هایدروجن سره اړیکه ولري. لکه:



b. کیتون گروپ (Ketone):


هغه عضوی مرکبات دي چې په هغې کې هایدروجن اتوم د کاربونیل گروپ د کاربن سره نښتي نه وي بلکې د کاربونیل گروپ د کاربن د دوه نورو کاربنونو سره نښتي وي. لکه:





4. کاربوکسیل گروپ (Carboxyl Groups) (- COOH)


دغه گروپ د کاربونیل او هایدروکسیل گروپونو د ترکیب په نتیجه کې جوړشوي دي. چې د الکایل او اریل گروپونو سره نښتي وي، د نوموړي گروپ مرکبات د عضوی تیزابو په نوم یادېږي. لکه:



Benzoic acid


5. اسید هالاید گروپ (- COX)

که چېرې د کاربوکسیل گروپ OH برخه په هلوجن (X) باندې عوض شي د اسید هالاید په نوم یادېږي.




6. ایستر گروپ (Ester Group) (- COO)

که چېرې کاربوکسیل گروپ کې دهایدروجن اتوم په الکایل گروپ باندې بدل شي نو دایستر گروپ منځته راځي. هغه مرکبات چې یو د ایستر گروپ ولري د ایستر په نوم یادېږي. لکه:




7. اماید گروپ (Amide Group) (- CONH₂)

که چېرې د کاربوکسیل گروپ د OH برخه په په امینو Amino (- NH₂) گروپ باندې بدل شي نو اماید گروپ لاسته راځي. هغه عضوی مرکبات چې په خپل جوړښت کې یو د اماید گروپ ولري د امایدونو په نوم یادېږي. لکه:





8. امینو گروپ (Amino Group) (- NH₂):

د عضوی مرکباتو هغه سلسله چې په هغې کې لږ تر لږه یو د امین گروپ شتون ولري. د بیلگې په توګه:



9. د ایترو گروپ (- O -):

د دوو کاربنونو نښلیدل د اکسیجن سره د ایترو د گروپ په نوم یادېږي. د عضوی مرکباتو هغه سلسله چې د اوکسي گروپ یا د ایترو گروپ په خپل جوړښت کې ولري د ایترو په نوم یادېږي.



په لاندې جدول کې د عضوی مرکباتو د غټو کورنیو وظیفوي گروپ، ایوپاک نوم، معمولي نوم، عمومي فورمول او ساده مثال ترتیب شوی دي.


(1) جدول

Family	Specific example	IUPAC name	Common name	General formula	Functional group
Alkane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_3$	Ethane	Ethane	RH	C - H and C - C bond
Alkene	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	Ethene	Ethylene	$\text{RCH}=\text{CH}_2$ $\text{RCH}=\text{CHR}$ $\text{R}_2\text{C}=\text{CHR}$ $\text{R}_2\text{C}=\text{CR}_2$	
Alkyne	$\text{HC} \equiv \text{CH}$	Ethyne	Acetylene	$\text{CH} \equiv \text{CR}$ $\text{RC} \equiv \text{CR}$	$-\text{C} \equiv \text{C}-$
Aromatic		Benzene	Benzene	$\text{Ar} - \text{H}$	Aromatic ring
Haloalkane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{Cl}$	Chloro ethane	Ethyl Chloride	$\text{R} - \text{X}$	
Alcohol	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	Ethanol	Ethyl Alcohol	$\text{R} - \text{OH}$	
Ether	$\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$	Methoxy Methane	Dimethyl ether	$\text{R} - \text{O} - \text{R}$	
Amin	$\text{CH}_3 - \text{NH}_2$	Methane amine	Methyl amine	$\text{R} - \text{NH}_2$ R_2NH R_3N	
Aldehyde		Ethanal	Acetaldehyde		
Ketone		Propanone	Acetone		
Carboxylic acid		Ethanoic acid	Acetic acid		
Ester		Methyl ethanoate	Methyl acetate		
Amide		Ethan amide	Acetamide	CH_3CONH_2 $\text{CH}_3\text{CONHR}'$ $\text{CH}_3\text{CONR}'\text{R}''$	
Nitrile	$\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{N}:$	Ethane nitrile	Acetonitrile	RCN	$-\text{C} \equiv \text{N}:$

دریم څپرکې

هایدروکاربنونه (Hydrocarbons)

هایدروکاربنونه د هغه مرکباتو څخه عبارت دي چې په خپل ترکیب کې د کاربن او هایدروجن عناصر ولري. یا په بل عبارت هغه مرکبات چې د کاربن او هایدروجن عناصرو څخه تشکیل شوي وي د هایدروکاربنونو په نوم یادېږي، چې په لاندې توګه طبقه بندي کېږي:



هایدروکاربنونه په دوه لویو ګروپونو

ویشل شوي دي:

لومړۍ: الیفاتیک یا ځنځیري هایدروکاربنونه:

په دې مرکباتو کې د کاربن اتومونه یو د بل سره په مستقیم او یا منشعب ډول وصل شوي

دي. الیفاتیک هایدروکاربنونه په دوه برخو ویشل شوي دي:

الیفاتیک مشبوع هایدروکاربنونه او الیفاتیکی غیر مشبوع هایدروکاربنونه.

مشبوع هایدروکاربنونه :

هغه مرکبونه دي چې په هغې کې د ټولو کاربنونو ترمنځ یوگوني اشتراکي اړیکي شتون لري. او د sp^3 هایبریدیزیشن لري. مشبوع هایدروکاربنونو کې د الکانونو یا پارافینونو لویه کورنۍ شامله ده.

الکانونه (Alkanes):

د الکانونو عمومي فورمول C_nH_{2n+2} دی یا د هایدروجن د اتومونو شمیر یې د کاربن دوه چنده جمع دوه.

غیر مشبوع هایدروکاربنونه:

هغه مرکبونه دي چې کاربن اتومونه یې د هایدروجن په واسطه نه وي مشبوع شوي. او په دوه برخو ویشل شوي دي: الکینونه او الکاینونه.

غیر مشبوع هایدروکاربنونه په الکینونو او الکاینونو ویشل کیږي.

الکین یا اولیفین (Alkenes): هغه مشبوع هایدروکاربنونه دي چې دهغوي په مالیکول کې لږ تر لږه یوه دوه گوني رابطه شتون ولري. او عمومي فورمول یې C_nH_{2n} دی.

الکاینونه (Alkynes):

په دې مرکباتو کې یوه درې گوني رابطه شتون لري. عمومي فورمول یې C_nH_{2n-2} دی.

دوهم: کرئیز یا حلقوي هایدروکاربنونه:

کرئیز یا حلقوي هایدروکاربنونه هم په دوه لویو برخو ویشل کیږي.

1. کاربوسایکلیک (Carbocyclic)

2. هتروسایکلیک (Heterocyclic)

کاربوسیکلیک: په مشبوع (الي سایکلیک یا سایکلو الکانونه) او غیر مشبوع (اروماتیک) ویشل کیږي.


1. سایکلو الکانونه (Cyclo Alkanes):

هغه مرکبونه دي چې د کاربن اتومونه یې د کرې په شکل وي او د کاربن اتومونو ترمنځ یې ټولې یوگوني رابطې شتون لري. او عمومي فورمول یې C_nH_{2n} دی.

2. اروماتیک هایډروکاربنونه:

هغه غیر مشبوع هایډروکاربنونه دي چې په هغوي کې لږ تر لږه یوه د بنزول کرې شتون لري او یا هغه مرکبات دی چې دهیوکل (Huckel) قاعده ورباندې تطبیق شي $(4n + 2)$. او په دریو برخو ویشل شوی دي.


1. اروماتیک مرکبات چې د بنزول یوه کرې لری لکه بنزول.
2. اروماتیک مرکبات چې د بنزول دوه یا څو کرې لری لکه نفتالین.
3. اروماتیک مرکبات چې د بنزول څو کرې نه لری لکه سایکلو هپتاتراین.




Benzol




Naphthalene



Anthracene



[14]-annulene
 $4n + 2 = 4(3) + 2 =$
 14π electrons
 aromatic



[18]-annulene
 $4n + 2 = 4(4) + 2 =$
 18π electrons
 aromatic

2. هیتروسایکلیک (Hetrocyclic) مرکبات:

هغه عضوی مرکبات دي چې دهغوي په کړۍ کې نه یوازې د کاربن اتومونه بلکې د نورو عناصرو اتومونه لکه اکسیجن، سلفر، نائتروجن او داسې نور شتون لري. پورته ټولي کورني او د هغوي مرکبات به په تفصیل سره وڅیړو.

په نوم ایښودنه کې مهمي اصطلاح گاني

1. Word Root:

په مورني (Parent) ځنځیر کې د کاربنونو شمیر ته Word Root ویل کېږي. هغه زنځیر چې د کاربن مختلف اتومونه ولري. لاندې Word Root ورته استعمالیږي. جدول (2):

Word Root	د کاربنونو شمیر	Word Root	د کاربنونو شمیر
Henicos	C ₂₁	Meth	C ₁
Doicos	C ₂₂	Eth	C ₂
Tricont	C ₃₀	Prop	C ₃
Hentriacont	C ₃₁	But	C ₄
Dotriacont	C ₃₂	Pent	C ₅
Trtriacont	C ₃₃	Hex	C ₆
Tetracont	C ₄₀	Hept	C ₇
Pentacont	C ₅₀	Oct	C ₈
Hexacont	C ₆₀	Non	C ₉
Heptacont	C ₇₀	Dec	C ₁₀
Octacont	C ₈₀	Undec or Hendic	C ₁₁
Nonacont	C ₉₀	Do dec	C ₁₂
Hectane	C ₁₀₀	Tri dec	C ₁₃
Methahectane	C ₁₀₁	Ieicos	C ₂₀

2. اولنی ورستاری (Primary Suffix):

د کاربن په زنځیر کې د مشبوع او غیرمشبوع والي لپاره استعمالیږي، کله چې نوم لیکل کېږي نو اولني ورستاری (Primary Suffix) د Word Root سره یوځای کېږي، لکه په لاندې جدول کې: جدول (3)

د کاربن زنځیر ډول	د اړیکې ډول	د اړیکو شمیر	Primary Suffix
مشبوع	یوه گونی	یوه	Ane
غیرمشبوع	دوه گوني	یوه	Ene
	دوه گوني	دوه	Adiene
	دوه گوني	دری	Atriene
	دری گوني	یوه	Yne
	دری گوني	دوه	Adiyne

3. دویمې ورستاری (Secondary Suffix):

دویمې ورستاری په عضوی مرکباتو کې د فعال گروپ (وظیفوي گروپ) څخه نمایندګي کوي. دا د اولني ورستاري سره یوځای کېږي کله چې اولني ورستاري څخه د (e) توري وغورځول شي. دویمې ورستاري د مختلفو فعال گروپونو لپاره په لاندې ډول دی. جدول (4):

ایوپاک نوم	دویمې ورستاری	فعال گروپ	عمومي فورمول	د عضوی مرکب ډول
Alkanol	Ol	-OH	R – OH	Alcohols
Alkane thiol	Thiol	-SH	R – SH	Thioalcohols
Alkanamine	Amine	– NH ₂	R – NH ₂	Amines
Alkanal	Al	– CHO	R – CHO	Aldehydes
Alkanone	One	– CO -	R – COR	Ketones
Alkanoic acid	Oic acid	– COOH	R – COOH	Carboxylic acids
Alkanylchloride	Oyl chlorides	– COCl	R – COCl	Acid chlorides
Alkyl alknoate	Oate	– COOR	R – COOR	Ester
Alkanamids	Amide	– CONH ₂	R – CONH ₂	Amides
Alkane nitrile	Nitrile	– CN	R – CN	Nitriles

که چېرې دویمې ورستارې په Consonant توری شروع شوی وي نو بیا د (e) توری داوونکی ورستارې څخه نه غورځول کېږي. او همدارنگه په هغه وخت کې د (e) توری هیڅ کله نه غورځول کېږي چې د دویمې ورستارې څخه مخکې د Di ، Tri او نور هندسي ورستارې استعمال شوي وي.

4. مختارې (Prefix):

د نوم هغه برخه چې د Word Root څخه مخکې راځي د مختارې په نوم یادېږي. عموماً مختارې د الکیل گروپ، فعال گروپونو د نومونو څخه نمایندګي کوي چې په لاندې ډول پرې رڼا اچوو.

a. الکیل گروپ:

کله چې یو هایډروجن د هایډروکاربن څخه لرې کړئ نو الکیل گروپ منځ ته راځي، او په R باندې ښودل کېږي. مثال په توګه:

جدول (5):

Alkane الکان	Alkyl group الکیل گروپ	prefix مختارې
CH ₄	CH ₃	Methyl
C ₂ H ₆	C ₂ H ₅	Ethyl
C ₃ H ₈	C ₃ H ₇	n- propyl
	H ₃ C-CH-CH ₃	Iso propyl
C ₄ H ₁₀	H ₃ C-CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -	n- butyl
	H ₃ C-CH ₂ -CH -CH ₃	Sec-butyl
	H ₃ C-CH -CH ₂ -	Isobutyl

b. ځينی فعال گروپونه (Some Functional group):

ځينی فعال گروپونه هميشه په مختاري کې بنودل کېږي. مثال په توگه:

جدول (6):

ايوپاک نوم	فاميل يا کورنۍ	مختاری	فعال گروپ
Nitroalkane	R – NO ₂	Nitro	-NO ₂
Alkoxyalkane	R – OR	Alkoxy	-OR
Chloroalkane	R – Cl	Chloro	-Cl
Bromoalkane	R – Br	Bromo	-Br
Iodoalkane	R – I	Iodo	-I
Floroalkane	R – F	Floro	-F
Nitrosoalkane	R – NO	Nitroso	-NO

c. مختاري په ډيرو فعالو گروپونو کې:

هغه مرکبات چې مختلف فعال گروپونه لري د پولی فنکشل (Poly Functional) مرکباتو په نوم ياديږي، چې په دغه مرکباتو کې يو اصلي فعال گروپ گڼل کېږي او نور فعال گروپونه د هغه مرکب برخه يا معوضونه گڼل کېږي او په مختاري سره بنودل کېږي. په پولی فنکشنل مرکب کې د فعال گروپونو لپاره مختاري: جدول (7):

مختاری Prefix	فعال گروپ Functional group	مختاری Prefix	فعال گروپ Functional group
Amino	-NH ₂	Hydroxy	-OH
Imino	-NH	Cyano	-CN
Alkylthio	-SR	Isocyano	-NC
Keto or Oxo	-CO -	Formyl	-CHO
Carboxy	-COOH	Marcapto	-SH
Carbamyl	-CONH ₂	Carbaloxy	-COOR

ایوپاک نوم ایښودنه (IUPAC Nomenclature)


د سویزرلینډ (Switzerland) د جینوا (Geneva) په ښار کې په ۱۸۹۲م کال کې د نړۍ کیمیا پوهان سره راټول شول او د عضوی مرکباتو د نوم ایښودنې لپاره یې ځانگړي اصول او پرنسپونه وړاندې کړل.

دوي د ایوپاک (IUPAC) یا (International Union of Pure and Applied Chemistry) (د خالصي او تطبیقي کیمیا نړیواله ټولنه) په نوم ټولنه رامنځ ته کړه، چې تر نن ورځې پورې ورڅخه گټه اخیستل کیږي. ایوپاک نوم ایښودنه دلاندې برخو څخه جوړه شوی ده:

Prefix + Word Root + Primary Suffix + Secondary Suffix

یا مختارې + مورنۍ ځنځیر + اولنۍ ورستارې + دویمۍ ورستارې

د مثال په توگه:



3-Methyl Pentanoic acid


Methyl	Pent	an	oic acid
Prefix	Word Root	Primary Suffix	Secondary Suffix

یادونه: ځینی وخت د عضوی مرکب په نوم کې مختارې یا دویمۍ ورستارې نه وي خو همیشه په کې Word Root او اولنۍ ورستارې وي د مثال په توگه په نارمل هایډروکاربنونو کې:



حسابی مختارې (Numerical): حسابی مختارې همیشه دمختارو (Prefixes) او د

ثانوي ورستارو څخه مخکې استعمالیږي. د مثال په توگه: Di, Tri, Tetra او داسې نور.



2,3- Di methyl butanoic acid


Di	methyl	but	an	oic acid
Numerical Prefix	Prefix	Word Root	Primary Suffix	Secondary Suffix

کله چې د ثانوي ورستاري څخه مخکې حسابي مختاري يوځاي کېږي نو د ابتدايي ورستاري څخه د (e) توري نه غورځول کېږي.


خلورم خپرکې

ایزومیرونه (Isomerism)

هغه عضوی مرکبونه چې مالیکولي فورمول یې یو شان او ساختماني او فضايي جوړښت، فزیکي او کیمیاوي خواص یې سره توپیر ولري، یو د بل ایزومیر بلل کېږي. او دی پدیدي ته ایزومیریزم (Isomerism) وايي. لکه د (C_4H_{10}) دوه ډوله مرکبونه دي چې یو یې نارمل بیوتان او بل یې ایزو بیوتان دی. او (C_2H_6O) دوه ډوله ایزومیرونه لري چې یو یې ایتانول او دویم یې ډای میتایل ایتردی.




Normal butane




Iso butane

Ethyl alcohol



Ethyl alcohol

Dimethyl ether



Dimethyl ether

د پورته دوو مرکبونو توپیر په لاندې جدول کې ښودل شوي دي.

جدول (8):

Properties of Ethyl alcohol and Di methyl Ether

	Ethyl alcohol C_2H_6O	Di methyl Ether C_2H_6O
Boiling point, °C	78.5	- 24.9
Melting point, °C	- 117.3	- 138
Reaction with Sodium	Displaces Hydrogen	No reaction

د ایزومیرونو شمیر د کاربن د شمیر په زیاتوالي سره زیاتېږي لکه په لاندې جدول کې:

جدول (9):

Straight-Chain Alkanes

Number of C atoms	Molecular formula	Name (<i>n</i> -alkane)	Number of constitutional isomers
1	CH_4	methane	—
2	C_2H_6	ethane	—
3	C_3H_8	propane	—
4	C_4H_{10}	butane	2
5	C_5H_{12}	pentane	3
6	C_6H_{14}	hexane	5
7	C_7H_{16}	heptane	9
8	C_8H_{18}	octane	18
9	C_9H_{20}	nonane	35
10	$C_{10}H_{22}$	decane	75
20	$C_{20}H_{42}$	eicosane	366,319


په لاندې جدول کې د هگزان پنځه ایزومیرونو، ساختماني فورمولونه او ځینې فزیکي خواص ښودل شوي دي.

جدول (10)

Physical Constants of the Hexane Isomers

Molecular Formula	Structural Formula	mp (°C)	bp (°C) ^a (1 atm)	Density ^b (g mL ⁻¹)	Index of Refraction ^a (n _D 20 °C)
C ₆ H ₁₄	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	-95	68.7	0.6594 ²⁰	1.3748
C ₆ H ₁₄	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-153.7	60.3	0.6532 ²⁰	1.3714
C ₆ H ₁₄	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHCH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-118	63.3	0.6643 ²⁰	1.3765
C ₆ H ₁₄	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}-\text{CHCH}_3 \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C} \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-128.8	58	0.6616 ²⁰	1.3750
C ₆ H ₁₄	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-98	49.7	0.6492 ²⁰	1.3688

د ايزوميرونو ډولونه (Types of Isomerism):



ایزومیرونه په دوه برخو ویشل شوي دي:

1. ساختماني ایزومیرونه

2. ستیرو ایزومیرونه

1- ساختماني ایزومیرونه (Structural isomerism):


کله چې د یو مرکب مالیکولي فورمول یو شان او په جوړښت کې یو بل سره توپیر ولري د ساختماني ایزومیرونو په نوم یادېږي.

ساختماني ایزومیرونه په پنځه ډوله دي:


1. زنځیري ایزومیرونه (Chain isomerism):



که چیرې مختلف مرکبات یو شان مالیکولي فورمول او د یوې کورنې څخه هم وي خو د کاربن د ځنځیر ساختمان یې مختلف وي د زنځیري ایزومیری په نوم یادېږي. لکه:

2 Isomers of C_4H_{10}







The Three Isomers of Pentane, C_5H_{12}









2. پوزیشن ایزومیری (Position isomerism):


هغه مرکبات چې یو ډول هومولوگ سلسلې پورې اړه ولري خو د وظیفوي گروپونو موقیعت یې سره بدل وي. د Position ایزومیری په نوم یادېږي. لکه:



3. وظیفوي ایزومیری (Functional):

په دې ایزومیری کې مالیکولي فورمولونه یوشان وي خو وظیفوي گروپونه سره توپیر لري. لکه:





4. میتامیری ایزومیری (Methamerism):

په دې ایزومیری کې مالیکولي فورمول یو شان وي او یو هومولوگ سلسلي پورې هم اړه لري خو د الکیل گروپونو شمیر یې د مرکزي اتوم گرد چاپیره مختلف وي. لکه:



Methyl propyl Ether

Di ethyl Ether

5. تاتومیری ایزومیری (Tautomerism):

دغه ایزومیری په هغه مرکباتو کې لیدل کیږي چې ساختمان یې د اتومونو له کبله مختلف وي یعنې اتومونه یې په یو مرکب کې د یو ځای څخه بل ځای ته تغیر کوي. لکه:



2- سټیریو ایزومیری (Stereo Isomerism)


هغه مرکبات چې مالیکولي فورمولونه یې یو شان او فضا یې جوړښت یې یو بل سره توپیر ولري د سټیریو ایزومیری په نوم یادېږي. چې په دوه ډوله ده:

1. کنفرمیشن (Conformation)


2. کنفیگوریشن (Configuration)

1. کنفرمیشن ایزومیری (Conformation Isomerism):

هغه ایزومیری ده چې مالیکولي فورمول یې یوشان وي او د $C - C$ اړیکه باندې د الکیل گروپونو او اتومونو نظم او ترتیب د دوراني حرکت په نتیجه کې تغیر کوي، د کنفرمیشن ایزومیری په نوم یادېږي چې دغه ډول ایزومیری ته دوراني ایزومیری (Rotation isomerism) هم وایي.




لکه:



ددې دواړو ایزومیرونو توپیر 12kJ/mol دی. په لاندې گراف کې دانرژی توپیر ښودل شوی دی.

گراف(1):

Conformations is 12 kJ mol^{-1} ($2.87 \text{ kcal mol}^{-1}$)




2. کنفیگوریشن ایزومیری (Configuration):

دغه ایزومیر په فضا یې شکل او بڼه کې یو بل سره توپیر لري، مالیکولي فورمول یې یوشان وي. او په دوه ډوله دي: اپتیکل (Optical) او جیومیټریکل (Geometrical).

a. اپتیکل (Optical):

په دې ایزومیری کې هم مالیکولي فورمولونه یوشان وي خو د (OH) گروپونو موقعیت یې په مالیکولونو کې ښي او کیڼ لوري ته یو بل سره توپیر لري، چې نور چپ او ښي لوري ته انعکاس ورکوي. په همدې اساس ورته Optical ایزومیری وايي. لکه:



b. جیومیتریکل (هندسی) ایزومیری (Geometrical isomerism):


دغه ایزومیری هم د فضایی ایزومیری له جملې څخه دي چې د Cis او Trans په نوم سره یادېږي.

سیس (Cis) ایزومیری:


که چېرې په یو مالیکول کې یو طرف ته یو شان بقیې یا معوضونه شتون ولري د Cis ایزومیری په نوم یادېږي.

ترانس (Trans) ایزومیری:


که چېرې په عضوی مرکب کې مخالف طرف ته یو شان بقیې شتون ولري د Trans ایزومیری په نوم یادېږي. لکه:




cis-2-Butene
bp +4 °C




trans-2-Butene
bp +1 °C



Cis - 2 - Butene



Trans - 2 - Butene





د ځينو عضوی مرکبونو د Cis او Trans د حالتونو فزیکي خواص:
جدول (11):

Physical Properties of Some *Cis-Trans* Isomers


Compound	Melting Point (°C)	Boiling Point (°C)	Dipole Moment (D)
<i>Cis</i> -1,2-Dichloroethene	-80	60	1.90
<i>Trans</i> -1,2-Dichloroethene	-50	48	0
<i>Cis</i> -1,2-Dibromoethene	-53	112.5	1.35
<i>Trans</i> -1,2-Dibromoethene	-6	108	0

د سایکلو هگزان مرکب د Cis او Trans حالتونو ځینې بیلگې:







cis-1,3-Dimethylcyclohexane



trans-1,3-Dimethylcyclohexane



cis-1,4-Dimethylcyclohexane



trans-1,4-Dimethylcyclohexane

څلورم څپرکي

مضبوع هايډروکاربنونه

الکانونه يا پارافين (Alkanes or paraffin's)

الکانونه مضبوع هايډروکاربنونه دي چې دهغوي دکاربن اتومونو ترمنځ يوگوني اشتراکي اړيکه (Single Covalents bond) شتون لري.

الکانونه د پارافين (Para = Little Affine= affinity) په نامه ياديږي چې لږ ميل لرونکي معنی لري. پارافين د دوه يوناني کلیمو Parum او Offiens څخه اخيستل شوي ده چې معني يې کم فعالیت دي، ځکه پارافينونه په کيمياوي تعاملاتو کې کمه برخه اخلي.

د الکانونو عمومي فورمول (C_nH_{2n+2}) دی چې په دې فورمول کې (n) توري دکاربن داتومونو شمير نښي. که چيرې $n=1$ وي نو کاربن يو اتوم او هايډروجن څلور اتومه دی او څلور اشتراکي اړيکي جوړوي. چې په لاندې ډول د اړونده الکانونو فورمولونه ليکلايې شو؛ جدول (12):

n = 1	n = 2	n = 3	
C_nH_{2n+2}	C_nH_{2n+2}	C_nH_{2n+2}	C_nH_{2n+2}
$C_1H_{2.1+2}$	$C_2H_{2.2+2}$	$C_3H_{2.3+2}$	$C_4H_{2.4+2}$
C_1H_{2+2}	C_2H_{4+2}	C_3H_{6+2}	C_4H_{8+2}
CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}
Methane	Ethane	Propane	Butane

د الکانونو ټول مرکبات مضبوع دی، ټول يوه گوني اشتراکي اړيکه لري ددی مرکباتو نوم د (ane) ورستارې پای ته رسيږي.

څرنگه چې مخکې اشاره وشوه د کاربن هر اتوم په دي ډول هايډروکاربنونو کې د څلورو يوگونو اشتراکي اړيکو لرونکي دي چې په ټوليزه توگه په الکانونو کې د يوگونو اشتراکي اړيکو شمير $(3n + 1)$ دي.

يوگوني اشتراکي اړيکې چې د کاربن د اتومونو په منځ کې د الکترونونو د يو ځاي کيدو څخه منځ ته راځي د سيگما (Segma) (δ) اړيکي په نوم ياديږي او هغه الکترونونه چې دا ډول اړيکي جوړوي د سيگما الکترونونو (Segma Electron) په نوم ياديږي.

په الکانونو کې د کاربن د عنصر د اریټالونو هایبریدزیشن (Hybridization) د (sp^3) له ډول څخه دي.

د دې کورنۍ لومړي څلور مرکبونه (میتان، ایتان، پروپان او بیوتان) په عادي تودوخه کې د غاز په حالت او د پنتان څخه تر هگزا دیکان (C_{16}) پورې په مایع حالت او د دې څخه پورته په جامد حالت موندل کیږي.

په لاندې جدول کې د الکانونو نومونه، مالیکولي فورمول او د کاربن شمیر ښودل شوی دی:

جدول (13):

The Unbranched Alkanes

Number of Carbons (n)	Name	Formula (C_nH_{2n+2})	Number of Carbons (n)	Name	Formula (C_nH_{2n+2})
1	Methane	CH_4	17	Heptadecane	$C_{17}H_{36}$
2	Ethane	C_2H_6	18	Octadecane	$C_{18}H_{38}$
3	Propane	C_3H_8	19	Nonadecane	$C_{19}H_{40}$
4	Butane	C_4H_{10}	20	Eicosane	$C_{20}H_{42}$
5	Pentane	C_5H_{12}	21	Henicosane	$C_{21}H_{44}$
6	Hexane	C_6H_{14}	22	Docosane	$C_{22}H_{46}$
7	Heptane	C_7H_{16}	23	Tricosane	$C_{23}H_{48}$
8	Octane	C_8H_{18}	30	Triacontane	$C_{30}H_{62}$
9	Nonane	C_9H_{20}	31	Hentriacontane	$C_{30}H_{62}$
10	Decane	$C_{10}H_{22}$	40	Tetracontane	$C_{40}H_{82}$
11	Undecane	$C_{11}H_{24}$	50	Pentacontane	$C_{50}H_{102}$
12	Dodecane	$C_{12}H_{26}$	60	Hexacontane	$C_{60}H_{122}$
13	Tridecane	$C_{13}H_{28}$	70	Heptacontane	$C_{70}H_{142}$
14	Tetradecane	$C_{14}H_{30}$	80	Octacontane	$C_{80}H_{162}$
15	Pentadecane	$C_{15}H_{32}$	90	Nonacontane	$C_{90}H_{182}$
16	Hexadecane	$C_{16}H_{34}$	100	Hectane	$C_{100}H_{202}$

د فورمولونو بڼې (Structure of Formula's):

په عضوی کیمیا کې څلور ډوله فورمولونو څخه گټه اخیستل کیږي.


1. مالیکولي فورمول.
 2. نیمه مشرح (ساختماني) فورمول.
 3. مشرح یا ساختماني فورمول (د کیکولي جوړښت).
 4. الکتروني یا د Lewis جوړښت.
- د پورته فورمولونو له جملې څخه مشرح او نیمه مشرح فورمول ډیر کارول کیږي.

Electron-dot structures (Lewis structures)				
Line-bond structures (Kekulé structures)				
Structural Formula	Methane (CH ₄)	Ammonia (NH ₃)	Water (H ₂ O)	Methanol (CH ₃ OH)

هومولوگ سلسله (Homolog Series):

هغه مرکبونه چې د یو بل سره د یو میتلین (-CH₂-) په اندازه توپیر ولري د هومولوگ سلسلې په نوم یادېږي. لکه:

د میتان او ایتان ترمنځ -CH₂- توپیر دي.





د همولوگ سلسلې خواص (Properties of Homolog Series):

1. هره یوه همولوگ سلسله په عمومي فورمول ښودل کېږي. لکه الکان سلسلې عمومي فورمول C_nH_{2n+2} دی.
2. د همولوگ سلسلې مرکبات یو د بل سره د یو میتلین ګروپ په اندازه توپیر لري.
3. د همولوگ سلسله کې فزیکي خواص په تدریجي ډول سره تغیر کوي. لکه د جوش ټکی، ویلی کیدو ټکی، کثافتونه او نور.
4. د همولوگ سلسلې د ټولو مرکباتو کیمیاوي خواص یو ډول وي. لکه د الکان دکورنۍ ټول مرکبونه په هوا کې سوځي کاربن ډای اکساید، اوبه او انرژي تولیدوي.
5. د یوې همولوگ سلسلې ټول مرکبات په عمومي میتود باندې استحصالېږي.
6. د یوې همولوگ سلسلې ټول مرکبات یو ډول وظیفوي ګروپ لري.




الکایل ګروپ (Alkyl Group):

که د الکان د مرکباتو د یو مالیکول څخه یو هایډروجن کم شي نوموړی ګروپ د الکایل په نوم یادېږي. د بیلګې په ډول:



د الکایل ګروپونو عمومي هومولوگ فورمول (C_nH_{2n+1}) (الکان په سلسله کې) دی او په (R) توري سره ښودل کېږي.

د الکایل ګروپ نوم ایښودنه کې د (ane) وروستاړي په (yl) وروستاړي سره تعویض کېږي. او په پایله کې اړونده الکایل ګروپ لاسته راځي.



په لاندې جدول کې د الکایل گروپونو څو بیلگې د نومونو سره ترتیب شوی دي.
جدول (14):

Alkyl groups: - ane $\implies$ - yl (alkane $\implies$ alkyl)


Alkane		Alkyl Group	Abbreviation
CH ₃ – H Methane	become	CH ₃ – Methyl	Me –
CH ₃ - CH ₂ – H Ethane	become	CH ₃ - CH ₂ – Ethyl	Et –
CH ₃ - CH ₂ - CH ₂ – H Propane	become	CH ₃ - CH ₂ - CH ₂ – Propyl	Pr –
CH ₃ - CH ₂ - CH ₂ - CH ₂ – H Butane	become	CH ₃ - CH ₂ - CH ₂ – Butyl	Pr –

د راډیکالونو ډولونه (Types of Radical's):

د راډیکالونو ډولونه هغه کاربن پوري اړه لري چې د یو الکتروني اربیتال لرونکي وي. په همدې بنسټ درې ډوله راډیکالونه د تشخیص وړ دي.

1. اول ډول راډیکال (Primary Radical):


د دغه ډول راډیکال یو الکتروني کاربن پوري دوه اتومه هایډروجن او یو (CH₃ -) راډیکال تړلي وي چې د Ethyl په نوم یادېږي.



2. دوهم ډول راډیکال (Secondary Radical):

د دې ډول راډیکال یو الکتروني کاربن پوري یو اتوم هایډروجن او دوه (CH₃ -) راډیکالونه تړلي وي چې د Iso Propyl په نوم یادېږي.

3. **دریم ډول راډیکال (Tertiary Radical):** د دغه ډول راډیکال یو الکتروني کاربن پوري دري د $(\text{CH}_3 -)$ راډیکالونه تړلي وي چي د Iso Butyl په نوم ياديږي.




فعاليت او ځواکمني (Activity and Stability):

نوموړي راډیکالونه په کيمياوي تعاملاتو کي يود بل سره توپير لري، په دي توگه چي د مقاومت او ځواک له نظره ؛ دریم ډول راډیکال د دوهم ډول راډیکال څخه او دواړه له اول ډول راډیکال څخه قوي او ځواکمن دي. د دي راډیکالونو فعاليت په کيمياوي تعاملاتو کي د گډون له نظره کم دي له دي امله اول ډول راډیکال د دوهم ډول راډیکال څخه او دوهم ډول راډیکال د دریم ډول راډیکال څخه ډیر فعال (Active) دي.


په الکانونو کي د کاربن ډولونه (Types of Carbon atom):

د الکانونو په شرح فورمول کي څلور ډوله کاربن د تشخیص وړ دي:

1. **اول ډول (نوع) کاربن (Primary Carbon):** که چيري د یو الکان په شرح فورمول کي د کاربن اتوم د اشتراکي اړیکي په واسطه د یو کاربن سره وصل وي او دري نوري اړیکي یې د نورو عناصرو لکه هایډروجن سره تړلي وي د اول کاربن په نوم ياديږي بیلگه:




2. **دوهم ډول (نوع) کاربن (Secondary Carbon):** هغه کاربن چې د یو الکان په مشرح فورمول کې د کاربن د دوه اتومونو سره د اشتراکي اړیکو په واسطه وصل شوي وي او دوه نوري اړیکې یې د نورو عناصرو لکه هایدروجن سره تړلي وي د دوهمي کاربن په نوم یادېږي. بیلگه:




Propane

3. **دریم ډول (نوع) کاربن (Tertiary Carbon):** هغه کاربن چې د یو الکان په مشرح فورمول کې د کاربن د دریو اتومونو سره د اشتراکي اړیکو په واسطه وصل شوي وي او یوه اړیکه یې د بل عنصر یا هایدروجن سره وصل وي د دریمي کاربن په نوم یادېږي. بیلگه:



Iso Butane


4. **څلورم ډول (نوع) کاربن (Quarternary Carbon):** که چېرې د یو الکان په مشرح فورمول کې د کاربن اتوم د څلورو کاربنونو سره د اشتراکي اړیکو په واسطه وصل شوي وي د څلورمي کاربن په نوم یادېږي. بیلگه:




Neo Pentane

لنډيز:

Classification of Carbon Atoms



د کاربن اولی، دوهمی، دریمې او څلورمې حالتونه په لاندې یوه بیلگه کې ښودل شوي.



د الکانونو نوم ایښودنه (Nomenclature of Alkane Series):

عضوی مرکبات د ایوپاک نوم ایښودنې په اساس نومول کېږي خو ځینې مشهور مرکبات د ایوپاک نوم ایښودنې ترڅنګ دمعمولي نوم ایښودنې په واسطه هم نامگذاری کېږي، د دې تر څنګ د منطقي طریقې څخه هم ګټه اخیستل کېږي. الکانونه په لاندې درېو طریقو نومول کېږي:

I. عمومي نوم ایښودنه (Common Nomenclature):

په دغه طریقه کې د الکانونو نوم ایښودنه د (-ne) د وروستاړي په علاوه کولو سره د لاتیني عدد په پای کې صورت نیسي. د لاندې جدول مطابق:


جدول (15):

لاتيني عدد	د الکان نوم (لاتين عدد + ne)	لاتيني عدد	د الکان نوم (لاتين عدد + ne)
Metha	Metha – ne	Hexa	Hexa – ne
Etha	Etha – ne	Hepta	Hepta – ne
Propa	Propa – ne	Octa	Octa – ne
Buta	Buta – ne	Nona	Nona – ne
Penta	Penta – ne	Deca	Deca – ne

II. الکانونو معمولي نوم ايښودنه (Ordinary Nomenclature):

په معمولي نوم ايښودنه کې د الکانونو مختلف ساختماني ايزومرونه په نظر کې نيول کېږي او د هغوي لپاره د نارمل (n)، ايزو (iso) او نيو (neo) مختاري کيښودل کيږي.


په نارمل الکان n-Alkane کې د کاربن اتومونه مستقيم زنځيري جوړښت لري.



Normal Ethane (n-Ethane)



Normal Propane (n-Propane)



Normal Butane (n-Butane)


د منشعب او ښاخ لرونکو الکانونو د نوم ايښودنې لپاره په معمولي توګه د (Neo, Iso)

مختاري کارول کيږي.


په ايزو الکان کې د کاربن اتومونه منشعب جوړښت لري.

په نيو الکان کې د کاربن په ځنځير کې لومړي کاربن درې ميتايل گروپونه لري.


پورته حالتونه په لاندي بيلګو کې د هغوي د موډلونو (Models) سره ګوري.




Isobutane



Isopentane



Neopentane



III. د IUPAC په لاره د الکانونو نوم ایښودنه:

د نړۍ اکثره کیمیا پوهان په 1892م کال کې د سویزرلینډ (Switzerland) د جینوا (Geneva) په ښار کې سره راټول شول او د لمړي ځل لپاره یې د هایډروکاربنونو د نوم ایښودنې لپاره نظریات او پیشنهادونه وړاندې کړل چې په څو کالونو کې تر غور لاندې ونيول شول. بالاخره په 1958 م کال د سوچه او تطبیقي کیمیا نړیواله ټولنې (IUPAC) یا (International Union of Pure and Applied Chemistry) له خوا د عضوی مرکباتو لپاره بنسټیز اصول او قوانین تصویب شول، چې تر نن ورځې پورې له هغوي څخه ګټه اخیستل کېږي.


د ایوپاک نوم ایښودنې لپاره لاندې اصول او قواعد باید په نظر کې ونيول شي:

1، لمړي د مرکب اوږد ځنځیر (اصلي ځنځیر) ټاکل کېږي.


د هایډروکاربن هغه ځنځیر چې تر ټولو اوږد وي یا فعال ګروپ ولري او زیات نه زیات یوه څوګونی (دوه ګوني او درې ګوني) اړیکه ولري، انتخابیږي او دغې ځنځیر ته مورنۍ ځنځیر (Parent Chain) ویل کېږي.

2، د مورنۍ ځنځیر یا اوږد ځنځیر د انتخاب وروسته په هغه باندې شماره لیکل کېږي.


که معوض ولري شماره دهغه طرف څخه پیل کېږي کوم طرف ته چې معوض نږدې وي.




3) که چیرې یو معوض دوه یا خوځلې راغلی وي نو هغوي سره حسابی مختاري ورافافه کوو لکه Di , Tri , Tetra , Penta او داسې نور ...



4) که یو معوض دوه یا خوځلی راغلی وي نو د شماری ذکر کولو په وخت کې لومړی کوچني بیا غټه شماره او وروسته له هغه د di, Tri Tetra کلیمات، د راډیکال نوم او په پای کې د اصلي ځنځیر نوم ذکر کېږي.




5) که چیرې دوه مختلف راډیکالونه د اصلي ځنځیر په دوه یا دریو کاربنونو وصل شوي وي. په دغه حالت کې د ځنځیر د کاربن شماری ته د پاملرنې پرته د راډیکالونو نومونه د لاتیني تورو د مخکې والي په نظر ذکر کېږي یعنې که چیرې د Methyl او Ethyl راډیکالونه وي. څرنګه چې د لاتین په تورو کې د E توري د M څخه مخکې راځي. فلها د اصلي ځنځیر د کاربن د شمارو د ذکر کولو وروسته لمړي د Ethyl او ورپسې د Methyl راډیکال نوم لیکل کېږي. بیلګه:




3 - Ethyl - 2 - Methyl Hexane

6) که چیري دوه مختلف راډيکالونه د زنځیر په یو کاربن باندي وصل وي، دغه حالت کي هم هغه راډيکال حق لري چي لمړي توري یې د لاتیني تورو مطابق مخکي والي ولري. بیلگه:




2 – Ethyl – 2 – Methyl Hexane

7) که چیري یوشان معوضونه د دواړو طرفو څخه په یوه فاصله وي شماره د هغه طرف څخه شروع کېږي کوم طرف ته چې معوضونه زیات وي.




2,3,4 – Tri methyl Hexane

8) که چیري په یو مرکب پوري دوه مختلف راډيکالونه وصل وي اود زنځیر د کاربنونو شماره لیکل له دواړو طرفونو یو شي وي. دغه صورت کي شماره د هغه راډيکال له طرف څخه لیکل کېږي چي اول توري یې د بل راډيکال د نوم د اول توري څخه مقدم او مخکي والي ولري. بیلگه:



3 – Ethyl – 4 – methyl Hexane

9) که چیري کوم مرکب فرعي معوضونه ولري نو د مورني ځنځیر معوض باندي هم شماره لیکل کېږي او د معوض شماره دهغه کاربن څخه پیل کېږي کوم چې د مورني ځنځیر د کاربن سره نښتی وي.



2 - Methyl - 4(1,1 - di methyl ethyl) Hexane

Or (2 - Methyl - 4 - Tert - Butyl Hexane)

10) که چبری په یو مرکب کې څوگوني (دوه گوني او درې گوني) اړیکي موجودی وي نو شمیره هم د هغه طرف څخه لیکل کېږي چې کوم طرف ته څو گوني اړیکه نږدی وي نه د معوض د طرف څخه.

11) که چبری په کوم مرکب کې فعال گروپونه موجود وي نو شمیره د فعال گروپ څخه پیل کېږي.

12) که چبری یو مرکب د یو څخه زیات فعال گروپونه ولري نو هغه مرکب ته پولی فنکشنل (Poly Functional) مرکب ویل کېږي. پدې مرکب کې به یو فعال گروپ د مورنی هایدروکاربن په بڼه ټاکل کېږي او نور فعال گروپونه به یې معوضونه گڼل کېږي.


13) د فعال گروپ د غوره والی ترتیب په لاندې ډول دی:

سلفونیک اسید ← کاربوکسیلیک اسید ← ایستر ← اسید هلاید ← اماید ← نایتریل
الدهاید ← کیتون ← الکول ← امین ← الکین ← الکاین ← هلوجن ← نایترو
الکوکسي ← الکایل



پورته دیارلس اصول به په لاندې او د راتلونکو موضوعاتو په مثالونو کې تطبیق شي:




Propane




Butane




Pentane







n- Hexane




2-Methyl pentane




2-Methyl hexane




4-Ethyl-2-methyl hexane




2,3-Dimethyl butane





2,3,4-Tri methyl pentane




2,2,4,4-Tetra methyl pentane




3-Ethyl-3-methyl hexane




2,3,5-Trimethyl-4-propyl heptane
(four substituents)

3-Methyl heptane


2,3,5-Trimethyl hexane
(not 2,4,5-Trimethyl hexane)



3 - Bromo - 4 - ethyl - 3 - methyl Octane


4-(1,1-Di methyl ethyl) octane or 4-*tert*-butyl octane4-(1-Methyl ethyl)heptane or 4-*iso* propyl heptane2-Methyl butane
(Iso pentane)2, 2-Di methyl butane
(Neo hexane)

2, 3-Di methyl butane




2, 3, 5-Tri methyl- 4-propyl heptane


1-Chlor-2-methyl butane




2,2,4-tri methyl pentane ("iso octane")




Butane



2 - Methyl Hexane




3 - Methyl - 4 - Propyl Heptane



6 - Ethyl - 2,3-Di methyl Nonane

د الکانونو ایزومیری (Isomerism):



د ایزومیری مسئله او او د ایزو بوتان جوړول د اول ځل لپاره په 1867 م کال کې د بوتلیروف (A.M. Бу́тлеров) (Butlerov) په نوم کیمیاپوه له خوا منځ ته راغله. په داسې حال کې چې درې الکانونه میتان، ایتان او پروپان ایزومیرونه نه لري.

بوتان د دوه ایزومیرونو نارمل بوتان او ایزوبوتان لرونکې دي، چې دواړه یو د بل سره توپیر لري. مالیکولي فورمول یې (C_4H_{10}) دي اما مشرح فورمول او فزیکي خواص یې سره توپیر لري.

د بوتان د ایزومیرونو تعداد په لاندې توګه پیدا کېږي.

$$C_4H_{10}, n=4$$

$$I = 2^{n-4} + 1 \implies I = 2^{4-4} + 1 \implies I = 2^0 + 1 = 2$$

نو د بوتان هایډروکاربن د 2 ایزومیرونو لرونکې دي.


مثال: د Pentane او Hexane مرکباتو د ایزومیرونو شمیر په لاس راوړي؟

دالکانونو لاسته راوړنه (Preparation of Alkane's):



الکانونه د طبیعي سرچینو څخه په مختلفو صنعتي طریقو (Synthesis method's) په لاس راوړل کېږي. نن ورځ د خالصو الکانونو د استحصال لپاره زیاتي صنعتي طریقي شتون لري. چي څو مهمي یې په لاندې توگه دي.

1. د نفتو او گازو څخه د مشبوع هایدروکاربنونو لاسته راوړل (هایدروجنیشن):
غیر مشبوع هایدروکاربنونه د هایدوجن اتومونه په خپله دوه گوني او دری گوني اړیکه باندې د فلزي کتلست په شتون کې نصب کوي، او مشبوع هایدروکاربنونه لاسته راځي. لکه:

General Reaction:




Specific Examples:



2. د گرینارد طریقہ (Victor Grignard Method):

فرانسوي ڪيمياپوه وكتور گرینارد په 1912 م کال کي د الکايل هلايدونو ($R - X$) او مگنيزيم پوډرو سره (د گرینارد معرف) يو ځاي کړل چي د الکايل مگنيزيم هلايد ($R - Mg - X$) په نوم ياديږي او د الکانونو د استحصال لپاره يې ورڅخه گټه واخيسته. نوموړي د دې تعامل په پايله کي د نوبل جايزه (Noble Prize) ترلاسه کړه.





➤ This reagent was discovered by **Victor Grignard** around 1900.



Francis August Victor Grignard
(1871 - 1935)

د گرینارد په تعامل کي دکاربن او مگنيزيم اړيکه ډيره فعاله ده، او د اوبو په واسطه په اسانۍ جداکيږي.







مگنيزم ميتوکسي کلورايد



Charles adulphe Wurtz
(26.09.1817-12.05.1884)

3. د ورتس ستیز (Wurtz Synthesis) (تخنيکي طريقه):

دغه طريقه په 1855 م کال د فرانسوي کيميا پوه (Wurtz) له خوا کشف شوه، نوموړي الکايل هلايدونه ($R - X$) د فلزي سوديوم سره يو ځاي کړل. د نوموړي طريقې استعمال محدود دي يوازي د متناظر الکانونو د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه گټه اخيستل کيږي.






4. د دوماس طريقه (Dumas Method):



Jean Baptiste André Dumas
(1800 - 1884)

فرانسوي پوه دوماس د عضوي تيزابونو د مالگو څخه په لابراتوار کې مشبوع هايډروکاربنونه په لاس راوړل.




دالکانو فزیکي خواص (Physical Properties):

1. د الکانو لومړي څلور مرکبات میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د غاز په حالت، د پنتان څخه تر هگزا دیکان پورې په مایع حالت او د هیپتا دیکان څخه پورته نور ټول په جامد حالت پېدا کېږي.

2. د ویلي کیدو ټکی یې د مالیکولي کتلې په زیاتوالی سره زیاتیږي. لکه په لاندې گراف کې:


گراف (2):

Melting points: ethane ($-183\text{ }^{\circ}\text{C}$); propane ($-188\text{ }^{\circ}\text{C}$); butane ($-138\text{ }^{\circ}\text{C}$); pentane ($-130\text{ }^{\circ}\text{C}$).




3. په الکانونو کې د جفتو کاربنونو د ویلي کیدو ټکی د طاقو کاربنونو په نسبت لوړ دي، لکه په لاندې گراف کې:

گراف (3):



4. د جوش ټکی یې د مالیکولي کتلي په زیاتوالي سره زیاتېږي. لکه په لاندې ګراف کې:
په دې ګراف کې سور خط د الکانونو لپاره دی او سپین خط د سایکلو الکانونو لپاره دی.
ګراف (4):

The boiling points of the unbranched alkanes show a regular increase with increasing molecular weight.



Boiling points of unbranched alkanes (in red) and cycloalkanes (in white).

5. مستقیم څنځیر (Straight Chain) الکانونو د ویلی کیدو او جوش ټکی د منشعب الکانونو په نسبت لوړ دی. لکه په پنتان او هگزان کې:

Boiling points of C_6H_{14} : hexane ($68.7^{\circ}C$); 2-methylpentane ($60.3^{\circ}C$); 3-methylpentane ($63.3^{\circ}C$); 2,3-dimethylbutane ($58^{\circ}C$); 2,2-dimethylbutane ($49.7^{\circ}C$).

Pentane 309,2 K

Iso pentane 301 K

New pentane 282,6k

6. ټول مشبوع هایدروکاربنونه په غیر قطبي محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، کاربن تتراکلوراید او

بنزول کې کې په ښه توګه حلېږي. مګر په قطبي محلولونو کې غیر منحل دي لکه اوبه.

7. د الکانونو کثافت (Density) د کاربن د اتومونو په زیاتیدو سره زیاتېږي. کثافت یې تل د

اوبو د کثافت څخه ټیټ دی، ترټولو زیات کثافت یې ($0,8g/ml$) دی او داوبو څخه سپک

دی.

8. ټول الکانونه په هوا کې سوځي، کاربن ډای اکساید، اوبه او انرژي جوړوي.

9. ټول الکانونه بی رنګه دي.

10. مایع الکان بنزول ته ورته کمزوری بوی لري مګر جامد الکان بوی نه لري.

11. د الکانونو د کاربن د شمیر سره د ایزومیرونو شمیر هم زیاتېږي لکه بوتان دوه ایزومیر

لري، پنتان درې ایزومیر لري او اوکتان اتلس ایزومیر لري.

12. الکانونه په ځمکنۍ گازونو او طبعي تیلو کې پیدا کېږي.

په لاندې جدول کې د ځینو مشبوع هایدروکاربنونو ویلی کیدو ټکی، جوش ټکی او

مالیکولي وزن ترتیب شوي دي:

جدول (16):

Alkane الکان	مالیکولي وزن	د ویلی کیدو ټکی (M. P) $^{\circ}C$	د ایشیدو کیدو ټکی (B. P) $^{\circ}C$
Butane	58.1	- 138.3	- 0.5
Isobutane	58.1	- 159.4	- 11.7
Pentane	72.2	- 129.7	36.1

د جدول ادامه:

Iso pentane	72.2	- 159.9	27.9
Neo pentane	72.2	- 16.6	9.5
Hexane	86.2	- 95	69.0
Iso Hexane	86.2	- 118	60.3
3 – Methyl pentane	86.2	- 118	63.3
2,3 – Di methyl butane	86.2	- 128.5	58
Neo Hexane	86.2	- 99.9	49.7
Hexa methyl ethane	114.2	100.7	106.5

په لاندې جدول کې د ځینو مشبوع هایدروکاربنونو کثافت، ویلی کیدو او جوش ټکي ښودل شوی دي:

Nomenclature and Physical Properties of Straight-Chain Alkanes						
Number of carbons	Molecular formula	Name	Condensed structure	Boiling point (°C)	Melting point (°C)	Density ^a (g/mL)
1	CH ₄	methane	CH ₄	-167.7	-182.5	
2	C ₂ H ₆	ethane	CH ₃ CH ₃	-88.6	-183.3	
3	C ₃ H ₈	propane	CH ₃ CH ₂ CH ₃	-42.1	-187.7	
4	C ₄ H ₁₀	butane	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	-0.5	-138.3	
5	C ₅ H ₁₂	pentane	CH ₃ (CH ₂) ₃ CH ₃	36.1	-129.8	0.5572
6	C ₆ H ₁₄	hexane	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₃	68.7	-95.3	0.6603
7	C ₇ H ₁₆	heptane	CH ₃ (CH ₂) ₅ CH ₃	98.4	-90.6	0.6837
8	C ₈ H ₁₈	octane	CH ₃ (CH ₂) ₆ CH ₃	127.7	-56.8	0.7026
9	C ₉ H ₂₀	nonane	CH ₃ (CH ₂) ₇ CH ₃	150.8	-53.5	0.7177
10	C ₁₀ H ₂₂	decane	CH ₃ (CH ₂) ₈ CH ₃	174.0	-29.7	0.7299
11	C ₁₁ H ₂₄	undecane	CH ₃ (CH ₂) ₉ CH ₃	195.8	-25.6	0.7402
12	C ₁₂ H ₂₆	dodecane	CH ₃ (CH ₂) ₁₀ CH ₃	216.3	-9.6	0.7487
13	C ₁₃ H ₂₈	tridecane	CH ₃ (CH ₂) ₁₁ CH ₃	235.4	-5.5	0.7546
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
20	C ₂₀ H ₄₂	eicosane	CH ₃ (CH ₂) ₁₈ CH ₃	343.0	36.8	0.7886
21	C ₂₁ H ₄₄	heneicosane	CH ₃ (CH ₂) ₁₉ CH ₃	356.5	40.5	0.7917
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
30	C ₃₀ H ₆₂	triacontane	CH ₃ (CH ₂) ₂₈ CH ₃	449.7	65.8	0.8097

^a Density is temperature dependent. The densities given are those determined at 20 °C (*d*₂₀^o).

جدول (17):

د الکانونو د ویلی کیدو ټکی د لاندې دستگاه په مرسته موندل کیږي.



An instrument used to measure melting point.

د الکانونو کیمیاوي خواص (Chemical properties):

هغه اړین مسایل او عوامل چې د الکانونو د کیمیاوي خواصو څرگندونکې دي په لنډ ډول عبارت دي له:

1. په الکانونو کې د کاربن د اتومونو (C - C) ترمنځ اشتراکي اړیکه کاملاً غیر قطبي ده د هغې یوځای کیدونکي (پیونډي) انرژي 83 cal/mol ده، چې څواکمنه بلل کیږي. د کاربن او هایدروجن اتومونو (C - H) ترمنځ اړیکه ډیره کمه قطبي ده او د 98 cal/mol انرژي لرونکې ده چې د کاربن د اتومونو په نسبت څواکمنه ده. له همدې امله الکانونه د ډیر کم فعالیت لرونکي دي چې د پارافین (Paraffine) په نوم یادېږي.
2. څرنگه چې د نوموړو اړیکو انرژي زیاته ده او په الکانونو کې د کاربن او هایدروجن د عناصرو ترمنځ ارتباط ډیر قوي دي، نو د نورو موادو سره د الکانونو تعامل په عادي تودوخه کې صورت نه نیسي بلکه د هغوي تعاملات ($300 - 1000^\circ\text{C}$) تودوخې ته اړتیا لري.




3. په الکانونو باندې غلیظ معدني اسیدونه لکه H_2SO_4 ، HNO_3 . القلي گانې اود کرومیک اسید مخلوط اغیزه نه لري. همدارنگه القلي فلزات په هغوي باندې اغیزه نه کوي او د هایدروجن گاز د هغوي له تعامل څخه د عضوی موادو سره نه تولیدیږي. له همدې امله د القلي فلزاتو (لکه Na) د ساتلو لپاره د خاورو تیلو څخه گټه اخیستل کیږي او د فلزاتو د خوړل کیدو څخه د مخنیوي په خاطر هغوي د گریسو په واسطه غوړوي.
4. الکانونه د ایوني معرفونو په وړاندې ځواکمن او مقاوم دي او نوکلیوفیلی او الکتروفیلی معیارات په هغوي اغیزه نه کوي.
5. د الکانونو مهم تعاملات د هغوي د اکسیدیشن تعاملات او په ځانگړي توگه د هغوي د احتراق تعاملات او همدارنگه د کلورین ، برومین او نورو سره د هغوي تعویضي تعاملات دي.
6. د الکانونو تعاملات د ترمودینامیک له نظره عموماً Exothermic دي، خو د یادولو وړ ده چې نوموړي تعاملات د Endothermic عملیې په پیل کې وي خو د تعامل په پای کې چې تودوخه تولیدیږي د ورکړل شوي تودوخي څخه زیاته وي له دې کبله د Exothermic تعاملاتو په نوم یادېږي.
7. د الکانونو تعاملات د ازادو راډیکالونو په واسطه په زنځیري ډول د څو ځانگړو میخانیکي مرحلو په پایله کې سرته رسیږي.
8. څرنگه چې د الکانونو تعاملات په عادی تودوخه کې سرته نه رسیږي، باید د نور او لمر له وړانگو، ماورای بنفش وړانگو (U.A) او یا زیاتي تودوخي څخه گټه واخیستل شي.
9. د $1000^\circ C$ څخه لوړه تودوخه د الکانونو د ترکیبي عناصرو د تجزیې سبب گرځي.

د الکانونو کیمیاوي تعاملونه (Chemical Reaction):



1. د الکانونو احتراق (سوځیدنې) (Combution):

په ازاده او زیاته هوا کې د الکانونو پوره سوځیدل په عمومي ډول د CO_2 گاز، اوبه، یوه اندازه تودوخه (انرژي) او رڼا د تولید سبب گرځي.

د الکانونو د پوره سوځیدنې عمومي تعامل عبارت دي له:





د تولید شوي انرژي څخه د کورونو د گرمولو او په صنایعو کې د انرژي د تولید لپاره ګټه اخیستل کېږي. د الکانونو د اکسیجن د کمبود (ناقص احتراق) په صورت کې، د کاربن ټول اتومونه نه سوځي او په CO_2 نه تبدیلېږي. بلکه ځینې یې د اکسیجن سره د نه ترکیب په صورت کې د لوګي (C) په شکل تولیدېږي یا د CO زهري ګاز د تولید باعث ګرځي:



په صنعت کې د لوګي (تور کاربن) څخه د کاربن کاغذ، واکس، رنګ جوړولو او پلاستیک جوړونه کې ګټه اخیستل کېږي.


کله چې د الکانونو سره په معمولي مقدار کې اکسیجن په لوړ فشار او کتلست په موجودیت کې وسوځول شي نو الکانونه په الکولو او الدیهایدونو بدلېږي:





2. د هلوچونو سره د الکانونو تعامل (Halogenation):


د الکانونو سره د هلوچونو (X_2) تعاملات تعویضي وي. چي په نوموړو تعاملاتو کي د هلوچن یو یا څو اټومونه (I_2, Br_2, F_2, Cl_2) د الکان د یو یا څو هایډروجنونو سره یو ځای کيږي او زنځیري تعویض سرته رسیږي.

د الکانونو تعامل د کلورین سره د (Chlorination)، د برومین سره د (Bromonation)، فلورین سره د (Fluorination)، او د آیوډین سره د (Iodination) په نوم یادېږي. د هلوچونو سره د الکانونو تعامل عموماً د تودوخې، د نور (رڼا)، لمر روښنایي او یا ماورای بنفش وړانگو (U.A) په مرسته او اثر صورت نیسي. اما د تعامل میخانیکي (Mechanism) او د عملیې سرعت د هلوچن نوع او ډول پوري اړه لري. د تودوخې او روښنایي په اغیزه د الکانونو سره د کلورین تعامل چټک اود برومین سره سست او بطي وي. اما د فلورین سره د هغوي تعامل د تودوخې او لمر د وړانگو په واسطه په انفجاري توگه صورت نیسي او په تیاره او عادی تودوخه کې د هغوي د تعامل کنټرول ستونزمن دي. لکن د آیوډین سره د ځینو الکانونو تعامل لکه متان، ناممکن یا ستونزمن دي اود نورو الکانونو سره په سختي او په ډیر سست ډول صورت نیسي. د الکانونو سره د هلوچونو عمومي تعامل په لاندې توگه دي.



د کلورین (Chlorine) سره د میتان (Methane) د گاز تعامل د مطالعې لاندې نیسو. میتان گاز د کلورین گاز سره په عادي تودوخه او تیاره کي تعامل نه کوي. اما د ($250 - 400^\circ C$) تودوخې په ورکولو سره د ماورای بنفش وړانگو (U.A) یا لمر د روښنایي په شتون کې نوموړي دوه گازونه په څلورو مرحلو کي په ځانگړي میکانیزم سره تعامل کوي او ډیر باارزښته عضوی محلولونه (Solvents) حاصلیږي، په ترتیب سره میتایل کلوراید (مونو کلورومیتان)، ډای کلورو میتان، تراي کلورو میتان او بالاخره کاربن تترا کلوراید (تترا کلورو میتان) د HCl تیزابو سره تولیدیږي.






د تعامل میخانیکیت (Mechanism of Reaction):


د میتان د کلورینیشن (Chlorination) د تعامل میخانیکیت په لاندې څلورو پړاوو کې سرته رسیږي.

لمړي پړاو (تخریبي تعامل): دغه پړاو د تودوخې سره د لمر مستقیمي روښنایي یا ماورای بنفش وړانگوته اړتیا لري چې د Cl_2 د کوولانسي اړیکې د تخریب او ویجاړتیا سبب ګرځي او د کلورین ازاد ($\text{Cl}^\bullet$) راډیکال تولیدیږي.




دوهم پړاو (زنځیري تعویضي تعامل):

a) په دغه مرحله کې لمړي د کلورین ازاد راډیکال د میتان په مرکب کې د کاربن او هایډروجن ($\text{C} - \text{H}$) د اتومونو ترمنځ یوه اړیکه شلوي، په میتان حمله کوي او د میتایل د ازاد راډیکال ($^\bullet\text{CH}_3$) د ازادیدو سبب ګرځي:






b) وروسته د میتایل ازاد راډیکال د (Cl_2) په مالیکول اغیزه کوي د $\text{CH}_3 - \text{Cl}$ مرکب د ($\text{Cl}^\bullet$) سره تولیدیږي.






په دې ترتیب سره د کلورین د مالیکول په ماتیدو سره د $\text{CH}_3 - \text{Cl}$ په زرګونو مالیکولونه په لاس راتلای شي.

دریم پړاو (a او b) د میکانیزم مطابق: دغه پړاو په میتان باندې د (Cl°) د ازاد راډیکل د اثر په دوام، د هایدروجن د ټولو اتومونو د تعویض او ازادولو پورې په زنځیري ډول صورت نیسي.



څلورم پړاو (د زنځیر یا راډیکالونو ترکیب):


د میتان د ټولو هایدروجنونو د تعویضي تعامل په پای سره، په دغه مرحله کې د (Cl°) اضافي راډیکالونه او د میتایل راډیکال (CH_3°) سره ترکیب کیږي او په لاندې توګه نوي مالیکولونه جوړوي.



د میکانیزم پورته مرحلې په ګوته کوي، چې د الکانونو سره د هلوځونو تعامل عموماً د تعویضي راډیکالي تعامل په نوم یادېږي.



3. د الکانونو سره د (HNO_3) نائتریک اسید تعامل (Nitration):

الکانونه د HNO_3 سره په عادي تودوخه کې تعامل نه کوي، اما په لوړه تودوخه ($400 - 500^\circ\text{C}$) کې سره تعامل کوي. د الکانونو یو اتوم هایدروجن د نایټرو (NO_2) له ګروپ سره تعامل کوي، او یو هایدروجن د نوموړي ګروپ سره تعویض کیږي، او د Nitro Alkane ($\text{R} - \text{NO}_2$) مرکب او اوبه لاسته راځي.




4. د الکانونو سره د (H₂SO₄) سلفوریک اسید تعامل (Sulphonation):

په دي وروستيو کي ليدل شوي هغه الکانونه چي د هغوی د کاربن د اتومونو شمير د (6) څخه زيات وي په سختی د غليظ او لوگي جوړونکي سلفوریک اسید سره تعويضي تعامل سرته رسوي او د هغوی سلفرلرونکي مشتقات جوړوي:



5. د الکانونو ايزوميريزيشن (Isomerization):

ددي لپاره چي د نارمل الکانونو څخه چي د هغوي د کاربنونو شمير زيات وي، سمه او زياته گټه واخيستل شي، د پطروشيمي په صنعت (Petro chemical Synthesis) کي هغوي د Isomerization عمليي په واسطه په 25°C تودوخه او AlCl₃ او HCl د کتلستونو په شتون کې په منشعب او بڼاخ لرونکو الکانونو تبديلوي. بيلگه:





6. د الکانونو د انشقاق عمليه (Cracking):

د پطروشيمي په صنعت کي د نوموړي عمليي په واسطه د الکانونو کم لگښته لوي ماليکولونه يعني (هغه الکانونو چي د 15 څخه تر 18 پوري د کاربن اتومونه لري) د فشار، کمي تودوخي او د Al₂O₃ يا SiO₂ کتلستونو په شتون کې په کوچنيو ماليکولونو (الکان او الکين) چي د 5 څخه تر 12 پوري کاربنونه لري، پټه کيږي تر څو له هغوی څخه د موټرونو په انجنونو او نورو ځايونو کي په ښه توگه گټه واخيستل شي.

د غټو ماليکولو ټوټه کول د تودوخي او کتلست په شتون کې د انشقاق عمليې په نامه يادېږي. د انشقاق د عمليې څخه د تيلو په صنعت کې کار اخيستل کېږي.

عمومي بڼه:



کله چې الکانونه شپږ يا شپږو څخه زيات کاربنونه ولري او د فشار او کتلست په موجوديت کې (450-550°C) تودوخه ورکول شي، پدې شرايطو کې په الکانونو کې د ډی هايډروجنشن، سایکلزيشن (Cyclazation) عمليې منع ته راځي او اروماتيک مرکبات جوړوي.

د الکانونو او د هغوي مشتقاتو استعمال او طبي ارزښت يې:

(Usages of Paraffine Compounds)

ميتان هغه گاز دي چې په خندقونو کې او د ځمکې لاندې نورو گازونو کې پيدا کېږي. ميتان په صنعت کې د تودوخي د توليد لپاره استعمالېږي. همدارنگه د سون مادي په توگه، د کوک، هايډروجن او استلين گاز په توليد، د چاپ رنگونو او رابر په توليد او نور برخو کې ورڅخه گټه اخيستل کېږي. د ميتان يو خطري خاصيت دادی که چېرې يو حجم ميتان د دوه حجمه اکسيجن سره يو ځای شي ډير خطرناک انفلاق او چاودنه کوي. د يو مول ميتان څخه 122Kcal انرژي لاسته راځي.

د ايتان گاز هم د ځمکې لاندې گازاتو کې شتون لري او همدارنگه د نورو هايډروکاربن مرکباتو د انشقاق (Cracking) څخه توليدېږي. ايتان گاز څخه هم د تودوخي د سرچينې په توگه

اود کورونو دگرمولو لپاره کار اخیستل کیږي. ایتان گاز د پارافین د مرکباتو څخه په طبابت (Midical) کې په ځانته ډول او یا شحم سره په شریک ډول د سوځیدو پانسما لپاره استعمالیږي، په صنعت کې د شمع جوړولو، کاغذ غیر قابل نفوذ کولو او د چرم غوړولو لپاره تری گټه اخیستل کیږي.

پروپان، نارمل بوتان او ایزوبوتان په نفتی ځاگانو او نفتی موادو کې شتون لري او هغه گازات دي چي د انشقاق د عملیې په مرسته د هایدروکاربنونو څخه په لاس راوړل کیږي. نوموړي گازات په زیاته پیمانه د تیلو د تصفیې (Refination) څخه لاس ته راوړل کیږي. دغه گازات په زیات فشار سره په فولادي بوتلونو کې متراکم کوي او د سونگ او گرمونکی مادي په توگه ورڅخه گټه اخیستل کیږي.

مایع پارافین اکثره د زیاتره درملو لپاره د محلل (Solvent) په ډول استعمالیږي، او د قبضیت د ختمولو لپاره هم کم مقدار کارول کیږي. او زیات مقدار یې اسهال پیدا کوي.

مشتقاتو استعمال یې (Usage of Paraffine derivatives):

a. کلوروفارم (Chloroform):

د حجري د پروتوپلازم لپاره عمومي زهر دي او په زړه، اعصابو، گرده، ځیگر او تنفسي سیستم ناوړه اغیزه کوي، پخوا د عملیاتونو لپاره د بیهوشي موادو په توگه استعمالیده مگر اوس وخت کې د انساني جراحي پرمهال د مریني د خطر له امله طبابت منع کړي دي. چي نن ورځ ورڅخه ډیره کمه گټه اخیستل کیږي. د کلوروفارم څخه د عضوی محلل په توگه، حشره وژنکو دواگانو، د یخچال د گاز په جوړولو، هوا په بدلون (تهویه) او د ارایشي Spray په توگه گټه اخیستل کیږي. په اور کې نه سوځي او د اور وژنکي مادي په ډول ورڅخه کار اخیستل کیږي، د تترا کلور میتان څخه د (Pyrene) په نوم اور ضد ماده په فولادي کپسولونو کې ډیره مصرف کیږي. کېمیاوي فورمول یې: CHCl_3

b. **ايوډوفارم (Iodoform):** د ضد عفوني او ميكروب وژنونكي مادي په حيث استعمالېږي،

سوځيدو او زخم په پانسماڼ كې هم استعمالېږي كېمياوي فورمول يې: CHI_3

c. **برومو فارم (Bromoform):** قوي انسيتيزي ده مگر زهري خاصيت يې زيات دى.

كېمياوي فورمول يې: CHBr_3

a. **كلوروايتان (Chloroform):** دموضوعي انسيتيزى په ډول استعمالېږي . كېمياوي

فورمول يې: $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{Cl}$


پنځم څپرکې


الي سيکليک مرکبات (Alicyclic Compounds)

الي سيکليک مرکبات هغه کړنيز سيستمونه دي چي يواځي د کاربن اتومونه د هغوي د کړۍ په جوړښت کې برخه لري. نوموړي سيستمونه په مشبوع (Cyclo Alkane) او غير مشبوع (Cyclo Alkene) ويشل کيږي. څرنگه چي دواړه سلسلې مرکبات په خپلو کي ورته والي لري، نو له همدې کبله د الي سيکليک مرکباتو په نوم ياديږي.

سايکلوالکانونه (Cyclo Alkane):

سايکلوالکانونه مشبوع هايډروکاربنونه دي چي د کاربن اتومونه يې د کړۍ په شکل يو د بل سره تړلي وي او عمومي فورمول يې C_nH_{2n} دی. د سايکلوالکانونو درې او څلور ضلعي کړۍ غير ثابتې دي او په مصنوعي ډول جوړيږي او ډيري فعالې دي. پنځه او شپږ ضلعي کړۍ يې ثابتې دي او په طبيعي موادو کې زياتي شتون لري. د سايکلوالکانونو لومړي مرکب درې کاربنه (سايکلوپروپان) دی. يو کاربنه او دوه کاربنه مرکبونه نه لري، ځکه چي کړۍ د يو او دوه کاربنو څخه نشي جوړيدلای. د ځينو سايکلوالکانونو نيمه جوړښتيز فورمولونه او د هغوی موډلونه په لاندې توگه دي.





سایکلو الکان د کړۍ د کاربن د اتومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونو ویشل کېږي.
کوچنې کړۍ: 3 - 4 ، د 3 نه تر 4 پورې د کاربن اتومونه لري.
عادي (نورمال) کړۍ: د 5 - 7 ، د 5 څخه تر 7 پورې د کاربن اتومونه لري.
منځنې کړۍ: د 8 - 12 ، د 8 څخه تر 12 پورې د کاربن اتومونه لري.
غټې کړۍ: 12 او د هغه څخه زیات د کاربن اتومونه لري.

د سایکلو الکانو د ویلي کیدو او جوش ټکۍ د کاربن د شمیر په زیاتوالي سره زیاتېږي.

د ځینو سایکلو الکانونو مجموعي فورمول، نوم او فزیکي خواص؛ جدول (18):

مجموعي فورمول C_nH_{2n}	نوم	د ایشیدو کیدو ټکۍ (B.P) °C	د کنگل کیدو ټکۍ (F.P) °C
C_3H_6	Cyclo propane	- 33	- 127
C_4H_8	Cyclo butane	13	- 80
C_5H_{10}	Cyclo pentane	49	- 94
C_6H_{12}	Cyclo hexane	81	6.5
C_7H_{14}	Cyclo heptane	118	- 12
C_8H_{16}	Cyclo octane	149	14
C_6H_{12}	Methyl Cyclo pentane	72	- 142
C_7H_{14}	Methyl Cyclo hexane	100	- 126


د سایکلو الکانونو پیدایښت :

سایکلو الکانونو په طبیعت کې په ډیره کچه پراختیا موندلې ده او نوموړي مرکبونه د ځینو نفتو د جوړښت له بنسټیزو اجزاوو څخه دي (د باکو او اکراین په نفتو کې زیات پیدا کېږي).
سایکلو الکانونه د لمړي ځل لپاره په نفتو کې د مارکوفنیکوف (V.V. Markovnikov) روسي


عالم په واسطه کشف شول، نوموړي عالم دا هايډروکاربنونه د نفتين (Naphthenes) په نوم ياد کړي دي. پنځه ضلعي او شپږ ضلعي سايکلو الکانونه، يعنی سايکلو پنتان او سايکلو هگزان اود هغوی مشتقات په طبيعت کې ډير زيات خپاره شوي دي. سايکلو الکانونه په نباتي ايتري غوړيو کې شتون لري.

د سايکلو الکان نوم ايښودنه (Nomenclature of Cyclo Alkanes):


- د سايکلو الکان نوم ايښودنه د الکانونو په شان ده او د نوم څخه د مخه يې د سايکلو (Cyclo) مختاړی ذکر کېږي. سايکلو الکانونو په نوم ايښودنه کې بايد لاندې څو ټکي په نظر کې ونيسو:
1. که چېرې کړۍ پورې يو معوض نښتی وي نو لومړی د معوض نوم اخستل کېږي او سايکلو الکان د مورني هايډروکاربن په ځای راځي. په داسې مرکباتو کې شماري ليکلو ته اړتيا نشته.
 2. که چېرې کړۍ پورې دوه معوضه نښتي وي، نو معوضونه بيا د الفبا تورو په ترتيب يادول کېږي.
 3. که چېرې کړۍ د دوه څخه زيات معوضونه ولري نو بيا هم د الفبا ترتيب په کې په نظر کې نيول کېږي او شماره هغه طرف څخه پيل کېږي، کوم طرف ته چې دويم معوض نژدي وي. د ځينو ساده سايکلو الکانو نومونه په لاندې ډول دي:




Cyclo propane




Cyclo pentane




Chloro Cyclo Pentane




Iso Propyl Cyclo Hexane




2 - Methyl Cyclo Hexanol




1 - Bromo - 3 - Chloro Cyclo Hexane




4 - Chloro - 2 - ethyl - 1 - methyl Cyclo Hexane




1 - Cyclo butyl Pentane




1,3 - Di Cyclo Hexyl Propane




cis-1,2-Di methyl cyclo hexane




trans-1,2-Di methyl cyclo hexane




cis-1,3-Di methyl cyclo hexane







trans-1,3-Di methyl cyclo hexane



cis-1,4-Di methyl cyclo hexane




trans-1,4-Di methyl cyclo hexane

*cis*-1,3-Di methyl cyclo pentane*trans*-1,3-Di methyl cyclo pentane*cis*-1,2-Di methyl cyclo pentane
bp 99.5 °C*trans*-1,2-Di methyl cyclo pentane
bp 91.9 °C

د سایکلو الکانونو لاسته راول (Preparation of Cyclo alkanes)



سایکلو الکانونه په طبیعت کې په زیاته اندازه پیدا کېږي. په زیات ډول په ځینو تیلو کې پیدا کېږي. سایکلو پنتان او سایکلو هگزان په طبیعت کې زیات پیدا کېږي. سایکلو الکانونه د نباتاتو په تیلو کې هم موندل کېږي.

د استحصال طریقه : دوه هلوجن لرونکو مشتقاتو باندې د فلز داغیزي له امله لاسته راځي. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان د 1,3-Dichloro propane او جستو څخه د ګوستافسون سنتیز (Gustavsons synthesis) په نتیجه کې په لاس راځي:



همدارنګه سایکلو بیوتان د 1,4-dibromo butane او فلزي سوډیم څخه لاسته راځي.

د سایکلو هگزان استحصال د بنزول دکړۍ د هایډروجنیشن څخه دکتلست، فشار او تودوخي په شته والي کې په لاس راځي.




د سایکلو الکانونو تعاملات (Reaction of Cycloalkanes):

سایکلو الکانونه د هایډروجن او هلوجنونو سره جمعي تعاملات ترسره کوي، الکانونه او الکیل هلايدونه ورڅخه لاسته راځي.

همدارنگه سایکلو الکان د هلوجنونو سره تعويضي تعاملات سرته رسوي پدې تعامل کې کړۍ نه ماتېږي بلکه د هلوجن اتومونه د هایډروجن سره تعویض کېږي.

سایکلو الکانونه د اکسیجن په شتون کې احتراقي تعاملات هم سرته رسوي چې په پایله کې کاربن ډای اکساید، اوبه او انرژي ورڅخه لاس راځي.



د سایکلو الکانونو اهمیت:

سایکلو پروپان (Cyclo propane) د قوي بې هوښه کونکو موادو په توګه کارول کېږي. سایکلو پنتان (Cyclo pentane) د نفتو سره یو ځای کوي ترڅو د موټرو د سوځیدو مواد (محرکه موادو) کیفیت لوړ او عالی شي. همدارنګه د سایکلو پنتان د کاربوکسیلی مشتقاتو څخه په نفتو کې ګټه اخستل کېږي.

د سایکلو پنتان کاربوکسیلیک اسید او د هغه همولوګونه، د القلی، سودیمي مالګو سره یو ځای کېږي او د رټی ضد صابون ورڅخه په لاس راځي. په همدې ترتیب د استعمال او ګټې اخیستنې نور ډیر ځایونه لري.

شپږم څپرکې

غیر مشبوع هایدروکاربنونه

الکینونه (Alkenes) یا د ایتلین سلسله

الکینونه غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي چې په مالیکول کې یوه دوه گوني کوولانتي اړیکه شتون لري، د الکینو اصلي ځانګړتیا دا ده چې په خپل مالیکول کې یوه دوه گوني اړیکه لري نو له همدې کبله الکینونه نسبت الکانونو ته د هایدروجن کم اتومونه لري، او د غیر مشبوع هایدروکاربنونو په نامه یادېږي. الکینونه هم عمومي فورمول لري چې عمومي فورمول یې (C_nH_{2n}) دی.

پدې فورمول کې n قیمتونه له دوو (2) څخه پیل کېږي لومړي مرکب یې ایتین یا ایتلین C_2H_4 دی.

د یادولو وړ ده چې په الکینونو کې د ایزومیری (Isomerism) تعداد د الکانونو په نسبت زیات دی لکه چې بیوتان دوه ایزومیری او بیوتین درې ایزومیری لري. د ډیروالی علت یې په الکین کې د دوه گوني رابطې شتون دی. مشهور کیمیاپوه (Huckel) ثابت کړه چې په الکینونو کې د کاربن د اتومي اربیتال هایبریدزیشن (Hybridization) (SP^2) وي. او په خپل منځ کې 120° درجي زاویه جوړوي.

نوموړې سلسله او لړۍ په لاندې نورو نومونو هم یادېږي.

1. الکائیلینونه (Alkylenes).
2. ایتلیني هایدروکاربنونه، ځکه د الکینونو لمړي مرکب (Ethylene) دي.
3. اولیفینونه (Olefines) (غوړي جوړونکي په مانا) ځکه د هلو جنونو لکه کلورین سره مایع غوړي د ایتلین کلوراید $(H_2C = CH - Cl)$ په نوم جوړوي.

د الکینونو نوم ایښودنه (Nomenclature of Alkenes):

I. عمومي طريقه (Common method):

په ایوپاک نوم ایښودنه کې د الکینو توپیر د الکانو سره پدې کې چې د الکانو د نوم په پای کې *ane* او د الکینو د نوم په پای کې *ene* وروستاري راځي. لکه دوه کاربنه الکین ته ایتین (Ethene) او دری کاربنه الکین ته پروپین (Propene) وایي.

Ethane	→	Ethene	Pentane	→	Pentene
Propane	→	Propene	Hexane	→	Hexene
Butane	→	Butene	Heptane	→	Heptene

II. معمولي طريقه (Ordinary method):

په دغه طريقه کې د *ane* - د وروستاري پر ځای چې د الکانونو د نوم په پای کې ذکر کېږي، د (*-ylene*) وروستاري لیکل او لوستل کېږي. لاندې جدول کې د ځینو الکینونو معمولي نوم، زنځیري نوم، د ویلی کیدو او ایشیدو ټکي ښودل شوي دي:






جدول (19):

د الکان نوم	د الکینونو عمومي نوم	زنځیري فورمول	ویلی کیدو ټکي (M.P)	ایشیدو ټکي (B.P)
Eth-ane	Eth-ylene	$H_2C = CH_2$	-102.4	-164.4
Prop-ane	Prop-ylene	$CH_3 - CH = CH_2$	-47.7	-185
But-ane	But-ylene	$CH_3 - CH_2 - CH = CH_2$	-6.5	-130
Pent-ane	Pent-ylene	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH = CH_2$	30.1	-138



III. IUPAC په میتود د الکینونو نوم ایښودنه:

د الکینو په ایوپاک نوم ایښودنه کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کېږي:


1. هغه الکینونه چي راډیکل نه لري او غیر منشعب وي. شماره له هغه کاربن څخه پیل کیږي چي دوه گوني اشتراکي اړیکه ورته نږدي وي. په نوموړي طریقه کي نوم ایښودنه د Propene مرکب څخه پیل کیږي، په لوستلو او لیکلو کي اول د هغه کاربن د شمیري نوم اخیستل کیږي چي دوه گوني اړیکه ورته نږدي وي. او وروسته د الکین عمومي نوم ذکر کیږي.



2. د منشعب الکینونو په نوم ایښودنه کي باید لاندې ټکي په نظر کي ونیول شي.
- د الکین اصلي زنځیر چي د دوه گوني اړیکي لرونکي دي، وټاکل شي.
 - د اصلي زنځیر کاربنونه له هغه طرفه پیل کیږي چي دوه گوني اړیکه ورته نږدي وي.
 - د منشعب الکین د نوم په لوستلو او ویلو کي، لمړي د هغه کاربن شمیره چي د راډیکل لرونکي وي ذکر کیږي او وروسته د هغه کاربن شمیره چي دوه گوني اړیکه ورباندې نصب وي او په پای کي د الکین د اصلي زنځیر نوم ذکر کیږي. بیلگه:








– که دوه مختلف راډيکلونه د الکين په اصلي زنځير وصل وي. د راډيکلونو ذکر د لاتيني تورو د مخکي والي او ترتيب په بنسټ صورت نيسي.




(4 – Ethyl – 3 – methyl – 1 – Hexene)


3. که چېرې په يوه ځنځير کې د يوه څخه زيات معوضونه وجود ولري نو د الفبا توري په نظر کې نيول کېږي او که چېرې يو معوض څو ځلي راغلی وي نو بيا د حسابي مختاري Di, Tri, Tetra, کارول کېږي.

4. په سايکلو الکينو کې شميره تل د دوه گوني اړيکي د موقیعت څخه پيل کېږي او معوض پورې کومه اړه نلري. لاندې بيلگو ته ځير شي:







5,5-Dimethyl-2-hexene



1-Chloro-2-butene




1-Methyl cyclopentene
(not 2-methyl cyclopentene)




3,5-Dimethyl cyclohexene
(not 4,6-dimethyl cyclohexene)


Cis- and *trans*-alkenes:




cis-1,2-Di chloro ethene




trans-1,2-Di chloro ethene




4-Methyl-3-penten-2-ol




2-Methyl-2-cyclohexen-1-ol




Cyclopropene



Cyclobutene





Cyclopentene





Cyclohexene

د الکینونو ایزومیری (Isomerism): په الکینونو کې د الکانونو په نسبت د ایزومیرونو شمیر زیات دي. څرنګه چې بوتان یو الکان مرکب دي د دوو ایزومیرونو لرونکي دي اما Butene درې ایزومیرونه لري. د زیاتوالي علت یې د دوه ګوني اشتراکي اړیکه او په الکینونو کې د هغوي د موقعیت تغیر دي. په الکینونو کې ایزومیری د بیوتین څخه پیل کېږي.




الکینونه د درې ډوله ایزومیرونو لرونکي دي.


1. په مختلفو کاربنونو باندې د راډیکالونو او هلوچنونو د محل د تغیر په نظر:



2. د فضاي جوړښت له مخې الکینونه د Cis او Trans ایزومیرونو لرونکي دي چې په دې اړه مخکې معلومات ورکړل شوي دي. د بیلګې په توګه:



Cis – 2 – Pentene




Trans – 2 – Pentene


په عمومي ډول د Trans ايزومير نسبت Cis ايزومير ته د کمي انرژي لرونکي دي.

يادښت: که چېرې يو گروپ دوه کاربنه ولري او د کاربن – کاربن تر منځ يې يوه دوه گوني اړيکه وي نوموړي گروپ ته ويناييل گروپ (Vinyl group) او که د هغې سره يوه، يوه گوني اړيکه تړل شوي وي د الايل گروپ (Allyl group) په نوم ياديږي.


The *vinyl group* and the *allyl group*.




The *vinyl group*



Bromo ethene or
vinyl bromide (common)



The *allyl group*



3-Chloro propene or
allyl chloride (common)

الکاداینونه (Alkadienes)

داینونه (Dienes)


هغه هایډروکاربنونه چې په خپل ترکیب کې دوه ، دوه گونې اړیکې ولري د (Diene) یا دای ایتلینې هایډروکاربنونو په نوم یادېږي. عمومي فورمول یې (C_nH_{2n-2}) دي.

د داینونو ډولونه (Types of Dienes):

داینونه په اصلي زنځیر کې د دوه گونې اړیکې د موقعیت په نظر په لاندې ډولونو ویشل کېږي.


i. متصل (یوځای) داینونه (Cumulated double bonds Dienes):

هغه حالت دي چې په هغې کې د دوه گونو اړیکو ترمنځ د کاربن یو اتوم شتون لري. بیلگه:



ii. مزدوج داینونه (Conjugated double bonds Dienes):

هغه حالت دي چې په هغې کې د دوه گونو اړیکو ترمنځ د کاربن دوه اتومونه شتون لري. بیلگه:



iii. پراکنده (گډوډ) داینونه (Isolated double bonds Dienes):

هغه حالت دي چې په هغې کې د دوه گونو اړیکو ترمنځ د کاربن څو اتومونه شتون لري. بیلگه:






– که په یو خطي، مشعب یا کرښیز هایډروکاربن کې یوه، دوه گونې اشتراکي اړیکه شتون ولري د (Mono olefine) په نوم یادېږي.

– که په یو خطي، مشعب یا کرښیز هایډروکاربن کې دوه، دوه گونې اشتراکي اړیکي شتون ولري د (Diene) په نوم یادېږي.

- که په یو خطي، مشعب یا کرئیز هایدروکاربن کې دري، دوه گونې اشتراکي اړیکې شتون ولري د (Triene) په نوم یادېږي.
- که په یو خطي، مشعب یا کرئیز هایدروکاربن کې څلور، دوه گونې اشتراکي اړیکې شتون ولري د (Tetraene) په نوم یادېږي.
- او که په یو خطي، مشعب یا کرئیز هایدروکاربن کې څو، دوه گونې اشتراکي اړیکې شتون ولري د (Polyene) په نوم یادېږي.

Cumulated او Isolated دوه گونې اړیکې په خپلو فزیکي او کیمیاوي خواصو کې معمولي الکینونو ته ورته دي، لکن ددې پر خلاف Conjugated دوه گونې اړیکې د خپل ثبات او فعالیت له کبله د نورو غیر مشبوع مرکباتو سره توپیر لري. د ډاینونو څو بیلگې:



:Butadiene


بوتادین ($\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$) مرکب د لمړي ځل لپاره په 1910 م کال کې د Sergei Vasilyevich Lebedev له خوا polymerize شو. او په 1926 م کال کې یې د ایتانولو څخه په لاس راوړ. د ربر پولیمیر د اول ځل لپاره د نوموړي ساینس پوه له خوا سنتیز شو. کله چې لمړی نړیواله جگړه پیل شوه طبیعي ربر د کموالي له آمله د مصنوعي ربر تولید ته پاملرنه زیاته شوه کله چې جگړه پای ته ورسیده بیا هم د مصنوعي ربر څیړنې جاري وساتل شوي. روسي پوه Ivan Ostromislensky د شلمې پېړۍ په پیل کې د مصنوعي ربر په سنتیز کې د پام وړ څیړنې سرته ورسولي.

د الکینونو لاسته راوړنه (Preparation of Alkenes)


د الکینونو د لاسته راوړلو لپاره زیاتره د حذفی تعاملاتو (هغه تعاملات چې د دوه اتومونو یا دوه مالیکولي جزونو د تعویض پرته د یو مرکب څخه خارجېږي) گټه اخیستل کېږي. د لاسته راوړلو ځینې طریقي یې په لاندې توگه دي:


1. د ډي هایډروجنیشن په واسطه:

a. د دغه عملیې په واسطه یو الکان ته تر 750°C پورې تودوخه ورکول کېږي ترڅو یو مالیکول هایډروجن له هغوي څخه بهر شي او الکین حاصل شي لکه د ایتلین د لاسته راوړلو لپاره ایتان مرکب ته تر 750°C پورې تودوخه ورکول کېږي. په نوموړي تعامل کې SiO_2 ، Al_2O_3 یا Cr_2O_3 کتلستونو څخه گټه اخیستل کېږي.










b. د الکانین د قسمي هایډروجنیشن څخه: Alkene د درې گونې اړیکې د قسمي کتلستي هایډروجنیشن څخه په لاس راځي. په نوموړي طریقه کې د لینډلار کتلست (Lindlar Katalysator Pd/BaSO_4) او یا د نیکل بروماید (Brown – Katalysator P-) (2 څخه گټه اخیستل کېږي).





2. **د الکولو د (Dehydration) څخه:** په لابراتوار کې الکولونو ته د H_2SO_4 په شتون کې $(160 - 200^\circ\text{C})$ تودوخه ورکول کېږي ترڅو د اوبو یو مالیکول د H_2SO_4 په واسطه جذب شي او الکین په لاس راشي.





3. **Cracking عملیه:** هغه الکانونه چي د کاربن د زیاتو اتومونو لرونکي دي او کم صنعتي ارزښت لري، د نوموړي عملیې په پایله کې الکینونه او د الکان کوچنې مالیکولونه په لاس راځي. د بیلګې په توګه:





Alexander M. Zaitsev
(1841 - 1910)



4. د الکیل هلايدونو (Dehydro Halogenation) عملیه:

په 1875 م کال کې روسي کیمیاپوه زایخووف (Alexander M. Zaitsev) ښکاره کړه چې د الکیل هلايدونو څخه د الکولو په شتون کې کولای شو د ایتلین د لړۍ مرکبونه په لاس راوړو.

a. د الکیل هلايدونو څخه د یو مالیکول (HX) جداکول: که چیرې یو الکیل هلايد چې د یو اتوم هلوجن لرونکي وي د KOH الکولي غلیظ محلول سره تودوخه ورکول شي الکینونه په لاس راځي.



b. د الکایل هلايدونو څخه د يو ماليکول هلوجن جدا کول: که چيرې يو الکایل هلايد په دوو مجاورو کاربنونو باندې د هلوجن دوه اتومونه ولري، د جستو سره تعامل کوي او د ايتلين د سلسلې مرکبات لاسته راځي.



دالکينو فزيکي خواص (Physical Properties):

دالکينو فزيکي خواص د الکانونو سره ورته دي.


1. ددې سلسلې لومړي درې مرکبونه د غاز په حالت، تر اولسم (17) کاربن پورې په مايع حالت او له هغوي پورته په جامد حالت پيدا کېږي.
2. ددې سلسلې مرکباتو د ويلى کيدو او جوش ټکى د کاربن د اتومونو شمير په زياتوالى سره په تدريجي ډول زياتېږي.
3. ددې سلسلې مرکبات په اوبو کې نه حلېږي خو په غير قطبي محلولونو کې لکه: بنزول، ايتر، کلوروفارم او داسې نورو کې حلېږي.
4. الکينونه د سوخيدو په حالت کې په روښانه لمبه سوځي.
5. الکينونه ضعيف قطبي خواص لري، علت يې په دوه گوني اړيکي په کاربنونو باندې د معوضونو درلودل دي.

د یو گونی، دوه گونی او دری گونی اړیکې تشکیل:


پوهیږو چې د کاربن عنصر په عضوی مرکباتو کې مرکزي (Central) او خورا اړین گڼل کیږي، هایدروکاربنونه چې د عضوی مرکبونو مهمه سرچینه ده او په هایدروکاربنونو کې د کاربن عنصر د درې ډوله اړیکو په درلودلو سره هایدروکاربني مرکبونه جوړوي یعنې نوموړی اړیکې د کاربن د انرژیکي سویو په دخالت سره منع ته راځي. دغه پټ راز د کیمیا پوهانو (Chemists) د علمي او عملي څیړنو محصول دي چې د ټولو د قناعت وړ ګرځیدلي دي.

دوه گونی اشتراکي اړیکې د لمړي ځل لپاره د مشهور روسي کیمیاپوه بوتلیروف (Alexander Mikhailovich Butlerov) له خوا معرفي شوي.


د میتان مرکب کې د کاربن او هایدروجن اتومونو ترمنځ حقیقي اړیکې او د هغوي موډلونه په لاندې توګه دي.




perspective formula
of methane




ball-and-stick model
of methane




د میتان د تیتراهدرال بڼه: په ۱۸۷۴ م کال Jacobus H. Van't Hoff (نیدرلنډ) او Joseph A. Le Bel (فرانسوي) د میتان په مرکب کې د کاربن څلور اړیکې په لاندې بڼه توضیح کړي.



a)




b)



c)



د ایتان، ایتلین او اسیتلین (ایتاین) په مرکبونو کې د اړیکو ترمنځ جوړښت او موډلونه په لاندې توګه توضیح کیږي.




perspective formula of ethane





ball-and-stick model of ethane




a double bond consists of one σ bond and one π bond




ball-and-stick model of ethene



a triple bond consists of one σ bond and two π bonds






ball-and-stick model of ethyne



د یو شمیر کوولانت اړیکو د عناصرو د اتومونو ترمنځ رابطوي انرژي او همدارنګه د هغوي ترمنځ فاصله په لاندې جدول کې بنودل شوي دي. جدول (20):

Bond	Bond Energy (Kcal/mol)	Length (Å)
C – H	99	1.09
C – C	90	1.54
C = C	174	1.33
C ≡ C	231	1.20
O – H	111	0.96
N – N	93	1.02
C – O	86	1.43
C = O	179	1.21
C – N	73	1.47
C – Cl	81	1.47
C – Br	68	1.91
C – I	51	2.12

په لاندې جدول کې د دریو هایډروکاربنی کورنیو په مهمو مرکبونو کې د اتومونو ترمنځ د اړیکو ځینې ځانګړتیاوې بنودل شوي دي. جدول (20):

Comparison of the Bond Angles and the Lengths and Strengths of the Carbon–Carbon and Carbon–Hydrogen Bonds in Ethane, Ethene, and Ethyne								
Molecule	Hybridization of carbon	Bond angles	Length of C—C bond (Å)	Strength of C—C bond (kcal/mol) (kJ/mol)		Length of C—H bond (Å)	Strength of C—H bond (kcal/mol) (kJ/mol)	
 ethane	sp^3	109.5°	1.54	90	377	1.10	101	423
 ethene	sp^2	120°	1.33	174	720	1.08	111	466
 ethyne	sp	180°	1.20	231	967	1.06	131	548


د پورته جدولونو څخه څرگنديږي چې هر څومره چې د اړيکو شمير زياتيږي په هماغه اندازه د اتومونو ترمنځ فاصله کميږي او د هغه په مقابل کې تجزيوی انرژي زياتيږي. پخوا د دوه گوني اړيکې په اړه داسې فکر کيده چې د الکيني مرکبونو د کاربن د دوه اتومونو ترمنځ دوه اړيکې شتون لري. نو بايد دغه دوه کاربنونه د خپلې اړيکې په واسطه ډيري ټينگې او مستحکمي اړيکې لري نسبت هغه کاربنونو ته چې په خپل منځ کې يو گونې يا ساده اړيکې لري. مگر اوس برخلاف د پورتنۍ مفکورې په اثبات رسيدلي چې د جفته اړيکې شتون په يو ماليکول يا هايډروکاربن کې د ماليکول فعاله برخه رامنځ ته کوي او ماليکول ته دا وړتيا وربخښي چې جمعي تعاملونه او اکسديشن تعاملات د ځان څخه ښکاره کړي.

دالکينو کيمياوي خواص (Chemical properties):


دالکينو جمعي تعاملات عموماً په دوه گوني اړيکه سرته رسيږي، چې په دې صورت کې الکينونه په الکانونو تبديليږي.





1. هايډروجنېشن (Hydrogenation):

په دې تعامل کې د ايتلين د سلسلې مرکبونه د هايډروجن سره د (Ni, Pt, Pd) اونورو ارجاع کوونکو کتليستونو او لوړ فشار په شتون کې يوځای کيږي او د الکان د سلسلې مرکبونه جوړوي.




نوري بيلگي يې په لاندې توگه دي:





د هایدرو هالیدونو سره دالکینو تعامل:

د هایدرو هالیدونو تعامل هم له متناظر الکینونو سره او هم له غیرمتناظر الکینونو سره صورت نیسي. د متناظر الکینونو سره فقط یو محصول په لاس راځي. لکه په لاندې مثال کې د هایدروجن بروماید سره:



Ethylene

Ethyl Bromide

د غیر متناظر الکینونو سره د تعامل په پایله کې دوه ډوله محصول چې یو د بل ایزومیر


گڼل کېږي، لاسته راځي. د بیلګې په توګه د Propene سره د HBr د تعامل په نتیجه کې لاندې مرکبات حاصلېږي.



د مارکوفنیکوف د نظریې سره سم یو د پورته مرکباتو څخه حاصلېږي.

د مارکوفنیکوف قاعده (Markovnikov's Rule):

په ۱۸۷۰ م کال روسي پوه مارکوفنیکوف^(۱) ثابته کړه چې د الکینونو سره د هایډروهلایډنو د تعامل په پایله کې، لمړي هایډروجن د هغه کاربن سره وصل کېږي چې د هایډروجنونو شمیر یې زیات وي، وروسته هلو جن په هغه کاربن نصب کېږي چې د هایډروجنونو شمیر یې نسبتاً کم وي.




Vladimer Vasilevich Markovnikov
(1837 - 1904)

۱- ولادیمیر واسیلیف مارکوفنیکوف (1837 – 1904): مارکوفنیکوف (Markovnikov) په روسیه کې زیږدلی وو او د یو پوځي افسر ځوي وو. د Kazan، Odessa او Moscow په پوهنتونونو کې د کیمیا پروفیسور وو. نوموړي ځینې کیمیاوي مواد د کیمیاوي جوړښت د پېش بینې په بنسټ په مصنوعي (سنتیز) توګه تهیه کړل. نوموړي په مالیګول کې د اتومونو متقابلې اغیزې یو پېرل، مطالعه او وڅیړلې. د هغه هڅې او څیړنې د خپل هیواد د طبیعي سرچینو (په ځانګړې توګه نفتو) په اړه د هغه د شهرت سبب وګرځید، همدارنګه د هغه څیړنې د خپلو خلکو د هوسا ژوند د تامین سبب شوي.




که څه هم چې مارکوفنیکوف خپله قاعده په ۳۳ کلنۍ کې وړاندې کړه خو د هغه د څیړنو پایله په خپله مورنۍ ژبه چاپ او خپره شوه، چې دده د کشف څخه ۳۰ کاله وروسته د نړۍ د کیمیاپوهانو د پاملرنې وړ وګرځیده.

Addition of HBr to 1-butene:




2. هایدريشن (Hydration):


د دغه تعامل څخه د فاسفېټي (H_3PO_4) يا المونيم سليکيت د کتلستونو، زيات فشار او 300°C تودوخې په شتون کې دوهمي او دريمي الکول په لاس راځي، اما اولي الکول په ځانگړي توگه ايتانول د ايتلين او اوبو د تعامل څخه په لاس نه راځي.




3. د الکينونو تعامل د سلفوريک اسيد (H_2SO_4) سره:

دغه تعامل هم متناظر الکينونو سره او هم د غيرمتناظر الکينونو سره جمعي تعامل سرته رسوي. تجربو ښودلي ده چې د سلفوريک سره د غيرمتناظر الکينونو تعامل چې د اوږد زنځير لرونکي وي په ښه او اسانه توگه صورت نيسي. عموماً غليظ سلفوريک اسيد په عادي او کمه تودوخه کې د الکينونو سره د مارکوفنيکوف د قاعدې په بنسټ صورت نيسي او له هغه څخه د سلفوريک اسيد الکايل مرکبات (د سلفوريک اسيد تيزابي ايتري) لاسته راځي.





الکایل سلفوریک اسید (الکایل هایدروجن سلفیت) د تودوخې په واسطه د اوبو سره تعامل کوي او الکول په لاس راځي. نوموړي طریقه د الکولونو د لاسته راوړلو او په خاصه توګه د ایتایل الکولو او ایزو پروپایل الکولو لپاره په کار وړل کېږي.



د ایتلین د سلسلې د مرکباتو د استعمال ځایونه (Usage of Ethylene Coumpounds):

ایتلین د الکینونو د لړۍ لمرني هایدروکاربن دي چې د هغه 90% په صنعت کې د پولی ایتلین (Poly Ethylene)، پولی وینایل کلوراید (P.V.C) (Poly Vinyl Chloride)، ایتلین اکساید، سټایرینونو (Styrenes) او نورو مرکباتو د جوړونې او لاسته راوړلو لپاره په کار وړل کېږي. ایتلین په طبیعت کې په ازاده توګه شتون نه لري بلکه د طبیعي ګاز (Natural gas) د تصفیې او همدارول د نفتو د کانونو د ګازاتو د Cracking څخه په لاس راځي. د ایتلین مخلوط د هوا سره انفلاقي خاصیت لري. د ایتلین ګاز بې رنګه دي، خوږ خوند لري. په اوبو کې ډیر کم حلېږي اما په الکولو او ایترو کې زیات حلېږي. پروپلین (Propylene) هم ګاز حالت لري چې په طبیعت کې په ازاد ډول شتون نه لري بلکه په صنعت کې د نفتو د ګازاتو د Cracking او همدارنګه د پروپان د ډي هایدروجینشن څخه استحصال کېږي. او له هغه څخه د لمرني مادي په توګه د ایزوپروپایل الکولو، اسیتون، ګلیسرین، پولی پروپلین او د بیلابیلو پلاستیکونو د جوړولو لپاره کار اخیستل کېږي.

الکاینونه Alkynes یا د Acetylene سلسله

الکاینونه غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي چې په مالیکول کې یوه درې گوني اړیکه لري، او عمومي فورمول یې C_nH_{2n-2} دی. او د کړیوال الکاین عمومي فورمول C_nH_{2n-4} دی. په الکاین کې درې گوني اړیکه د دوه گوني او درې گوني اړیکې په پرتله ډیره لنډه ده. ځکه چې د درې گوني اړیکې کاربنونه د شپږو اړیکو په واسطه سره محکم تړل شوي دي. په الکاینونو کې د درې گوني اړیکې کاربنونه د sp هایبرید شوي اړتالونه لري. او په خپل منځ کې 180° درجې زاویه جوړوي. د الکاین درې گوني اړیکې هایبرید شوی اړتالونه د الکین او الکین په پرتله قوي الکترونیگاتیف دي. په یوه گوني، دوه گوني او درې گوني اړیکو کې د کاربن - کاربن ترمنځ د اړیکې اوږدوالی او هایبرید یزیشن حالت په لاندې جدو کې ښودل شوی دی:

جدول (22):

Carbon-Carbon Single Bond Lengths and Hybridization State

Compound	Hybridization State	Bond Length (Å)
H_3C-CH_3	sp^3-sp^3	1.54
$H_2C=CH-CH_3$	sp^2-sp^3	1.50
$H_2C=CH-CH=CH_2$	sp^2-sp^2	1.47
$HC\equiv C-CH_3$	$sp-sp^3$	1.46
$HC\equiv C-CH=CH_2$	$sp-sp^2$	1.43
$HC\equiv C-C\equiv CH$	$sp-sp$	1.37

د الکاینونو نوم ایښودنه (Nomenclature of Alkynes):

I. عمومي طریقه (Common method):




په دغه طریقه کې د الکانونو د ane اړوند وروستاړي پر ځای د $(-yne)$ وروستاړي کارول کېږي. بیلگې:

جدول (23):

الکان	الکاین	د الکاین فورمول
Ethane	Ethyne	$\text{HC} \equiv \text{CH}$
Propane	Propyne	$\text{HC} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$
Butane	Butyne	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{CH}$
Pentane	Pentyne	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{CH}$
Hexane	Hexyne	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{CH}$
Heptane	Heptyne	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_2 - \text{C} \equiv \text{CH}$


II. د IUPAC په میتود د الکاینونو نوم ایښودنه:

هغه اصول چې د الکینو په نوم ایښودنه کې شته دی په الکاینو کې هم په نظر کې نیول کیږي، خو البته د الکاین په نوم ایښودنه کې د الکین د ene ورستاري په ځای د yne ورستاري ذکر کیږي. لاندې بیلگو کې یې ویني:



د الکاینو لاسته راوړنه (Preparation of Alkynes):



1. الکانونه د الکینونو د ډي هایډروجنیشن څخه لاسته راځي:



2. د الکایل ډاي هلايد څخه د دوه اتومه هلوجن په وتلو سره:


a. د الکایل ډاي هلايد د دوو مجاورو کاربنونو څخه د دوه اتومه هلوجنونو خارجول:


مثلاً د (2-1) ډاي برومو پروپان، مرکب څخه د پروپان تهيه کول د تودوخې او د KOH او NaNH₂ د محلول سره.





b. د هغه دوه اتومه هلوجنونو بهر کول چي د الکایل ډاي هلايد په يو کاربن باندې نصب وي:

مثلاً د (2-2) ډاي برومو پروپان، مرکب څخه د پروپان تهيه کول په دوو پړاوونو کې.





3. د هلايد مگنيزيم هلايد د معيار سره د الکايل هلايدونو تعامل:



د الکاينونو فزيکي خواص (Physical Properties):

هغه الکاينونه چې د 2 څخه تر 4 پوري د کاربن اتومونه لري د گاز حالت لري او هغه چې د د کاربن د اتومونو شمير يې 5 څخه تر 16 پوري وي مایع حالت دي پاتې نور يې جامد حالت لري. د الکاينونو د ايشيدو ټکي او کثافت د هم کاربنه الکينونو په نسبت لوړ دي. ټول هايډرو کاربنونه يې يو شان فزيکي خواص لري، ټول يې په اوبو کې حلېږي يعنې په اوبو کې د الکاينونو د انحلال وړتيا د الکينونو او الکانونو په نسبت زياته ده، الکاين هم د نورو هومولوگي سلسلو په شان د جوش او ویلي کيدو ټکی يې د کاربن د اتومونو د شمير سره زياتېږي. الکاينونه د الکينو په پرتله زياتره په خطي ډول وي، دري گوني اړيکه د دوه گوني په پرتله زياته تفکیک کېږي، غټ مالیکولونه يې د ايشيدو لوړ ټکي لري او کوچني مالیکولونه يې د ايشيدو ټيټ ټکی لري.


د الکاینونو کیمیاوي خواص (Chemical Properties):

د الکاینونو اکثره تعاملات الکتروفيلي جمعي تعاملات دي او د الکاینونو د تعاملاتو سره ورته والي لري. لاکن د الکاینونو جمعي الکتروفيلي تعاملات په دوو پړاوونو کې سرته رسيږي، په لمړي پړاو کې الکاینونه او په دوهم پړاو کې الکانونه او د هغوی مشتقات تولید کېږي. څرنگه چې د الکاینونو غیرمشبوعیت د الکاینونو په پرتله زیات دي نو د هغوی تعاملات د الکتروفیل مرکباتو سره په اسانې صورت نیسي.

د الکاینونو مهم جمعي تعاملات عبارت دي له:



1. د هلوچنونو سره تعاملات (Halogenation):

الکاینونه د هلوچنونو سره په دوو پړاوونو کې تعامل سرته رسوي. الکاین په لومړي پړاو کې د برومین یا کلورین یو مالیکول سره جمعي تعامل ترسره کوي چې الکین ورڅخه لاسته راځي، بیا په دویم پړاو کې د برومین یا کلورین دویم مالیکول سره جمعي تعامل په صورت کې الکانونه جوړوي.





2. د هایډرو هالیدونو سره جمعي تعامل:

د استلین سره د HCl تعامل په لمړي مرحله کې د Vinyl Chloride مرکب او په دوهمه مرحله کې ډاي کلورو ایتان تولیدوي.




الکاین یو نیوکلئوفیل دي لومړي پړاو کې الکاین د هایډروجن ایون (پروتون) سره چې یو الکتروفیل دی د مارکوفنیکوف اصولو له مخې یو ځای کېږي، او الکین هلاید جوړوي. د الکین هلاید سره د هایډروجن هلاید دویم مالیکول د جمعي تعامل په نتیجه کې جیمینل (Geminal) یا غبرگ هلوجن لرونکي ډای هلوجن الکین لاسته راځي. لکه په لاندې مثال کې:



کله چې د الکاین سره هایډروجن هلاید د تعامل په وخت کې پراکساید موجود وي نو تعامل د مارکوفنیکوف اصولو خلاف صورت نیسي:

Anti-Markovnikov addition of HBr to alkynes occur when peroxides are present.


These reactions take place through a free radical mechanism.



3. دالکاینونو هایدروجنیشن (Hydrogenation):


الکاین د کتلست په شتون کې د هایدروجن سره تعامل کوي او د الکین مرکب لاسته راځي بیا الکین د هایدروجن سره د کتلست په شتون کې د الکان د کورنۍ مرکبونه جوړوي.

General Reaction:





4. دالکاینونو هایدریشن (Hydration):

الکاینونه د ځانگړي میکانیزم (Mechanism) له مخې د اوبو سره یو ځای کېږي، لمړي الکول او بیا الډیهایډ جوړوي.




د استلین استحصال (Preparation of Acetylene):

1. اسیتلین په صنعت کې د Cracking د عملیې په واسطه په 1500°C تودوخه کې د میتان او اتلین څخه تهیه کېږي.



2. **لابراتواري طريقه:** د کلسيم کاربايد او اوبو د تعامل په پايله کې استلين لاسته راځي. نوموړي تجربه اول ځل لپاره په 1862 م کال کې الماني کيمياپوه فريدرېخ وهلر (Fredrick Wöhler) سرته ورسوله.



د الکاینونو د استعمال ځایونه (Usage of Alkynes):

استلين په عادي حالت کې یو بې رنگه سمی، پایدار او د اوراخیستنې وړ گاز دی. په هوا کې په ژیره لمبه سوځي. د هوا سره د استلين مخلوط د زیات فشار په اغیزه انفلاق او چاودنه کوي نو له همدې امله د هغه په وړلو راوړلو کې د پېرو فولادي کپسولونو څخه ګټه اخیستل کېږي او د چاودنې څخه د مخنیوي په موخه هغه ته یوه اندازه اسیتون اضافه کېږي. د استلين د احتراق څخه 1300 کیلو ژول في مول تودوخه آزادېږي. د هوا د اکسیجن سره د استلين لمبه نږدې 3000°C مول تودوخه تولیدوي. نو له همدې کبله د نوموړي گاز څخه په تخنیک کې د فلزاتو په ولډینگ کاري (Welding)، ویلې کولو او غوڅولو کې کار اخیستل کېږي. په نولسمه پېړۍ کې د کاربایدونو سره د استلين د گاز مخلوط څخه د څلورلارو د څراغونو د روښانولو لپاره ګټه اخیستل کیده. استلين اسید خاصیت لري، په طبیعت کې په آزاد حالت نه موندل کېږي بلکه د طبیعي سرچینو څخه او همدا ډول په صنعتي توګه تهیه کېږي.

اووم خپرکې


الکایل هلايدونه (د الکانونو هلوچن لرونکي مشتقات)

(Alkyle Halides)


الکایل هلايدونه هغه مرکبات دي چي د الکانونو سره د هلوچنونو د تعامل په پايله کي لاسته راځي. الکایل هلايدونه د الکایل هلوچنيدونو (Alkyl Halogenide) او هلو الکانه (Halo Alkane) په نوم هم ياديږي.

د هلوچنونو سره د الکانونو تعامل تعويضي وي چي د هايډروچن يو يا څو اتومونه د هلوچن د يو يا څو اتومونو سره د تودوخې يا ماوراء بنفش وړانگو په شتون کي تعويض کيږي او تعامل صورت نيسي. د الکایل هلايدونو عمومي فورمول عبارت دي له: $(R - X)$ يا $(C_nH_{2n+1} + X)$. په ټولېزه توگه الکایل هلايدونه د (Organic Halides) په نوم ياديږي يعني ټول هغه مشبوع او غير مشبوع هايډروکاربنونه چي د هلوچن لرونکي وي د (Organic Halides) په نوم ياديږي. د طبيعي سرچينو څخه په لاس نه راځي. بلکه په صنعتي ډول او د کيمياوي تعاملاتو په پايله کي توليديږي.

الکایل هلايدونه هم د ساختماني ايزومرونو لرونکي دي. ايزوميري يې د پروپان هلوچن لرونکي مرکب څخه پيل کيږي. هرڅومره چې د کاربن شمير زياتيږي نو د ايزومرونو شمير يې هم زياتيږي. لاندې بيلگي په نظر کي نيسو.




n - Propyl Chloride
(Bp = 34.8°C)



Iso Propyl Chloride
(Bp = 46.6°C)

هغه الکایل هلايدونه چي د يو هلوچن لرونکي وي د (Mono Halide) په نوم ياديږي، او هغه چي د دوو څخه زيات هلوچنونه لري د عالي الکایل هلايدونو (الکایل ټولي هلايد) په نوم ياديږي.

د الکایل هلايد طبقه بندي په لاندې ډول توضیح کیږي.



د الکایل هلايدونو نوم ایښودنه (Nomenclature of Alkyl Halides):

الکایل هلايدونه په دوو طریقو سره نومول کیږي.

I. معمولي طريقه (Ordinary method):

په دغه طريقه کې لمړي د الکایل نوم وروسته د اړونده هلوچن نوم ذکر کیږي. بیلگې:

(CH₃ – CH₂ – I) Ethyl Iodide

(CH₃ – CH₂ – CH₂ – Cl) Propyl Chloride

(CH₃ – CH₂ – CH₂ – CH₂ – Br) Butyl Bromide

II. د IUPAC په طريقه د الکایونو نوم ایښودنه:

i. د هغه الکایل هلايدونو په نومونه کې چې د یو هلوچن لرونکي وي، لمړي د هلوچن نوم وروسته د اړونده الکای نوم ذکر کیږي. د بیلگې په توګه:

(CH₃ – CH₂ – I) Iodo Ethane

(CH₃ – CH₂ – CH₂ – Cl) Chloro Propane

(CH₃ – CH₂ – CH₂ – CH₂ – Br) Bromo Butane

ii. هغه الکایل هلايدونه چې دوه یا زیات ورته هلوچنونه لري. لاندې ټکې باید مراعات شي:

1. د اصلي زنځیر نوم ټاکل کیږي.






2. د اصلي زنځیر د کاربن اتومونو باندې شماره لیکل کیږي.

3. شمیره له هغه طرفه پیل کیږي چې هلوجن لرونکي کاربن تر ټولو کوچني شماره واخلې.

4. د الکایل هلايد د لیکلو او لوستلو لپاره لمړي د هغه کاربن نوم ذکر کیږي چې هلوجن ورباندي نصب وي، وروسته د هلوجن نوم او په پای کې د الکایل د اصلي زنځیر نوم ذکر کیږي.

5. هغه الکایل هلايدونه چې دوه یا څو مختلف غیر مشابه هلوجنونه لري، د هلوجنونو نوم او د اصلي زنځیر شماره لیکل د لاتین تورو په ترتیب سره ذکر کیږي.


بیلگي:



د ځينو مشبوع ، غير مشبوع او کړيوالو هلوچن لرونکو مرکباتو نومونه په لاندي توگه نومول کيږي.




Di Chloro methane
(Methylene Chloride)



2 - Chloro - 3 - methyl Pentane




Tri Chloro methane
(Chloroform)




1 - Bromo - 3 - Hydroxy Cyclo Hexane




Tetra Chloro methane
(Carbon tetra Chloride)




4 - Chloro Cyclo Hexene




2 - Chloro - 1 - Ethylene
(Vinyl Chloride)




3 - Chloro - 1 - Propene
(Allyl Chloride)




2-bromo-4-ethyl-7-methyl-4-octene
not
7-bromo-5-ethyl-2-methyl-4-octene
because 4 < 5




6-bromo-3-chloro-4-methylcyclohexene
not
3-bromo-6-chloro-5-methylcyclohexene
because 4 < 5



para-dichlorobenzene
used in mothballs



1,1,1-tri chloro ethane



2-bromo-2-chloro-1,1,1-tri fluoro ethane (Halothane)

فيزيکي خواص (Physical properties):

الکايل هلايدونه د زيات ماليکولي وزن په درلودلو سره د الکانونو په پرتله چي د کاربنونو شمير يې سره ورته وي. د ويلى کيدو لوړ ټکي لري. الکايل هلايدونه په اوبو کي نه حل کيږي ځکه د هايډورجني اړيکو د جوړولو وړتيا نه لري. خو په عضوي محلولونو کي حل کيږي. د مونو کلورايد ترکيبات د اوبو څخه سپک وي په داسي حال کي چي مونو برومايدونه، مونو کلورايدونه او د الکايل هلايدونو پولي کلور، پولي بروم او پولي آيود ترکيبات د اوبو څخه سپک وي.

کلوروميټان، بروموميټان او کلوروميټان گاز حالت لري، آيودو ميتان او برومو ميتان مايع وي. د الکايل هلايدونو د ايشيدو ټکي د هغوي د ترکيبي هلوځونو د ډول په نظر سره توپير لري. په لاندې جدول کي د عضوي هلايدونو د ځينو مرکباتو د ويلى کيدو ټکي او کثافت ښودل شوي دي.

جدول(24):

Organic Halides



Group	Fluoride		Chloride		Bromide		Iodide	
	bp (°C)	Density (g mL ⁻¹)	bp (°C)	Density (g mL ⁻¹)	bp (°C)	Density (g mL ⁻¹)	bp (°C)	Density (g mL ⁻¹)
Methyl	-78.4	0.84 ⁻⁶⁰	-23.8	0.92 ²⁰	3.6	1.73 ⁰	42.5	2.28 ²⁰
Ethyl	-37.7	0.72 ²⁰	13.1	0.91 ¹⁵	38.4	1.46 ²⁰	72	1.95 ²⁰
Propyl	-2.5	0.78 ⁻³	46.6	0.89 ²⁰	70.8	1.35 ²⁰	102	1.74 ²⁰
Isopropyl	-9.4	0.72 ²⁰	34	0.86 ²⁰	59.4	1.31 ²⁰	89.4	1.70 ²⁰
Butyl	32	0.78 ²⁰	78.4	0.89 ²⁰	101	1.27 ²⁰	130	1.61 ²⁰
sec-Butyl			68	0.87 ²⁰	91.2	1.26 ²⁰	120	1.60 ²⁰
Isobutyl			69	0.87 ²⁰	91	1.26 ²⁰	119	1.60 ²⁰
tert-Butyl	12	0.75 ¹²	51	0.84 ²⁰	73.3	1.22 ²⁰	100 dec ^a	1.57 ⁰
Pentyl	62	0.79 ²⁰	108.2	0.88 ²⁰	129.6	1.22 ²⁰	155 ⁷⁴⁰	1.52 ²⁰
Neopentyl			84.4	0.87 ²⁰	105	1.20 ²⁰	127 dec ^a	1.53 ¹³
CH ₂ =CH-	-72	0.68 ²⁶	-13.9	0.91 ²⁰	16	1.52 ¹⁴	56	2.04 ²⁰
CH ₂ =CHCH ₂ -	-3		45	0.94 ²⁰	70	1.40 ²⁰	102-103	1.84 ²²
C ₆ H ₅ -	85	1.02 ²⁰	132	1.10 ²⁰	155	1.52 ²⁰	189	1.82 ²⁰
C ₆ H ₅ CH ₂ -	140	1.02 ²⁵	179	1.10 ²⁵	201	1.44 ²²	93 ¹⁰	1.73 ²⁵

د هایدروجن او هلوجن ترمنځ د اړیکو اوږدوالي او فاصله په لاندې جدول کې ښودل شوي ده. جدول (25):



Hydrogen–Halogen Bond Lengths and Bond Strengths				
Hydrogen halide		Bond length (Å)	Bond strength kcal/mol kJ/mol	
H—F		0.917	136	571
H—Cl		1.2746	103	432
H—Br		1.4145	87	366
H—I		1.6090	71	298

د الکایل هالیدونو کیمیاوي خواص (Chemical properties):



1. الکایل هالیدونه د اوبو سره تعامل کوي، اولي الکولونه او هایدرو هالیدونه لاسته راځي.



2. الکایل هالیدونه د NaOH سره تعویضي تعامل کوي، الکولونه او سودیم هالیدونه تولیدوي.




3. د الکایل هالیدونو او امونیا د تعامل څخه د امین مرکبات تولیدیږي.



د الکایل هلايدونو لاسته راوړنه (Preparation of Alkyl Halides):

1. د الکانونو او هلوچونو ترمخ تعويضي تعامل:





د الکان د سلسلې مرکبات د هلوچونو سره تعويضي تعامل سرته رسوي، الکایل هلايدونه لاسته راځي.





1. $CH_4 + Cl_2 \longrightarrow CH_3-Cl + HCl$
2. $CH_3-Cl + Cl_2 \longrightarrow CH_2-Cl_2 + HCl$
3. $CH_2-Cl_2 + Cl_2 \longrightarrow CH-Cl_3 + HCl$
4. $CH-Cl_3 + Cl_2 \longrightarrow CCl_4 + HCl$

2. الکولونه د هايډروهايدونو، فاسفورهايدونو او تيونيل کلورايد سره تعامل کوي، الکایل هلايدونه لاسته راځي.




a. د H_2SO_4 په شتون کي الکولونه د هايډورهايدونو ($H-X$) سره تعامل کوي:



b. د الکولونو او فاسفورس هلايد (PX_3) تعامل:





c. د الكولونو او تيونيل كلورايد (SOCl₂) تعامل:





3. د غير مشبوع هايډروكاربنونو او هايډرو هالايدونو جمعي تعامل:


a. د الكينونو سره د (H-X) تعامل:



b. د الكينونو سره د (H-X) تعامل:



4. **Alexander Borodin تعامل:** په 1861 م کال کې Borodin د نقری اسیتیت څخه میتایل بروماید لاسته راوړ. د تعامل عمومي بڼه په لاندې توګه ده. نوموړي تعامل د Hunsdiecker په نوم هم یادېږي. خو نوموړي تعامل د لمړي ځل لپاره د Borodin له خوا منع ته راغلې دي.



د الکایل هلايدونو د مهمو او با ارزښته مرکباتو عمومي او طبی استعمال د الکانونو او د هغوي د مشتقاتو استعمال او طبی ارزښت تر عنوان لاندې توضیح شوي دي.


اتم خپرکې

د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مشتقات

الکولونه (Alcohols)

که چیرې په یو الکان کې د هایدروجن یو اتم د هایدروکسیل د یو ګروپ په واسطه تعویض کړو الکول لاسته راځي. یعنې الکولونه هغه مرکبات دي چې د هغوي په جوړښت کې د الکیل رادیکل (R) او د هایدروکسیل ګروپ شتون لري. د الکولو عمومي فورمول (R-OH) دي.


ځنې وختونه د اوبو مونو الکیل (Mono Alkyl) مشتقات د الکولو په نوم یادېږي ځکه که د اوبو یو اتم هایدروجن د الکیل ګروپ په واسطه عوض شي نو الکول لاسته راځي.



الکولونه د (OH) د ګروپ په نظر په لاندې ډولونو ویشل کېږي.


1. **یو قیمت الکول (Mono hydroxy Alcohol):** که د الکانونو یو اتم هایدروجن د OH په

یو ګروپ تعویض شي نو یو قیمت الکول لاس ته راځي چې عمومي فورمول یې $R - OH$ یا $(C_nH_{2n+1} + OH)$ دي. بیلګه:




2. **دوه قیمت الکول (Di hydroxy Alcohol):** که چیرې د الکانونو دوه هایدروجن اتمونه

د OH په دوو ګروپونو تعویض شي نو دوه قیمت الکول په لاس راځي چې عمومي فورمول یې $(C_nH_{2n} + 2OH)$ دي. بیلګه:



Ethylene Glycol


3. **دري قيمته الكول (Tri hydroxy Alcohol):** كه چيري د الكانونو دري هايډروجن اتومونه د OH په دريو گروپونو عوض شي نو دري قيمته الكول په لاس راځي چي عمومي فورمول يې $(C_nH_{2n} + 3OH)$ دي. بيلگه: گليسرين (تراي هايډروكسي پروپان).





اکثره وخت دري قيمته الكول د څو قيمته الكولو په نوم هم ياديږي.

يو قيمته الكول د راډيکل د شمير په نظر په لاندي گروپونو ويشل کېږي.




1. **اولي الكول (Primary Alcohol):** د هغه الكولو څخه عبارت دي چي په هغوي کې د OH گروپ د هغه کاربن سره اړيکه لري چي د يو عضوی معوض لرونکي وي. عمومي فورمول يې عبارت دي له:



2. **دوهمي الكول (Secondary Alcohol):** د هغه الكولو څخه عبارت دي چي په هغوي کې د OH گروپ د هغه کاربن سره اړيکه لري چي د دوو عضوی معوضونو لرونکي وي. عمومي فورمول يې عبارت دي له:




3. **دریمي الکول (Tertiary Alcohol):** د هغه الکولو څخه عبارت دي چي په هغوي کې د OH گروپ د هغه کاربن سره اړیکه لري چي د دریو عضوی معوضونو لرونکي وي. عمومي فورمول يې عبارت دي له:



د الکولونو نوم ایښودنه (Nomenclature of Alcohols):

1. معمولي نوم ایښودنه (Ordinary Nomenclature):

په دغه طریقه کې لمړي د اړونده رادیکل نوم او ورپسې د Alcohol کلیمه ذکر کېږي. بیلگي:



II. عمومي طريقه (Common Nomenclature):

لمري د alcohol کليمه وروسته د راډيکل له نوم سره د (- ic) وروستاړي يوځاي کېږي.

Alcohol Methylic $\text{CH}_3 - \text{OH}$

Alcohol Ethylic $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{OH}$

Alcohol Propylic $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$

III. د IUPAC په لاره د الکولونو نوم ايښودنه:



1. د يو قيمته الکولو په نوم ايښودنه کې چې د هغوي فورمول په اوږد ډول وي،

د (- e) د توري په عوض چې د اړونده الکان په اخر کې وي د (- ol) کليمه ذکر کېږي. لکه

Methane – Methanol, Ethane – Ethanol, Propane – Propanol

2. د دوه قيمته، درې قيمته او څو قيمته الکولو په نوم ايښودنه کې په ترتيب سره د

هغوي د اړونده الکان په اخر کې د diol، Triol او Pol وروستاړي ذکر کېږي لکه:



که د الکولو په فورمول کې د OH گروپ دريو څخه زيات وي نو Polyol لوستل کېږي.


3. په نارمل الکولونو کې چې د هغوي د OH گروپ د اوږد زنځير د مختلفو کاربنونو

سره وصل وي د زنځير په کاربنونو شماره ليکل کېږي شماره له هغه طرفه پيل


کېږي چې د OH گروپ نږدې وي لمري د هغه کاربن نوم اخيستل کېږي چې د OH

گروپ ورباندې نصب وي وروسته د (A) د قاعدي په رعايت کولو سره د الکولو


نوم اخيستل کېږي. بيلگي:



1 - Propanol




2 - Propanol




2 - Butanol

4. په منشعب او غیر مشبوع الکولو کې شماره له هغه طرفه پیل کېږي چې OH گروپ کاربن د الکایل د گروپ، د دوه گوني او يا درې گوني اړیکې په پرتله کوچني عدد ولري.

بیلگي:




4 - Methyl - 2 - Pentanol




2,3 - Di methyl - 1 - Butanol


ځينې نورې بیلگي:




4 - Penten - 2 - ol




3 - Pentyene - 2 ol



3 - Methyl Cyclo Petanol



1,3 – Butan diol



1,2,3 – Butan triol

د الکولونو فزیکي خواص (Physical properties):

د یو قیمتته الکولو کوچنې مالیکولونه بې رنگه او خنثی مایع دي. چي ځانگړي بوي، تريخ او سوی خوند لري. د الکولونو د ځانگړتیاوو څخه یو هم دادي چي هر څومره چي زنځیر اوږد وی په هماغه اندازه یې د ایشیدو ټکې پورته ځي نو په دي ډول لمړنې الکولونه د مایع په حالت او هغه الکولونه چي زنځیر یې اوږد وي د جامد په حالت دي، الکولونه په اوبو کې په هر نسبت حلېږي مگر د هغوي انحلالیت د زنځیر د اوږدوالي په نظر توپیر لري.

هغه الکولونه چي د 1 – 4 کاربن اتومونه لري په اوبو کې ښه منحل دي، منځنی الکول چي د کاربن اتومونه یې 5 – 11 وي تیل ډوله مایع ده په اوبو کې په یو ټاکلي اندازه منحل دي، هر څومره چي زنځیر اوږدېږي په هماغه اندازه یې انحلالیت کمیږي، په الکانونو کې مو وڅیړل چي په اوبو کې نامنحل دي، دا چي ولی الکولونه په اوبو کې منحل او الکانونه نامنحل دي په لاندې توگه تشریح کېږي.

که الکولونه د اوبو سره پرتله کړو لیدل کېږي چي د دوي ترمنځ ورته والی شته دی ځکه چي د الکولونو عمومي فورمول $(\text{C}_n\text{H}_{2n} + \text{OH})$ اود اوبو $\text{H} - \text{OH}$ دی.

نو په دي توگه د الکولو او اوبو ترمنځ یوه اړیکه شته دی او د همدې امله یو په بل کې حلېږي، همدارنگه که چیري د الکولونو او الکانونو د ایشیدو ټکې سره پرتله کړو یو ستر توپیر په کې لیدل کېږي. د الکولونو کثافت د یو څخه کم دي، یواځي د ځینو اروماتیک الکولونو

کثافت د یو څخه لوړ دي په لاندې جدول کې د یو شمیر الکولونو د ویلی کېدو ټکې، ایشیدو ټکې او کثافت پرته شوي دي.



د ځینو الکولونو فزیکي خواص: جدول (26):

د الکولو نوم	د الکولو فورمول	د ویلی کېدو ټکې °C	د جوش ټکې °C	کثافت
Methanol	CH ₃ – OH	- 97.8	64.9	0.78
Ethanol	CH ₃ – CH ₂ – OH	- 114.7	78.4	0.79
Propanol	CH ₃ – (CH ₂) ₂ – OH	- 126.5	97.4	0.80
2 – Propanol	CH ₃ – CHOH – CH ₃	- 89.5	82.4	0.78
Butanol	CH ₃ – (CH ₂) ₃ – OH	- 89.5	117.2	0.77
Iso Butanol	CH ₃ – CH ₂ – CHOH – CH ₃	- 114.5	99.5	0.76
Pentanol	CH ₃ – (CH ₂) ₄ – OH	- 79	137.3	0.81

د الکولونو کیمیاوي خواص (Chemical properties):



1. سوځیدنه (Combustion):

الکولونه په ازاده هوا کې د تودوخې په ورکولو سره سوزي او له هغوي څخه د هایدروکاربنونو په څیر د CO₂ گاز، اوبه او یوه اندازه انرژي تولیدیږي لکه د میتایل الکولو او ایتایل الکولو سوزیدل.





2. د الکولونو (Oxidation):

د اولي الکولو د اکسیدیشن څخه د CuO په واسطه لمړي الډیهایډ او وروسته کاربوکسلیک اسید لاسته راځي.





3. د الکولونو (Dehydration):



a. د یو مالیکول الکول د ډي هایډریشن په پایله کې، د تودوخې او H_2SO_4 اوبه جذبوونکې مادې په شتون کې Alkene حاصلیږي.



b. د دوه مالیکوله الکولو د ډي هایډریشن په نتیجه کې، د تودوخې او H_2SO_4 په شتون کې ایتر لاسته راځي.





c. الکولونه د H_2SO_4 سره مستقیم تعامل کوي، د یو مالیکول اوبو په بهر کېدو سره تیزابي مالګي لاسته راځي.





د الکولو لاسته راوړنه (Preparation of Alcohols):

د الکولو د لاسته راوړلو تر ټولو مهمې طریقي په لاندې توګه دي:

1. د الکایل هلوچیندنو د هایډرولیز (Hydrolysis) څخه:





همدارنگه د الکایل هلايدونو د هایډرولیز څخه د NaOH اوبیز محلول او تودوڅي په پایله کې الکولونه لاسته راځي.



له نوموړي طریقي څخه په اساني سره اولي او دوهمي الکولونه لاسته راوړل کېږي.

2. د الکېنونو د هایډریشن (Hydration) د عملي په واسطه:



مهم یو قیمتہ الکولونه:

a) میتانول (Methanol):

میتایل الکول د یو قیمتہ الکولو غوره استازي دي. چي په زیات مقدار په صنعتي توګه په مختلفو طریقو استحصال کېږی.

فزيکي خواص (Physical properties):

میتانول ترټولو الکولونو ساده الکول دي، یوه بې رنگه مایع ده چې ډیره زهرناکه ده او د موادو لپاره ښه حلونکې ماده ده او په اسانۍ سره په آبي ژیر رنگه وړانګه سوځي. په اوبو په هر نسبت سره حلېږي، ځانګړي بوي لري له دي امله چې ډیر زهرناک دی د خوړلو څخه یې باید ځان وژغورل شي که چیري د هغوی 10 گرامه (15cc) و خوړل شي د وندوالي، او که 25 گرامه و خوړل شي د انسان د مړیني سبب ګرځي، میتانول تر 99% پورې د هغه د محلول څخه د تدریجي تقطیر په وسیله خالص په لاس راتلایي شي.

د میتانول لاسته راوړنه:

1. میتانول د لمړي ځل لپاره د لرګو د وچ تقطیر څخه په لاس راغلې، د تقطیر په دغه عملیه کې د میتانول برسیره د سوځیدو وړ غازونه لکه هایډروجن، کاربن مونو اکساید او ایتلین هم تولید شول او د تقطیر وروسته د قیر ټینګه مایع د لرګیو د سکرو په څیر د تقطیر د پاتي شوني په توګه پاتي کېږي، د لرګي تقطیر شوي مواد لاندې مرکبات لري.


Methanol (3 – 15) %

Acetic acid (10) %


Acetone and Acetic aldehyde 0.5%

د میتانول زوړ نوم د لرګیو الکول دی.

2. په صنعت کې میتانول په زیاته پیمانه د کاربن مونو اکساید او هایډروجن څخه د تودوخي په 400°C او 200at فشار کې د ZnO او یا Cr₂O₃ په شتون کې په لاس راوړي.



2. د میتان د طبیعي گاز له اکسیدیشن څخه: په صنعت کې د میتان گاز د خالص مخلوط سره مخلوط کوي، اود مسو څخه (کتلست په توگه) یې تیروي، د 250°C تودوخي او 10at فشار په نتیجه کې د میتان گاز اکسیدایز کېږي او میتایل الکول لاسته راځي.



د کارونې ځایونه (Usage of Methanol):

میتایل الکولو څخه په مختلفو برخو کې گټه اخیستل کېږي. د ښه محلول په توگه استعمالیږي، د رنگونو او نورو عضوی توکو کې د محلول په توگه کارول کېږي او د ځینو مرکباتو لپاره لکه فارم الډیهایډ، اسیتیک اسید، پولي ایستر د استحصال لپاره ورڅخه گټه اخیستل کېږي.

د دوبي په موسم کې د یخ ضد (Antifreeze) په توگه د موټرونو رادیاتور ته وراچول کېږي. میتانول د جیت طیارو د سون مادي په توگه کارول کېدلای شي همدارول د سون توکو (پطرو) ته وراچول کېږي، ترڅو کیفیت یې لوړ شي اما په دې دواړو حالتونو کې غیر اقتصادي تمامیږي. همدارنگه د میتانول څخه په سربین جوړولو او میتایلیشن کولو کې هم گټه اخیستل کېږي.

(b) ایتایل الکول یا ایتانول (Ethanol):



ابوبکر محمد بن زکریای رازی

ایتایل الکول د اول ځل لپاره د مشهور کېمپوه او عالم محمد زکریا «رازی» د قنډي موادو د تخمر په پایله کې کشف کړل.



فزیکي خواص: خالص ایتانول بې رنگه ماده ده او ځانگړی بوی لري. په اوبو کې په هر نسبت حلېږي. ایتانول په لابراتوارونو کې

د حلونکې مادې په توګه کارول کېږي، معمولي الکول 95% الکول او 5% اوبه لري چې په 78°C کې په ایشیدو راځي. کثافت یې 0.7 دي. د خالص او مطلق الکولو د لاسته راوړلو لپاره د هغوي 10% اوبه په کېمیاوي طریقو سره جلا کېږي.



لاسته راوړنه (Preparation):

I. د قندي موادو له تخمر (Fermentation) څخه: ایتایل الکول د انگورو، ممیزو، نشایستي، غلو دانو او حبوباتو لکه وربشو، کچالو، د بوري او لبلبو (Molasses) د شیري او توت د تخمر (موره کېدنې) څخه د خمیرمایې (Yeast) لکه Zymase، Sachrase، Amylase او Invertase په شتون کې تهیه کېږي.

a. د انگورو له تخمر څخه: ایتایل الکول د Invertase او Zymase انزایمونو په موجودیت کې د سکروز او ګلوکوز څخه په لاس راځي.





b. د نشایستي له تخمر څخه:-




II. د ایتلین د هایدریشن (Hydration) څخه:-

د الکول جوړونې په صنعت کې د ایتلین گاز په 75°C تودوخه کې د H_2SO_4 سره یو ځای کوي او د (Ethyl Hydrogen Sulphate) مرکب لاسته راوړي وروسته نوموړي مرکب هایدرولیز کوي او ایتایل الکول په لاس راوړي.



همدارنگه په صنعت کې ایتانول د ایتلین له هایدریشن څخه د H_3PO_4 کتلت او تودوخي په شتون کې لاسته راوړل کېږي، دغه طریقه د تخمر په نسبت ډیره ارزانه ده. لمړي ځل لپاره په 1947 م کال کې Shell آمريکايي کمپنۍ د بخار د Reactor په واسطه د ایتلین گاز د H_3PO_4 ، 60at فشار او 300°C تودوخي په موجودیت کې 95% ایتایل الکول تهیه کړل.



د کارونې ځایونه (Usages):

1. په طبابت کې د تقویتی شربتونو په جوړولو کې، د ټپونو د پانسما په خاطر د Antiseptic په توګه په ټاکلي او کمه سلنه کارول کېږي، همدارول د نورو درملو په جوړونه کې کارول کېږي.
2. د حیواناتو د جسدونو او اناتومي (Anatomy) مستحضراتو د ساتلو لپاره.
3. د عطر جوړونې په صنعت کې د کلونیا او عطرونو په جوړولو کې کارول کېږي.

4. د ایترونو، ایتایل کلوراید، ایسترونو، عضوی تیزابونو، کلوروفارم او آیودوفارم او نورو، د جوړونې او ترکیب لپاره استعمالیږي.
5. د ایتایل الکولو څخه په رنگونو کې ګټه اخیستل کېږي.
6. د موټرو په انجن او الکولي خراغونو کې د سون مادي په توګه کارول کېږي.
7. د عضوی محلل په توګه د غوړو لکو د پاکولو لپاره.
8. د (Antifreeze) مادي په توګه د موټرو انجن د یخ وهلو څخه ژغوري.
9. د پطروشیمي په صنعت کې د پولیمیرایزیشن عملیې په واسطه د رابر د جوړولو لپاره.
10. په لابراتوار کې د یو شمیر بیوشیمیک او کیمیاوی معیاراتو لپاره.

په الکولي مشروباتو کې د الکولو اندازه په لاندې توګه ده.

Wine (8 – 12) %

Beer (3 – 6) %

Brandy (30 – 50) %

Whisky (40 – 50) %


خوځیمته الکولونه

که په مشبوع هایډروکاربنونو کې د کاربن د څو اتومونو یو یو هایډروجن په یو یو OH تعویض شوی وی د څو ځیمته الکولو په نوم یادېږي. ترټولو مهم څو ځیمته الکول عبارت دي له : گلایکول او گلیسرین.

ګلایکول (Glycol)(1,2 – Ethanediol):


د ګلایکول یا ایتلین ګلایکول مالیکول چې سیستماتیک نوم یې 1,2 – Ethanediol

دي، فورمول يې عبارت دي له:




ايتلين گلايكول بې رنگه، بې بويه او او د شربت په شان مايع ده چې په اوبو کې په هر نسبت حل کېدای شي، د گنگل کېدو ښکته درجه يې $155^\circ\text{C} -$ ده؛ نو په Antifreeze (پخ ضد) اوبو په توگه په موټرونو کې په کار وړل کېږي، د ايشيدو درجه يې 197°C ده؛ چې د اوړي په موسم کې د موټرونو په اوبو کې اضافه کېږي. د موټرو په بريک کې د هايډرولیک مادې په توگه، په رنگونو، تيلو او د قلم د رنگونو په محلولونو کې په کار وړل کېږي.

1. گلايكول د الکاييل هلوجن او KOH د تعامل څخه په لاس راوړل کېږي.




2. E.E Vagner روسي عالم په 1888 م کال کې د ايتلين، پوتاشيم پرمنگنيټ او اوبو څخه ايتلين گلايكول په لاس راوړل.




گليسرول (Glycerol) (1,2,3 – Propanetriol):

گليسرول دري قيمته الکول دي چې د شحمياتو په ترکيب کې په طبيعي حالت شتون لري. معمولي او تجارتي نوم يې (Glycerin) دي. د مهمو الکولونو له ډلې څخه دی، خوند يې خوږ دی، دغه الکول درې د OH گروپونه لري او فورمول يې عبارت دي له:



د الکولو په شتون کې گلوکوز ته تودوخي ورکولو په نتیجه کې گلیسرین، اسیتالدهاید او د CO₂ گاز تولیدیږي.



گلیسرین یو بې رنگه او لزجي مایع ده چې خوږ خوند لري. دا چې په خپل ترکیب کې د OH گروپونه لري نو په اوبو کې په اسانۍ سره حلېږي مگر په ایترو کې تقریباً غیرمنحل دي او په کیمیاوي تعاملاتو کې درې قیمتته الکولي خواص د ځان څخه ښکاره کوي.



د گلیسرین د استعمال ځایونه:

د کریمو په ترکیب کې، د مرهمونو په جوړولو، د بدن د پوستکي په نرم ساتلو کې او همدارنگه په مطبوعو کې د چاپ په وخت کې استعمالیږي یعنې گلیسرین د رنگ سره مخلوطوي چې د چاپ په وخت په کاغذونو کې ښه نفوذ کوي. د گلیسرین څخه د انتي فریز (Antifreeze) مادي په توګه کار اخیستل کیږي. د گلسرول څخه د چاودیدونکو موادو جوړولو لپاره په فابریکاتو کې کار اخیستل کیږي. یعنې که چیرې گلیسرول د بنوري تیزابو سره تعامل وکړي د نایتروگلیسرول په نوم مرکب جوړوي، چې په اتومي بم (Atomic Bomb) کې کارول کیږي.

نهم خپرکې

ایتر (Ether)

که د الکولونو هایدروجن په یو عضوی بقیه (معوض) تعویض کړو ایتر لاسته راځي او یا هم ایتر کولایی شو د اوبو د فورمول څخه مشتق کړو یعنی که د اوبو د مالیکول دواړه هایدروجنونه په دوه عضوی معوضونو تعویض کړو ایتر حاصلیږي.



د ایترونو نوم ایښودنه (Nomenclature of Ethers):

ایترونه په لاندې طریقو نومول کېږي.

I. عمومي طریقه (Common method):

ساده ایترونه په دوه ډوله دي.

متناظر ایتر (Symmetrical Ether) او غیر متناظر ایتر (Unsymmetrical Ether).






جدول (27):

متناظر ایتر $R - O - R$ (Symmetrical Ether)	غیر متناظر ایتر $R - O - R'$ (Unsymmetrical Ether)
$CH_3 - O - CH_3$ (Di methyl ether)	$CH_3 - O - C_2H_5$ (Methyl Ethyl Ether)
$C_2H_5 - O - C_2H_5$ (Di ethyl ether)	$C_2H_5 - O - C_3H_7$ (Ethyl propyl Ether)
$C_3H_7 - O - C_3H_7$ (Di propyl ether)	$C_3H_7 - O - C_4H_9$ (propyl Butyl Ether)

II. د IUPAC په لاره د ایترو نوم ایښودنه:



څرنگه چې د ځینو ایترونو فورمول وسیع او پراخه وی او د ځینو فورمولونه منشعب او د شاخو لرونکي وي. له همدې امله د هغوی نوم ایښودنه په بیلابیلو ډولونو توضیح کېږي.


1. د ایترونو په نوم ایښودنه کې د هغوي زنځیر په دوو برخو کې ویل کېږي. لمړي د زنځیر ښې لورې چې د کوچني رادیکل او اکسیجن لرونکي دی چې (O – R) Alkoxy ویل کېږي یعنې که چیرې (O – R) د (O – CH₃) په ډول وي د (Methoxy) په نوم او که د (O – C₂H₅) په ډول وي د (Ethoxy) په نوم یادېږي.




2. د منشعب یا شاخو لرونکو ایترو نوم ایښودنه:

لمړي شماره وهل کېږي شماره له هغه طرفه پیل کېږي چې کاربن د Alkoxy گروپ ته کوچنې شماره ولري.







(2 - Methoxy - 4 - Methyl - 5 - Chloro - 1 - Pentene)




(2 - Methoxy - 4 - Methyl - 5 - Chloro - 1 - Pentene)



(3 - Methoxy - 3 - Chloro - 5 - Methyl - Phenyl - Hexane)


د سایکلو الکان څخه اخیستل شوي کریز ایتري په لاندې ډول دي.




Oxiran



Oxetan




Tetrahydrofuran




Tetrahydropyran

که سایکلو هگزان کې د میتیلین دوه گروپونه د اکسیجن په واسطه عوض شي نو د


Dioxan درې ایزومیري جوړېږي.



1,2 – Dioxan



1,3 – Dioxan



1,4 - Dioxan

د ایترو فزیکي خواص (Physical properties):


ایتر یوه بې رنگه، فرارې او اور اخیستونکې مایع ده. په اوبو کې کم منحل یا غیر منحل دي. د ایترو د ایشیدو تېکې د الکولو په پرتله ټیټ دي. ځکه د هغه مالیکول غیر قطبي دی او په مالیکولونو کې یې هایډروجنی رابطې شتون لري.

د ځینو ایترو د ویلي کېدو او ایشیدو تېکې: جدول (28):

نوم	د ویلي کېدو تېکې (M P (°C)	د ایشیدو تېکې (B P (°C)
Di methyl Ether	- 140	- 24
Di ethyl Ether	- 116	35
Di – n – Propyl ether	- 122	91
Di Iso Propyl ether	- 60	69
Di – n – Butyl ether	- 95	142
Di Vinyl ether	- 101	28
Di allyl ether	-	94
Anisol(Methyl Phenyl ether)	- 37	154
Phenetol(Ethyl Phenyl ether)	- 33	172
Di Phenyl ether	27	259
1,4 - Dioxan	11	101

د ایترو کیمیاوی خواص (Chemical properties):


1. د ایترونو تعامل د هایدرو هالایدونو (H-X) سره: ایترونه د تودوخي په اثر د غلیظو هایدرو هالایدونو سره چې قوي اسیدونه دي تعامل کوي چې د اکسونیم ایون د تولید سبب گرځي او وروسته په الکولونو او الکایل هالایدونو تجزیه کېږي.




2. د ایترونو هایدريشن (Hydration): د H_2SO_4 رقیقو تیزابو په شتون کې ایترو هایدريشن کېږي، دوه مالیکوله الکول حاصلیږي.



3. د ایترونو سوځیدنه (Combustion): په ازاده هوا کې د ایترونو د احتراق څخه CO_2 او H_2O تولیدیږي.





4. د ایترونو قوي اکسیدیشن (Oxidation): ایترونه د قوي اکسیدانت کوونکې لکه $K_2Cr_2O_7$ په واسطه د H_2SO_4 تیزابونو په شتون کې په دوو مرحلو کې اکسیدایز کېږي لمړي الډیهاید او وروسته عضوی تیزابونه جوړوي.



د ایترو لاسته راوړل (Preparation of Ethers):

1. په لابراتواری طریقه:


د گوگړو تیزابو په شتون کې د الکولو د دوو مالیکولونو د Dehydration د عملیې په پایله کې ایترو لاسته راځي. (په دغه طریقه کې متناظر ایترو حاصلیږي).



Alexander Willaim Waiiamson
(1824 - 1904)

2. د ویلیم سن (Willaimson) طریقه:

انګلیسي عالم ویلیم سن په 1851 م کال کې د فلزی الکوکسایډو او الکایل هالایدونو څخه ایترو په لاس راوړل.



د ایترو د استعمال ځایونه (Usage of Ethers):

ایترو څخه د عضوی محلول په توګه په جراحی عملیاتو کې د ناروغانو د بې هوښي لپاره، د ځینو لابراتواری معیارونو په برابرولو او په کمه اندازه په عطر جوړونه او یو د بل څخه د مختلفو عضوی مرکباتو د جدا کولو لپاره په کار وړل کېږي. د اکسټرکشن په منظور هم د ایتري مرکبونو


څخه کار اخیستل کیږي. که مو غوښتي وي چي شحم (غوړي) له نبات نه لاسته راوړو نو نبات په ایتري کې حلېږي او بیا غوړي له ایتري څخه په مختلفو طریقو سره جلا کیږي او په خالصه توګه غوړي لاسته راوړل کیږي.

پخوا له ایتري څخه په بې هوښي کې کار اخیستل کېده اما نظر په دې چي په تنفسي سیستم، اعصابو او زړه باندې ناوړه اغیزه کوي. نن ورځ د هغوي څخه په کمه اندازه په بې هوښي کې کار اخیستل کېږي.

لسم څپرکې

الديهایدونه (Aldehydes)

الديهایدونه هغه عضوی مرکبات دی چې د هغوي په جوړښت کې د کاربونیل وظيفوي گروپ (C=O) شتون لري له دي کبله د هغوي ساختماني فورمول عبارت دي له:



او عمومي فورمول يې عبارت دي له: $(\text{C}_n\text{H}_{2n} + \text{O})$

الديهاید نوم د لاتيني کلیمې (Alchol-Dehydrogenatus) يعني (هغه الکول چې د هغه څخه هايډروجن جدا شوي وي) اخيستل شوي دي له دي کبله الديهایدونه د الکولو د مشتقاتو څخه عبارت دي چې د الکولو د اکسیديشن په پایله کې لاسته راځي.



نوم ایښودنه (Nomenclature):

a. عمومي طريقه (Common Method):

د عضوی تيزابونو د نومونو څخه، په دغه صورت کې لمړي د اسيد کلیمه حذف کېږي وروسته د (ic) د وروستاري پر ځای د الديهاید (Aldehyde) کلیمه علاوه کوو. بیلگي یې په لاندې توگه دي.

Formic Acid	Form Aldehyde
Acetic Acid	Acet Aldehyde
Propanoic Acid	Propane Aldehyde

b. د IUPAC په طريقه د الديهایدونو نوم ایښودنه:



دغه طريقه په دوو ډولونو صورت نیسي.

- i. د الکانونو د نوم څخه وروستي توري (-e) حذف کېږي او د هغه په عوض د (-al) وروستاري اضافه کېږي.


Methane	Methanal	$(\text{H} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H})$	or (Form aldehyde)
Ethane	Ethanal	$(\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H})$	or (Acet aldehyde)
Propane	Propanal	$(\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H})$	or (Methyl acet aldehyde)
Butane	Butanal	$(\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H})$	or (Ethyl acet aldehyde)

- ii. که چیرې د الديهاید گروپ د رادیکل لرونکي وي شماره د الديهاید د گروپ د کاربن

څخه پیل کېږي، لمړي د شماری له مخې اړونده رادیکلونه ذکر کېږي او په اخر کې د اړونده الديهاید نوم ذکر کېږي. بیلگه:



(1 - Methyl Propanal) or (Methyl ethyl acet aldehyde)



د الډيهايډونو فزیکي خواص (Physical properties):

هغه الډيهايډونه چې د کاربنونو شمیر یې کم وي لکه فارم الډيهايډ او اسیت الډيهايډ، گاز حالت لري او په 20°C تودوخه کې په ایشیدو راځي. په اوبو کې د هایډروجنی رابطې په تشکیل سره په هر نسبت سره حلېږي. په هره اندازه چې د الډيهايډونو د کاربن د اتومونو شمیر زیات وي په اوبو کې د هغوي د انحلالیت وړتیا کمیږي او په مایع حالت شتون لري.


کم کاربن لرونکي الډيهايډونه کوم ځانگړي بوی نه لري اود کاربن د شمیر په زیاتوالي سره په زړه پوري او عطري بوي پیدا کوي. په ځانگړي توگه اروماتیک الډيهايډونه په عطرچورونه او د غذايي موادو ته د ښه بوي ورکولو لپاره په کار ورل کېږي. د الډيهايډونو د ایشیدو ټکې د هغوي د هم کاربنه الکانونو په پرتله لوړ وي اما د الکولو په نظر ټیټ وي. همدارنگه د الډيهايډونو د جاذبي قوه د الکانونو څخه زیاته ده. په لاندې جدول کې د ځینو الډيهايډونو فزیکي خواص توضیح شوي دي. جدول (29):

د الډيهايډ نوم	فورمول	د ویلی کېدو ټکې $^{\circ}\text{C}$	د ایشیدو ټکې $^{\circ}\text{C}$
Form aldehyde (Methanal)	HCHO	- 92	- 21
Acet aldehyde (Ethanal)	CH ₃ - CHO	- 125	21
Propion aldehyde (Prpanal)	CH ₃ - CH ₂ - CHO	- 81	49
n-buty aldehyde (Butanal)	CH ₃ - (CH ₂) ₂ - CHO	- 99	76
n-valer aldehyde (Pentanal)	CH ₃ - (CH ₂) ₃ - CHO	- 91.5	102
Capro aldehyde (Hexanal)	CH ₃ - (CH ₂) ₄ - CHO	- 51	131
Benzencarbal aldehyde (Benzen aldehyde)	C ₆ H ₅ - CHO	- 26	178


د الډيهايډونو کيمياوی خواص (Chemical properties):

د الډيهايډونو کيمياوی فعالیت له کټونونو سره توپیر لري؛ ځکه د الډيهايډ د کاربونیل ګروپ کې د هايډروجنې او (π) اړیکې شتون د هغوي فعالیت ډیر کړي دی چې د هايډروجن او نورو مرکبونو سره جمعي تعاملات ترسره کولي شي، الډيهايډونه لاندې ځانګړي تعاملونه سرته رسوي.

1. **ارجاع (Reduction):** د Pd يا Ni په شتون کې د الډيهايډونو له ارجاع څخه اولي الکول په لاس راځي.




2. **اکسیدیشن (Oxidation):** الډيهايډونه د اکسیدانت موادو په وړاندې ډیر حساس دي، په تيزي سره اکسید ایز کېږي او عضوی تیزابونه جوړوي لکه د امونیا د محلول په واسطه د نقرې اکساید الډيهايډونه په عضوی تیزابونو اکسید ایز کوي له دې خاصیت څخه هغوي د ائینو په جوړولو کې استعمالیږي.





3. **د الډيهايډونو د سوزیدلو تعامل (Combustion Reaction):**

د الډيهايډونو د سوزیدلو تعامل محصول CO_2 ، اوبه او انرژي ده، د الډيهايډونو د تعامل عمومي معادله په لاندې ډول ده.




د الډيهايدونو لاسته راوړل (Preparation of Aldehydes):


1. د لمړنۍ الکولو اکسیدیشن: که چیرې اولی الکولونه اکسیدیشن شي، الډيهايدونه لاسته راځي.



2. د پروپیلین د کتلستۍ اکسیدیشن څخه تولید کېږي.



3. الکاینونه د ځانگړي میکانیزم له مخې د اوبو سره یو ځای کېږي، لمړي الکول او بیا الډيهايد جوړوي.



ځینې مهم الډيهايدونه:

فارم الډيهايد (Formaldehyde):


د الډيهايدونو لمړنۍ مرکب فارم الډيهايد دی چې روسي کیمیاپوه بوتریلوف (Alexander Mikhailovich Butlerov) په واسطه په 1859 م کال کې کشف شو، چې بالاخره په

1869 م کال کې د August Wilhelm von Hofmann له خوا په ښه توګه وپېژندل شو. فارم الډیهاید بې رنګه ګاز دی چې تیز بوی لري.




فارم الډیهاید یا فارمل هغه مایع ده چې عموماً له اوبو سره د محلول په بڼه د ژوندیو موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. د لرګیو لوګیو کې هم فارم الډیهاید شته دي چې یو وژونکې مرکب دی. په اوبو کې حل کېږي اود هغه 40% محلول د فارملین په نوم یادېږي چې ډیر استعمال لري، فارم الډیهاید د ساختماني موادو په صنعت اود کور په وسایلو کې کارول کېږي.

فارم الډیهاید له امونیا سره جمعي تعامل تعاملونه (پولیمیرایزیشن) ترسره کوي چې مهم او باارزښته مرکب هګزا میتلین تترامین (یورو تروپین) تشکیلوي. یورو تروپین په طبابت کې د تشو متیازو د نل د مینځلو او پاکولو لپاره او په صنعت کې د سربیس او کنډ د کلکولو او همدارول د غذايي موادو د ساتلو لپاره په کار وړل کېږي.

فارم الډیهاید کولي شو په لاندې توګه په لاس راوړو.



یو شمیر نور الډیهایدونه شتون لري چې د هغوي په فورمول کې د الډیهایدونو دوه ګروپونه شتون لري چې د هغوي په نوم ایښودنه کې د (Dial) مختاړي ذکر کېږي او په اخر کې د الکان نوم ذکر کېږي.



د الديهایدونو د استعمال ځايونه (Usages):


الديهایدونه چي خوشالونکې بوي لري، غذايي موادو ته د ښه بوی ورکولو په غرض استعمالیږي.

اکتanal Octanal الديهاید چي د گلابو بوی لری په عطر جوړونه کې ورڅخه گټه اخیستل کېږي. او هغه الديهایدونه چي لوړ مالیکولي وزن لري په پلاستیک جوړونه کې ورڅخه گټه اخیستل کېږي. د ځینو الديهایدونو څخه په انساني درملو کې کار اخیستل کېږي او همدارنگه د زراعتي میکروبونو په وړاندې چي د غلو د دانو د خرابوالي سبب گرځي، هم گټه اخیستل کېږي.

کېتونونه (Ketones)



کېتونونه اکسیجن لرونکي عضوی مرکبات دي چي د الديهایدونو په څیر د هغوي په فورمول کې د کاربونیل وظیفوي گروپ شتون لري. کېتونه د (Alkanone) په نوم هم یادېږي.

که چیري د کاربونیل د گروپ دواړو خواوو ته د الکایل گروپونه وصل شي د کېتونونو عمومي ساختماني فورمول په لاس راځي.





کېتونونه په دوه ډوله دی چي یو ساده (متناظر) کېتونونه او بل هم مخلوط کېتونونه (غیرمتناظر) کېتونونه دي.

که د کېتون په فورمول کې د کاربونیل گروپ دواړو خواوو ته د الکایل یو ډول راډیکل وصل وي د متناظر (Symmetrical) کېتونونو په نوم یادېږي. د بیلگي په توگه:



که د کپتون په فورمول کې د کاربونیل گروپ دواړو خواوو ته د الکایل مختلف راډیکلونه وصل وي د غیر متناظر (Asymmetrical) کپتونونو په نوم یادېږي. د بیلگې په توګه:



د کپتونونو نوم ایښودنه (Nomenclature):

د کپتونونو د سلسلې مرکبات د دریم کاربن څخه پیل کېږي. د کپتونونو د نوم ایښودنې لپاره دوه لاندې طریقو څخه ګټه اخلو:




1. **عمومي طریقه (Common method):** په دغه طریقه کې د الکانونو د نوم وروستي توري (e) لري کېږي اود هغه پرځای د (- one) وروستاړي اضافه کېږي.

Propane	Propanone	$\text{H}_3\text{C} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_3$	(Acetone)
Butane	Butanone	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_3$	
Pentane	Pentanone	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	
Pentane	Pentanone	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	



2. د IUPAC په لاره د کټونونو نوم ایښودنه:

د فورمول د جوړښت په نظر په درې حالتونو نومول کېږي.



a. په هغه صورت کې چې زنځیر په اوږد ډول او د شاخو لرونکي نه وي. کاربنونه له هغه طرفه شمیرل کېږي چې د کاربونیل د ګروپ کاربن ترټولو کوچني شمېره ولري په لوستلو او لیکلو کې لمړي کوچني شمېره او بیا د کټون د زنځیر نوم ذکر کېږي. د بیلګې په توګه:





b. که چېرې زنځیر منشعب او د راډیکل لرونکي وي د کاربنونو نومول د (a) د طریقي په څیر صورت نیسي. په لیکلو او لوستلو کې لمړي هغه کاربن ذکر کېږي چې راډیکل ولري، بیا د راډیکل نوم، بیا هم د کاربونیل د ګروپ د کاربن شمېره او په اخر کې د کټون نوم ذکر کېږي. د بیلګې په توګه:




c. د متناظر کټونونو په نوم ایښودنه کې لمړي د (- di) کلیمه وروسته د راډیکل نوم او په اخر کې د Ketone کلیمه ذکر کوو. بیلگي:




په هغه صورت کې چې کټون غیرمتناظر وي، د هغه راډیکل نوم چې د هغه لمړي توري د الفباء د تورو په اساس اول وي، ذکر کېږي وروسته له هغه څخه د کټون کلیمه ذکر کېږي. بیلگي په توگه:



د کټون د ځینو نورو مرکباتو نوم ایښودنه په لاندې توگه صورت نیسي.




Cyclo propanone




Cyclo Butanone


اروماتیکي کټون د Phenone په نامه یادېږي د بیلگي په توگه:



Benzol Phenone



Aceto phenone



4 - Hydroxy Aceto phenone

فزيکي خواص (Physical properties):

ساده کټونونه چي لږ ماليکولي وزن لري، په عادي حالت کې مایع وي، په زړه پوري بوي لري لکه اسیتون، هغه کټونونه چي د زیات ماليکولي وزن لرونکي وي په جامد حالت وي تیز او بد بوي لري په اوبو کې نه حلېږي. مایع کټونونه د وازدو او عضوی موادو (کېمیاوی رنگونو) د محلل په توګه کارول کېږي. د کټونو د ایشیدو ټکي د الکانونو څخه زیات او د هغوي د هم کاربنه الکولو څخه کم دي.

په لاندې جدول کې د کټونونو، الډیهایدونو او الکولونو د ایشیدو ټکي پرتله شوي دي.



جدول (30):

د مرکب نوم	فورمول	ماليکولي وزن	د ایشیدو ټکي
Acetone	$\text{H}_3\text{C} - \text{C}(\text{O}) - \text{CH}_3$	58	56
Butanone	$\text{H}_3\text{C} - \text{C}(\text{O}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	72	80
Butanal	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C}(\text{O}) - \text{H}$	72	76
Butanol	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	74	117
Pentane	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	72	36


د کټونونو کېمیاوی خواص (Chemical properties):

کټونونه د الډیهایدونو په څیر په اساني سره نه اکسیدایز کېږي، بلکه د قوي اکسیدایز کوونکي مادي په واسطه د قوي تیزابونو په شتون کې اکسیدایز کېږي. د کټونو مهم کېمیاوی تعاملات په لاندې توګه دي.


1. **اکسیدیشن (Oxidation):** د کپتونونو د اکسیدیشن څخه د اکسیدایز کوونکې مادې لکه $K_2Cr_2O_7$ په واسطه د H_2SO_4 تیزابو په شتون کې عضوی اسیدونه تولیدیږي لکه د اسیتون اکسیدیشن.



2. **ارجاع (Reduction):** کپتونونه د ارجاع کوونکو فلزاتو (لکه Ni ، Pt ، Pd) په موجودیت کې ارجاع کېږي دوهیمي الکول په لاس راځي.





3. **احتراق (Combustion):** د کپتونونو سوزیدنه د نورو هایدروکاربنونو او د هغوي د مرکباتو په څیر صورت نیسي ، اوبه ، کاربن ډای اکساید او انرژي تولیدوي.





د کپتونونو لاسته راوړل:

1. د MnO_2 په شتون کې د عضوی تیزابونو د اکسیدیشن څخه:






2. د دوهمي الکولونو د اکسیدیشن څخه:



3. **Ivan Nazarov Reaction**: نظروف د ډای وینایل کیتون څخه د سایکلوپنتینون مرکب

په لاس راوړي.



د کیتونونو مرکبونه:

اسیتون (Acetone):

اسیتون چې د پروپانون یا ډای میتایل کیتون په نوم هم یادېږي، نوموړي مرکب بې رنگه مایع ده چې تیز بوی لري او الوتونکې ماده ده، په 56°C کې په ایشیدو راځي، په اوبو، الکولو او ایترونو کې په هر نسبت حل کېږي، د عضوی موادو بڼه محلل دي.

د ورنسورنگونو، د نوکانو رنګونو، پلاستیکو، د غوړیو رنګونو او د هغوي د مشتقاتو، د کنډو او لاکو بڼه حلونکې ماده ده. اسیتون د هغه وګړو په تشو متیازو کې شتون لري کوم چې

د شکرې له ناروغي څخه ځورېږي. ددې وگړو تشې متيازې د اسیتون بوی لري. اسیتون په آبی-رنګه لمبه سوځي او په ستونزو سره اکسیدایز کېږي.

د اسیتون لاسته راوړنه:

1. د لرگیو د مجموعي د تقطیر له محصولاتو څخه، %0.5 یې اسیتون دي چې کېدای شي هغه د تدریجي تقطیر له امله جلا کړای شي.
2. کلسیم اسیتیت ته د تودوخي په ورکولو هم کېدای شي، اسیتون لاس ته راوړل شي.

د کېتونونو د استعمال ځایونه (Usage of Ketons):

له کېتونونو څخه د عضوی محلول په توګه د غوړي لرونکو موادو په حل کولو او د غوړو لاکو د پاکولو لپاره ګټه اخیستل کېږي. هغه کېتونونه چې لوړ مالیکولی وزن او په زړه پوري بوی لري په عطر جوړونه کې کارول کېږي.

طبعي کېتون چې د Muscone په نوم یادېږي او د چین د ختن د هوسیو (د هوسی له نوم) څخه په لاس راځي او د مشکو په نوم مشهور دي د عطر جوړونې په صنعت کې په مصرف رسیږي.


د مشک مالیکولي فورمول ($C_{16}H_{32}+O$) او جوړښتیز فورمول د ($C_7H_{15}-CO-C_8H_{17}$) څخه عبارت دي.

یوولسم څپرکې

عضوي تيزابونه (کاربوکسلیک اسید)


(Carboxylic Acids)

کاربوکسلیک اسیدونه د عضوي تيزابونو څخه عبارت دي چي د هغوي په فورمول کې د کاربوکسيل وظيفوي گروپ (COOH -) او يو راډيکل (R -) شتون لري. چي ساختمانې فورمول يې عبارت دي له:



په حقيقت کې د کاربوکسيل گروپ د کاربونيل او هايډروکسيل له گروپ څخه لاسته راغلي دي.

د کاربوکسيل (COOH -) په گروپ کې د هايډروجن او کاربن ترمنځ هيڅ ډول اړيکه شتون نه لري. دا گروپ کولای شي چي د پروتون ورکونکې (Proton - Donator) په توگه عمل وکړي نو د (COO^-) ايون چې د کاربوکسلات په نوم ياديږي، بدلون ومومي. په دي انيون کې د اکسيجن دواړه اتومونه يو ډول ارزښت لري؛ ځکه په هغه کې د π الکترونونه د ريزونانس (Resonance) په حالت کې شتون لري.



عضوي تيزابونه هم په ترکيبی ډول جوړيدای شي اوهم د خامو ميوو، تروشو شيدواو دميوو د تخمر څخه په لاس راتللای شي.

د عضوی تیزابونو ویش:

عضوی تیزابونه په لاندی ډولونو ویشل شوي دی:

a. **الیفاتیک عضوی تیزابونه:** هغه تیزابونه چې په الیفاتیک هایډروکاربن کې د کاربوکسیل ګروپ ولری د الیفاتیک عضوی تیزابونه نوم یادیږی او په لاندی ډولونو ویشل شوي دی:


1. مونوکاربوکسیلیک اسید (Mono carboxylic acid):

هغه عضوی تیزابونه دی چې یوازی یو د کاربوکسیل ګروپ ولری.

لکه: $\text{C}_2\text{H}_5\text{-COOH}$, $\text{CH}_3\text{-COOH}$, H-COOH اونور.

2. ډای کاربوکسیلیک تیزاب (Di carboxylic acid):


هغه عضوی تیزابونه دی چې په کاربنی ځنځیر کې دوه د کاربوکسیل ګروپونه ولری
 اوعمومی فورمول یې په دی ډول دی: $\text{HOOC-(CH}_2\text{)}_n\text{-COOH}$
 چې په دغه فورمول کې n مختلف قیمتونه اخستلای شی لکه: $n = 1, 2, 3, 4, \dots$
 مثالونه:



3. پولي کاربوکسلیک اسید (Poly carboxylic acid):

هغه عضوی تیزابونه دي چې د کاربوکسیل څو وظیفوی گروپونه په یو مالیکول کې ولري

لکه په لاندې ډول:




شحمي اسیدونه (Fatty acids): د الیفاتیک دسلسلی د کاربوکسلیک عضوی تیزابونو هغه مونو کاربوکسلیک دي چې د کاربن د اتومونو شمیر یې د (4) څخه ډیر وي د شحمي اسیدونو په نوم یادېږي دا ځکه چې دا ډول عضوی تیزابونه د حیوانی شحمو او نباتی غوړیو د هایدرولیز څخه په لاس راځي.


2. الی سکلیک عضوی تیزابونه (Ali cyclic acids):

هغه عضوی تیزابونه دي چې د سایکلو الکان مرکب سره یې د کاربوکسیل گروپ وصل وي.

لکه:




(Cyclo Propanoic acid)



(Cyclo Butanoic acid)

c: اروماتیک عضوی تیزابونه (Aromatic carboxylic acids):

هغه تیزابونه دی چې اروماتیک مرکب سره یې دکاربوکسیل گروپ وصل وی. لکه:



د عضوی تیزابونو نوم ایښودنه (Nomenclature):

1. معمولي طریقه (Common method):

هغه عضوی تیزابونه چې د طبیعي سرچینو څخه په لاس راځي د هغوي نوم د هغوي د سرچینې د لاتین څخه اخیستل شوي دي. لکه د لاندې څلورو اسیدونو نوم عبارت دي له:

Formic Acid د میږي (Formica) د لاتین نوم څخه اخیستل شوي دی چې د سرو میږیو د کالبوتونو (جسدونو) له تقطیر څخه لاس ته راوړل شوی دی، Acetic Acid نوم د سرکې د لاتیني نوم (Acetum) څخه اخیستل شوي دي. Buteric Acid د کوچو (مسکه) د لاتیني نوم (Buterum) څخه او ستیاریک اسید (Stearic Acid) د غوا د غوړیو د لاتیني نوم (Stearum) څخه اخیستل شوي دي. په همدې ترتیب ټول معمولي نومونه د اړوندو تیزابونو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ ایښودل شوي دي.

لاندې جدول کې د لسو عضوی تیزابونو معمولي نومونه او د هغوي سرچینې ښودل شوي دي.

جدول (31):

معمولي نوم	جوړښت	د کاربن شمیر	سرچینې
فارمیک اسید	HCOOH	1	میري (لاتین - فارمیکا)
اسیتیک اسید	CH ₃ - COOH	2	سرکه (لاتین - اسیتوم)
پروپانوئیک اسید	CH ₃ - CH ₂ - COOH	3	شیدي، کوچ، او خیدک
بوتیریک اسید	CH ₃ - (CH ₂) ₂ - COOH	4	کوچ (لاتین - بوتیروم)
والیریک اسید	CH ₃ - (CH ₂) ₃ - COOH	5	سنبل د گل رینه (لاتین - والیر)
کپروئیک اسید	CH ₃ - (CH ₂) ₄ - COOH	6	اوزي (لاتین - کاپر)
اینان توئیک اسید	CH ₃ - (CH ₂) ₅ - COOH	7	د پیچک وږی (لاتین - اوینانت)
کپلریلیک اسید	CH ₃ - (CH ₂) ₆ - COOH	8	اوزي (لاتین - کاپر)
پیلارگونیک اسید	CH ₃ - (CH ₂) ₇ - COOH	9	د شمع دانی گل (افریقایی نبات)
کپریک اسید	CH ₃ - (CH ₂) ₈ - COOH	10	اوزي (لاتین - کاپر)

2. د IUPAC په لاره د تیزابونو نوم ایښودنه:




نوم ایښودنه په دوو ډولونو سره صورت نیسي.

- a. لمړي د Acid کلیمه، بیا د (-e) توري د هغوي د اړونده الکانونو د نوم له اخر څخه لري کپري اود هغه په عوض د (-oic) توري اضافه کپري. بیلگي:



Ethane	Ethanoic Acid	$\text{H} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{OH}$
Ethane	Ethanoic Acid	$\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{OH}$
Propane	Propanoic Acid	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{OH}$








b. د منشعبو اسیدونو نوم ایښودنه: د منشعبو اسیدونو د نومولو لپاره اوږد زنځیر باندې شمیره وهل کېږي. د شمیرې وهل د د کاربوکسیل د گروپ د کاربن څخه پیل کېږي. په لیکلو او لوستلو کې اول د بناخ (راډیکل) نوم او بیا ورپسې د اصلي زنځیر نوم ذکر کېږي. د بیلگې په توګه:



ځینې نورې بیلګې:





که چیري عضوی تیزابونه په خپل ترکیب کې د یو څخه ډیر د کاربوکسیل گروپونه ولري. په دغه صورت کې د هغوي د اړوند هایدروکاربن (الکان، الکن، الکاین) د نوم په پای کې د Trioic dioic او نور وروستاري لیکل کېږي، د اسید کلیمه پرې زیاتېږي.



ځينې نور قواعد په لاندې توگه دي:


په عمومي سيستم کې هغه عضوی تیزابونه چې معوضونه ولری د يونانی الفباء تورو په واسطه د معوضونو پوزیشن ښودل کېږي په دی ډول چې لومړی په هغه کاربن د α الفبا توری لیکل کېږي چې د COOH - گروپ ته نږدی خود کاربوکسیل دگروپ په کاربن باندی توری نه لیکل کېږي او بیا نور توری په ترتیب سره α الفبا، β بیتا او γ گاما تر وروستی کاربن لیکو.

د نوم اخیستلو لپاره یې لمری د معوضونو د کاربنونو اړوند يونانی توری بیا د معوضونو نوم اخلو او په اخر کې د مشبوع هایدروکاربن نوم په (ic acid) پای ته رسیږي.



1. د مونو کاربوکسلیک تیزابونو نوم ایښودنه د ایوپاک (IUPAC) په طریقه:

په دی سیستم کې د عضوی تیزابونو نوم الکانویک اسید دی چې په لاندې ډول لاسته راځي:




د غیرنارمل کاربوکسلیک تیزابونو لپاره چې معوضونه هم ولری د نوم ایښودلو لپاره یې لاندی ټکي په نظر کې نیسی:


1. اوږد ځنځیر ټاکل کیږی چې د کاربوکسیل COOH -گروپ ولری.
2. په اوږد کاربنی ځنځیر کې د کاربن په اتومونو باندی نمبرونه لیکل کیږی.
3. شماره د هغه خوا څخه شروع کوو کوم خوا چې کاربوکسیل گروپ نږدی وی.
4. بیا د معوض لرونکو کاربنونو شماره ذکر کیږی او ورپسی د معوض نوم اخلو.
5. که معوضونه ډیر وی دانگلیسی الفباء توری په نظر کې نیسو.
6. که یو معوض دوه یا څوځلی راغلی وه د Tetra , Tri , Di مختاړی ورسره یوځای کوو.
7. په اخر کې د اړوند الکان د نوم e توری په oic acid بدلوو.

لاندی مثالونه په نظر کې نیسو :





5 - Bromo - 3 - chloro - 4 - ethyl hexanoic acid



3,3 - Di bromo - 5 - penyl hexanoic acid


2. د ډای کاربوکسلیک تیزابونو دنوم ایښودلو طریقه:

دا ډول تیزابونه د عمومي سیستم له مخی چې د سرچینی په اړیکه نومول کېږی، د مونو کاربوکسلیک تیزابونو په شان نومول کېږی. او د ایوپاک IUPAC په سیستم کې هم د مونو کاربوکسلیک تیزابونو په شان دی خوپه دی تیزابو کې نوم د dioic acid ډای ویک اسید په ورستاری باندی ختمیږی. لمړي هغه ځنځیر ټاکل کیږی چې د کاربوکسیل دواړه گروپونه ولری، کولای شو چې شمیره له هر طرف څخه پیل کړو ځکه چې د کاربوکسیل گروپ داوړد ځنځیر په دواړو طرفونو کې واقع دی. د ځینو مهمو ډای کاربوکسلیک تیزابونو د عمومي سیستم او ایوپاک سیستم نومونه په لاندی ډول دی: جدول (32):


ایوپاک IUPAC نوم	عمومي سیستم نوم	فورمول
Ethan dioic acid	Oxalic acid	HOOC-COOH
Propan dioic acid	Malonic acid	HOOC-CH ₂ -COOH
Butan dioic acid	Succinic acid	HOOC-(CH ₂) ₂ -COOH
Pentan dioic acid	Glutaric acid	HOOC-(CH ₂) ₃ -COOH
Decan dioic acid	Sebacic acid	HOOC-(CH ₂) ₈ -COOH

3. د الی سکلیک تیزابونو نوم ایښودنه:

که چیری تیزابونه الی سکلیک وی نو د نوم ایښودلو لپاره یې لومړی د سایکلو (Cyclo) کلیمه بیا د پلرنی هایدروکاربن نوم د (الکانو) په شکل اوبیا ورپسی د کاربوکسلیک اسید کلیمه ذکر کوو نو پوره نوم به یې سایکلو الکانویک اسید شی. په لاندې ډول:



Cyclo butaric acid




Cyclo propanoic acid

3. د اروماتیک کاربوکسلیک تیزابونو نوم ایښودنه:


ددی تیزابو پلارنی هایدروکاربن د بنزول دکړۍ څخه عبارت دی. چې کېدای شی د نفتالین (دوه کړۍ بنزین) هم د کاربوکسیل گروپ ولری او عضوی تیزابونه جوړ کړی.

په دغه مرکبونو کې د بنزول دکړیو هایدروجنونه د کاربوکسیل دگروپ سره عوض کېږی او دا ډول تیزابونه منځ ته راوړی چې د بنزین د مشتقاتو په شکل نومول کېږی لکه په لاندې بیلگو کې:




ارتوفتالیک اسید

یا اورتو بنزین ډایویک اسید




ارتوهاایدروکسی بنزویک اسید

یا فینایلیک اسید




بنزویک اسید


اورتوفینولویک اسید




فینایل استیک اسید
فینایل ایتانویک اسید



اورتوتالویک اسید
2- میتایل بنزویک اسید



پارابروموبنزویک اسی
یا 4- بروموبنزویک اسید



نفتوئیک اسید

د عضوی تیزابونو فزیکي خواص (Physical properties):

هغه کاربوکسیلیک اسیدونه چې تر 3 پوري د کاربن اتومونه لري په مایع حالت شتون لري او تیز بوي لري. په اوبو او عضوی محلولونو کې حل کېږي. هغه عضوی تیزابونه چې کم مالیکولي وزن لري د هغوي راډیکل کوچني وي. قوی تیزابي اغیزه لري.

هغه عضوی تیزابونه چې د اوږد زنځیر لرونکي وي د هغوي تیزابي اثر ضعیفه وي.


هغه عضوی تیزابونه چې د هغوي د کاربن د اتومونو شمیر د 10 څخه زیات وي په جامد (موم ته ورته) حالت پیدا کېږي په اوبو کې نه حلېږي. د عضوی تیزابونو د ایشیدو ټکې د مالیکولي وزن په زیاتوالي سره زیاتېږي برعکس د ویلی کېدو ټکې یې ټیټېږي.

د تیزابونو د هایډروکسیل د ګروپ فعالیت د الکولو د هایډروکسیل د ګروپ په پرتله زیات دي چې قطبي او د تعویض وړ دي. ځکه په اسیدونو کې د هایډروکسیل ګروپ د کاربونیل


د گروپ غیر مشبوع کاربن سره وصل وي . په داسي حال کې چې په الکولو کې د هایدروکسيل گروپ د مشبوع کاربن سره وصل وي.

عضوی تیزابونه تريو خوند لري لکه څرنګه چې د اکثره میوو د تريوالي علت د هغوي په ترکیب کې د عضوی تیزابونو شتون دي لکه تريو لیمو ، نارنج ، مالته او داسي نور په خپل ترکیب کې Citric acid او Tartaric acid لري.

عضوی تیزابونه کولای شي چې د الکولو په څیر هایدروجنی اړیکه جوړه کړي. نوموړي اړیکه په کاربوکسلیک اسیدونو کې د الکولو په پرتله ټینګه ده . ځکه په اسیدونو کې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د اړیکې قطبيت او د کاربونیل د گروپ د الکټرون اخيستلو (الکتروفيلي) خاصیت ډیر دي.



عضوی تیزابونه په خپلو مالیکولونو کې د مایع او جامد حالت په وخت کې د هایدروجنی پل اړیکه رامنځ ته کوي ، مګر په اوبلن محلولونو کې د هایدروجنی پل د اړیکې د رامنځ ته کېدو امکان نشته. د عضوی تیزابونو مالیکولونه د هایدروجنی پل د رامنځته کېدو په وخت کې کړیوال شکل غوره کوي لکه د هغه د دوه مالیکولونو څخه یو جمعي مرکب په لاندې شکل جوړېږي.



هایدروجنی اړیکه

په لاندې جدول کې د ځینو عضوی تیزابونو فزیکي خواص د الکولو سره پرتله شوي دي.

جدول (33):

نوم	كتله (Mass)	د ايشيدو ټكې °C
Formic acid	46	101
Ethanol	46	78
Acetic acid	60	118
Propanol	60	98

د عضوی تیزابو د ویلي کېدو او جوش ټکې د کاربنونو د شمیر یا مالیکولي کتلي سره مستقیماً متناسب دی یعنی څومره چې د کاربنونو شمیر او مالیکولي کتله زیاته وي هومره د ویلي کېدو او جوش ټکې هم زیات وي. د عضوی تیزابونو څلور لومړنۍ مرکبونه پوره په اوبو کې حل کېږي او د حل کېدو وړتیا د کاربوکسیل گروپ طاقت پورې اړونده ده چې داوبو د مالیکول سره هایدروجنی اړیکه جوړوي.



هر څومره چې د هایدروکاربن ځنځیر په عضوی تیزابو کې اوږدېږي هومره د عضوی تیزابو د حل کېدو چټکتیا لږېږي.

دغه تیزابونه په اسانۍ په ایتانولو، ایترو، او بنزولو کې حل کېږي.



د کاربوکسیک یا عضوی تیزابو کیمیاوی خواص (Chemical properties):

1. د عضوی تیزابو ارجاع کول:

که چیرې عضوی تیزاب ارجاع کړل شي په لومړي پړاو کې الډیهايد او په دوهم پړاو کې اولی الکول لاسته راځي:





که پورتنی فورمول کې $R = H$ شی نو داسی لیکو:





2. د عضوی تیزابونو تعامل د فعالو فلزونو سره :

عضوی تیزابونه د فعالو فلزونو سره د تعامل په نتیجه کې عضوی مالګه جوړوی او هایدروجن ازادوی:



3. د عضوی تیزابو د الکولوسره تعامل :

عضوی تیزابونه د الکولوسره تعامل کوی او په نتیجه کې ایسترونه او اوبه جوړوی:



د کاربوکسیلیک اسیدونو لاسته راوړنه:


1. د طبعي سرچینو څخه: څرنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه ډیري کاربوکسیلیک اسیدونه

د طبعي سرچینو څخه په لاس راوړل کېږي. لکه اسیتیک اسید د ایتایل الکول د محلول


د تخمر څخه جوړېږي. په داسي حال کې چې ایتایل الکول د قندي (ګلوکوز) موادو د تخمر

څخه په لاس راځي، د اسیتیک اسید لاسته راوړنه په دوو طریقو سره صورت نیسي.



لمړي مرحله: ګلوکوزو څخه د انزایم په واسطه د اکسیجن په نه شتون کې ایتایل الکول په لاس راځي.



دوهمه مرحله: په دغه مرحله کې ایتایل الکولو څخه د *Micoderma acdti* اصطلاحاً د سرکې زیردنده، او د هوا د اکسیجن په شتون کې اسیتیک اسید په لاس راځي.





2. **د اولي الکولو د اکسیدیشن څخه:** د اولي الکولو د اکسیدیشن په پایله کې د $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ او H_2SO_4 په شتون کې کاربوکسیلیک اسیدونه جوړیږي.




3. **د الډیهایډو د اکسیدیشن څخه:** الډیهایډ په خورا اسانۍ سره د نقرې د اکسایدونو په واسطه اکسیدي کېږي او کاربوکسیلیک اسید په لاس راځي.



4. **د الکېنونو د اکسیدیشن څخه:** الکېنونه د KMnO_4 د القلی تود محلول سره یو ځای کېږي او عضوی تیزاب جوړوی.




5. د ایسترونو دهایدرولیز خټه عضوی تیزابونه لاس ته راځي:





مثال:





6. که چیری الکېن ته داوبو په شتوالی کې د CO کاربن مونو اکساید سره تودوخه ورکړو اوبیا یی د فاسفوریک اسید سره یوځای د فشار لاندې په 400°C تودوخه کې په براس بدل کړو عضوی تیزاب لاسته راځي:



7. گرینارد د معرف او CO₂ د تعامل خټه عضوی تیزاب جوړیږي.



بیلگه:



د میریانوتیزاب یا فارمیک اسید (H – COOH):

دغه تیزاب چې چې بین المللی نوم یې میتانویک اسید دی د میریانو تیزابو په نوم هم مشهور دی ځکه چې په طبیعت کې په سرومیریانو ، غالبوزو همدارنگه په ځینو حشراتو او نباتاتو کې هم پیدا کېږي.



فارمیک اسید د دواړو ترمنځ یو بی مثال مرکب دی چې دوه ډوله وظیفوی گروپونو څخه جوړ شوی دی چې یو د عضوی تیزابو او بل د الدیهاید گروپ دی او کاربونیل گروپ یې هم شریک دی.


فارمیک اسید فزیکي خواص (Physical properties):

فارمیک اسید یوه بی رنگه تخریش کوونکې او تند بوی لرونکې مایع ده چې د ویلی کېدو تېکې یې 18,40C او د جوش تېکې یې 100,50C دی.


دغه تیزاب که د بدن په پوست کې ولوړي پوښتې سوځوی او تناکې جوړوي دا چې دغه تیزاب کاربوکسلیک دی او قطبي مالیکول لرونکي دی نو ځکه په اوبو کې ښه حل کېږي.

د فارمیک اسید کیمیاوي خواص (Chemical properties):

1. دغه تیزاب د عضوی ناپایداره تیزابوله جملې څخه دی او د کمزوري اکسیدیشن په واسطه په اوبو او کاربن ډای اکساید تجزیه کېږي.





2. د فارمیک اسید دگوگرو غلیظو تیزابو او تودوخی په صورت کې په کاربن مونواکساید او اوبو تجزیه کېږي یعنې که فارمیک اسید ډي هایدريشن شی لاندې تعامل صورت نیسی.




2. د فارمیک اسید نور تعاملونه:


- مالګه جوړول:



- د تودوخی د عمل په پایله کې تجزیه کېږي کاربن ډای اکساید او هایدروجن جوړوی.




- د الکول سره تعامل په نتیجه کې ایستر جوړوی.




د فارمیک اسید استحصال:


1. د H_2SO_4 , NaOH , CO د تعامل څخه په لاندې ډول فارمیک اسید لاسته راځي:



2. که اکزالیک اسید ته تودوخه ورکړو فارمیک اسید لاسته راځي:



3. د کلوروفارم او پوتاشیم هایدرواکساید تعامل په نتیجه کې فارمیک اسید لاسته راځي:



د عضوی تیزابو د استعمال ځایونه (Usages):


فارمیک اسید د الډیهایډونو په څیر د عفوني ضد (بدبوي ضد) بڼه خواص لري. د هغه لږه کچه په شاتو کې شتون لري چې د هغه له ورسیدو او خوسا کېدو څخه مخنیوی کوي. له فارمیک اسید څخه د حیواناتو د جسدونو په ساتلو او څرمنی په صنعت کې ګټه اخیستل کېږي. د یو شمیر عضوی او غیر عضوی مرکبونو د حل کوونکې او د نفرس ناروغۍ د درملنې او همدارنګه په لابراتوار کې د CO ګاز د لاسته راوړلو لپاره پکارېږي. چې په عمومي ډول فارمیک اسید د سرو او پلاستیک د تولید د لمړنیو موادو په توګه کارول کېږي.

اسیټیک اسید یا اسیټیک اسید څخه په صنعت کې په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. د سرکې تیزاب د مومو، کنډو او تیلو بڼه محلل دي. او د هغوي له مالګو څخه ارزښت لرونکي عضوی مرکبونه تر لاسه کېږي؛ د بیلګې په توګه میتان له سودیم استیت څخه او اسیټون له کلسیم استیت څخه لاس ته راوړل کېږي.

المونیم استیت د رنګونو د ځلا ورکونکو موادو په توګه، د کاغذ د ځلا لپاره، د ټوکړانو د ځلا لپاره او په درملو جوړونه کې د انټي سپټیک مادې او د اسهال ضد دوا په توګه کارول کېږي. سلولوز استیت چې د سرکې د تیزابو له مشتقاتو څخه دي، د لاکو، نه ماتیدونکو بڼیښو، د غوړیو د رنګونو او د تارونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي؛ په همدې توګه د ربړ جوړونې لمړني مواد هم دي. د 5 – 8% سرکې تیزابو څخه په خوړو کې ګټه اخیستل کېږي.

ایستر (Ester)

ایسترونه د اکسیجن لرونکو الکانونو او عضوی تیزابونو د مشتقاتو څخه عبارت دي چې د الکولو سره د عضوی تیزابونو د تعامل په پایله کې لاس ته راځي. د ایسترونو ساختماني فورمول عبارت دي له:






څرنگه چې ایسترونه د الکولو سره د عضوی تیزابونو له تعامل څخه لاسته راځي. له دي امله د ایسترونو په عمومي فورمول کې R د عضوی تیزابونو راډیکل او R' د الکولونو راډیکل دي.

نوم ایښودنه (Nomenclature of Esters):

1. **عمومي طریقه:** اول د الکولو د راډیکل نوم چې د فورمول ښې طرف ته قرار لري، ذکر کېږي او بیا د عضوی تیزابونو د راډیکل نوم چې د فورمول کېن لور ته قرار لري، داسې ذکر کېږي چې د عضوی تیزابونو د (- ic) کلیمه حذف کېږي او د هغه پړځاي د (- ate) توري ذکر کېږي. بیلگي:



2. **معمولي طریقه:** په دغه طریقه لمړي د راډیکل نوم بیا د عضوی تیزابونو د راډیکل نوم او په پای کې د Ester کلیمه ذکر کېږي. بیلگي:







کېمياوی خواص (Chemical properties):



1. **د ایسترونو هایدرولیز (Hydrolysis):** ایسترونه د اوبو سره د تعامل په پایله کې د کاني تیزابونو په شتون کې په الکولونو او تیزابونو تجزیه کېږي.




2. **د القلي سره د ایسترونو تعامل (Saponification):** که چیرې ایسترونه د القلیو (NaOH) سره تعامل وکړي یعنې تودوخه ورکول شي، الکول او د سودیم اسید مالګه په لاس راځي چې د (صابون جوړونې د عملیې) په نوم شهرت لري.



3. **د ایسترونو ارجاع:** ایسترونه د نکل ارجاع کوونکې فلز په شتون کې په (250 - 350°C) تودوخه او (136 - 204at) فشار لاندې د هایدروجن په واسطه په دوه مالیکوله مختلف النوع الکولونو بدلیږي.



4. **د امونیا سره تعامل (Ammonolysis):** ایسترونه د امونیا په واسطه د یو محلل لکه ایتانول په شتون کې په امید مرکباتو او الکولونو تجزیه کېږي.



5. **د HCN سره تعامل:** ایسترونه د HCN سره د تعامل په پایله کې په الکول سیاناید او کاربکسلېک اسید تجزیه کېږي.



فزیکي خواص (Physical properties):


هغه ایسترونه چې کم مالیکولي وزن لري په جامد حالت پیدا کېږي. د هغوي کم شمیر په اوبو کې حلېږي او زیات شمیر یې په اوبو کې نامنحل دي، بلکه په ایترو، الکولو او کلوروفارم کې په ښه توګه حل کېږي. ټول ایسترونه په زړه پوري بوي لري. له دې امله په عطر جوړونه او غذايي موادو ته د ښه بوي ورکولو په موخه کارول کېږي.

د اکثره میوو بوي د هغوي په ترکیب کې د ایسترونو د شتون له امله دي. د ایسترونو د ویلی کېدو ټکي د هغه تیزابونو څخه چې هغوي څخه تشکیل کېږي، کم دي.


د ایسترونو لاسته راوړنه:

په لاندې دریو طریقو سره لاسته راځي:

1. د الکولونو تعامل د کاربوکسیلیک اسیدونو سره (Esterification): معادلې یې د الکولونو او اسیدونو په بحث کې توضیح شوي دي.
2. د عضوی تیزابونو او الکایل هلایدونو له تعامل څخه:




4. **Reformatsky تعامل:** الډیهاید یا کیتون د α -هلو ایسترونو سره د Zinc فلزی کتلست په شتون کې تعامل کوي او β -هایدروکسی ایستر لاسته راځي. نوموړي تعامل د Sergey Nikolaevich Reformatsky له خوا منع ته راغلي دي.



لپیدونه (lipids = Glycerides)

(وازدي يا شحي مواد)

لپیدونه د ایسترونو د نوعي څخه دي چي د دري قیمتته الکولونو (گلیسرول) او دري مالیکوله عضوی تیزابونو څخه په لاس راځي او د هغوي عمومي فورمول په لاندې توگه دي:



فزيکي خواص (Physical properties):

ځينې لپیدونه په جامد حالت وي ، او ځينې نور لکه د زيتونو او پنبې غوړي مایع حالت لري. د جامد لپیدونو په ترکیب کې مشبوع عضوی تیزابونه او د مایع لپیدونو په ترکیب کې غیر مشبوع عضوی تیزابونه شتون لري. لپیدونه په اوبو کې نامنحل دي، په عضوی محلولونو لکه ایتر ، کلوروفارم او بنزين کې حل کېږي. لپیدونه د اوبو څخه سپک دي.

د لپیدونو د ایشیدو او ویلی کېدو ټکي د هغوي د مالیکولي وزن په زیاتوالي سره لوړېږي. د جامدو لپیدونو په ترکیب کې هغه اسیدونه چي د هغوي د کاربن تعداد جفت وي او 12 تر 20 اتوم وي ، شتون لري.



د مایع لپیدونو په ترکیب کې غیر مشبوع اسیدونه چي د هغوی د کاربنونو شمیر د 16 او 26 په منځ کې وي ، شتون لري. مایع غوړي په هوا کې په تدریجي توگه فاسد کېږي. ځکه دوه گوني اړیکه لري. د هوا اکسیجن جذبي او په سمی موادو چي خراب بوي لري تبدیلیږي، ددي

لپاره چي د هغوي د فاسد کېدو مخنيوي وشي هغوي د هايډروجن سره ترکيب کېږي ترڅو جامد شي او وړل راوړل يې اسانه شي.

د لپيدونو کيمياوي خواص (Chemical properties):


عموماً د لپيدونو کيمياوي خواص د ايسټرونو خواصو ته ورته دي چي مهم يې په لاندي توگه دي:

1. **هايډورليز (Hydrolysis):** لپيدونه د اوبو په واسطه د H_2SO_4 په شتون کې په عضوي تيزابونو او گليسرول تجزيه کېږي.




2. **هايډروجنيشن (Hydrogenation):** مايع غوړي چي د غيرمشبوع اسيدونو لرونکي دي

(لکه اولئیک اسيد) د هايډروجنيشن د عمليې په واسطه د نیکل په موجوديت کې په جامدو غوړيو بدليږي. لکه د مايع غوړيو د هايډروجنيشن څخه (گليسرول تراي اولئيت (Glycerotriolate) چي د اولئیک اسيد لرونکي دي، جامد غوړي په لاس راځي. په دغه عمليه کې نوموړو غوړيو Olic acid په Stearic acid تبديليږي.



3. د صابون جوړولو عمليه (Saponification): که چیري لپیدونه د القلیو سره د تودوخي په پایله کې تعامل وکړي، د هایدرولیز په نتیجه کې په گلیسرول او صابون تبدیلېږي. لکه د NaOH القلي سره تعامل: په دغه تعامل کې کتلیست Cu_2O اود تودوخي درجه 250°C

د د




هغه صابونونه چې په دغه طریقه لاسته راځي. که چیري د شحمي موادو څخه چې د غیر مشبوع اسیدونو څخه په لاس راځي، نرم صابونونه دي. او که چیري د هغه شحمي موادو څخه چې د مشبوع اسیدونو لرونکي وي کلک (سخت) صابونونه په لاس راځي.

که چیري د صابونونو په ترکیب کې شحمي اسیدونه چې د 10 څخه تر 12 پوري کاربن لري، شتون ولري، دغه ډول صابونونه په اوبو کې حل کېږي، زیات ځگ (کف) د غټو پوکانیو سره تولیدوي او کم دوام لري اما د هغه صابونونو په ترکیب کې چې د هغوي شحمي اسید د 13 څخه تر 16 کاربنونه لري په اوبو کې کم حلېږي ښه ځگ نه کوي او دوام لرونکي وي.

د لپيدونو استحصال:

په عمومي ډول سره لپيدونه د دري ماليکوله شحمي اسيدونو څخه د گليسرول سره يو ځای جوړېږي. لکه د Stearin لپيد لاسته راوړنه د Stearic acid څخه:



دولسم څپرکې

اروماتيکې مرکبات (Arenes)


هغه عضوی مرکبات چې د هغوي په ماليکول کې ځانگړې گروپ د شپږو کاربنونو څخه تشکیل شوي وي اود بنزول یوه کړۍ یې منځته راوړي وي د اروماتیک هایدروکاربنونو په نوم یادېږي. یا هغه مرکبات دی چې ښه بوی لری او خواص یې دبنزول په شان دي اود (Benzol) یا (Cyclo Hexatriene) څخه تشکیل شوي دي. یا هم هغه مرکبات دي چې یو بل پسې یوه او دوه گوني کوولانسي اړیکې لري. دمثال په توگه:



Benzol



Naphthalene




Anthracene


اروماتیک مرکبات د π -الکتروني واحد ترلې سیستم تشکیلوي اود هیوکل (Huckel) قاعده $(4n+2)$ ورباندې تطبیق کېږي که په دغه فورمول کې $(n=0,1,2,3,\dots)$ وي نو د اروماتیک مرکب په کړۍ کې $\pi = 2,6,10,14,18$ کېږي.

د بنزول لپاره $n=1$ اود π الکترونونو شمیر یې 6 کېږي، د نفتالین په کړۍ کې $n=2$ اود π الکترونونو شمیر یې 10 کېږي او په انتراسین کې $n=1$ اود π الکترونونو شمیر یې 14 کېږي په همدې ترتیب دوام پیداکوي.


هغه ماليکولونه چې د همواري سطحې لرونکي نه وي د هغوي د π الکترونونو شمیر د هیوکل $(4n+2)$ د قاعدې سره مطابقت نه کوي د بیلگې په توگه: سایکلو اکتاتترین اروماتیکې خاصیت نه لري.




سایکلو اکتاترین



سایکلو اکتاترین




[14]-annulene
 $4n + 2 = 4(3) + 2 =$
14 π electrons
aromatic



[18]-annulene
 $4n + 2 = 4(4) + 2 =$
18 π electrons
aromatic

Benzene
An aromatic compound



$4n + 2 = 4(1) + 2 =$
6 π electrons
aromatic

Cyclobutadiene
An antiaromatic compound



$4n = 4(1) =$
4 π electrons
antiaromatic

The Number of π Electrons That Satisfy Hückel's Rule

n	$4n + 2$
0	2
1	6
2	10
3	14
4, etc.	18

د اروماتیک مفهوم:



اروماتیک څه ته وايي؟

اروماتیکي مرکبات هغه مرکباتو ته وايي چې د لاندې شپږو شرایطو لرونکي وي چې کېدای شي ځيني نور عضوي مواد د نوموړو شپږو شرایطو لاندې قرار ولري.



1. لمړي شرط يې دادي چې د هغوي د مالیکول په هسته کې سکستيت (Sexted) (6p) الکترونونه شتون ولري.

2. د دغه ډول موادو عضوي مرکبات د اکسیدیشن میل نه لري.

په نورمال شرایطو کې اوبیز بروم ($\text{Br}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$) د بنزول سره تعامل نه کوي مگر د ایتلین سره تعامل کوي، په داسې حال کې چې دواړه يعني ایتلین او بنزول د دوه گونو رابطو لرونکي دي.



3. دغه ډول مرکبات د تعامل میلان نه لري.



4. په دغه ډول مرکباتو باندې د هیوکل قاعده د تطبیق وړ ده.

5. دغه ډول مرکبات په زړه پوري بوي لري. د بیلګې په توګه ګلان او ځانګړي سبزیجات چې د ارومات لرونکي وي.

بنزول اود هغه مشتقات (Benzol and derivatives of benzol):

بنزول د اروماتیک هایدروکاربنونو ترټولو ساده مرکب دي. عمومي فورمول یې (C_nH_{2n}) (6 دې. $N \geq 6$)

بنزول په (1825) م کال کې د انګلیسي فزیک پوه (Michael Faraday) له خوا د تدریجي تقطیر په واسطه د کب له تیلو څخه په لاس راوړل شو. له دې وروسته د اروماتیک بیلابیل مرکبونه په عطرونو کې ترلاسه او څرګند شوه چې د اړوندو کیمیاوي تعاملونو په واسطه کېدای شي دا مرکبونه په بنزول بدلون ومومي. په لمړي سر کې دا مرکبونه د بنزول د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا عطري موادو په نوم یاد شوي دي. ځکه د دوي زیاتره په زړه پوري بوي لري.

نوموړي مرکب ته له دې خاطرې بنزول وایي چې له بنزوئیک اسید څخه په لاس راځي او بنزوئیک اسید له ډیر پخوا خلکو د بنزوين په نوم پېژانده.


د بنزول یو مالیکول د شپږو کاربنونو او شپږو هایدروجنونو لرونکي دي او د هغه فورمول C_6H_6 دي. څو کاله وروسته هم د هغه مشرح فورمول واضح نه وو. کیمیاپوهانو له ډیرو فکرونو وروسته د بنزین لپاره مشرح فورمولونه پیشنهاد کړل.

هماغه وو چې الماني کیمیاپوه کپکولي (Kekule) له ډیر فکر کولو وروسته د بنزول مشرح فورمول پیدا کړ.




Friedrich August Kekule von Stradonitz


د بنزول مالیکولي، کړنیز او مشرح کړنیز فورمولونه او د هغه موډل (Model) په لاندې ډول توضیح کېږي.



**Kekulé description:
An equilibrium**




په 1925 م کال کې R.Robinson وړاندیز وکړ چې د بنزول په کړۍ کې د π درې اړیکې د یوې دایرې په شکل وښودل شي.



د بنزول هومولوگونه:

د بنزول هومولوگونه (الکایل بنزول) د نفتو او د ډبرو سکارو د قیر څخه لاس ته راوړل کېږي. همدا ډول کولای شو چې الکایل بنزول په لاندې میتودونو هم په لاس راوړو.

1. **Wurtz – Fitting Synthesis**: د Wurtz د الکانونو د استحصال طریقې Fitting په اروماتیکي هایدروکاربنونو باندې تطبیق کړه. د نوموړې طریقې په اساس هلوځن بنزول د الکایل هلوځن سره د سوډیم د ایتري محلول په شتون کې په الکایل بنزول بدلیږي.



2. Friedel – Crafts Alkylation


د اروماتيکي هايډروکاربنونو الکایلیشن د الکایل هلوجن په واسطه د کتلستي مقدار بې اوبو المونیم کلوراید په شتون کې ترسره کېږي.




د بنزول د مشتقاتو نوم ایښودنه:

که د بنزول کړۍ یو معوض ولري، نو د معوض نوم د بنزول سره یو ځای کېږي. لمړي د معوض نوم ورپسې د بنزول نوم اخیستل کېږي.


د بنزول ځینې مشتقات ځانګړي معمولي نومونه لري چې د IUPAC نړیوال سیستم له خوا هم منل شوي دي.




Fluor benzol




Chlor benzol




Brom benzol



Nitro benzol




(1 - Ethyl - 3 - methyl Benzol)




Tri Nitro toluene


(1 - Methyl - 2,4,6 - Tri nitro Benzol)




(1,3,4 - Tri methyl Benzol)




Toluene (Tolol)
(Methyl benzol)



Styrene
(Vinyl benzol)




Acetophenone
(Acetyl benzol)




Anisol
(Methoxy benzol)


C_8H_{10}
Xylene
(کسیلول)




Ethyl Benzol




O-Xylene
(1,2 - Di methyl Benzol)




M - Xylene
(1,3 - Di methyl Benzol)




P - Xylene
(1,4 - Di methyl Benzol)




Amino Benzol
(Aniline)



(2 - Cyano - 4 - Ethyl Aniline)




Hydroxy Benzol
(Phenol)




(2,4,6 - Tri Chloro Phenol)


د تولوین (تولول) په مرکب کې درې حالتونه Meta, Orta, Para حالتونه بنودل شوي دي.




P-Toluene

**1,2-Disubstituted benzene
ortho isomer**

ortho-dibromobenzene
or
o-dibromobenzene
or
1,2-dibromobenzene

**1,3-Disubstituted benzene
meta isomer**


meta-dibromobenzene
or
m-dibromobenzene
or
1,3-dibromobenzene

**1,4-Disubstituted benzene
para isomer**

para-dibromobenzene
or
p-dibromobenzene
or
1,4-dibromobenzene

Benzidine : اروماتيکي امين دي. چي ماليکولي فورمول يې $(C_6H_4NH_2)_2$ دي. معمولي نوم يې بنزيدين او په IUPAC سيستم کې د 1,1'-biphenyl يا 4,4'-diamine په نوم ياديږي. د بنزيدين څخه د مثاني (Bladder) او تريخي پورې اړوند (Pancreatic) سرطان (Cancer) کې، او د بنزيدين مشتقاتو څخه د رنگ په توليد کې گټه اخيستل کېږي.

بنزيدين مرکب روسي پوه Nikolai Zinin لاسته راوړ. جوړښتيز فورمول يې په لاندي توگه دي.

**د بنزول لاسته راوړنه (Preparation):**


بنزول او ځينې نور اروماتيکي هايډروکاربنونه د ډبرو سکارو څخه لاسته راوړل کېږي. که چيري د ډبرو سکارو ته د $(1000 - 1300^\circ C)$ پوري تودوخه ورکړل شي، نو د هغې څخه مختلف غازي، مايع قير او جامد مواد لاسته راځي چي اندازه يې سره توپير لري. د ډبرو سکارو او مايع

موادو څخه د تدریجي تقطیر او (Extraction) په واسطه ډیر مهم او باارزښته اروماتیکي مرکبات لکه بنزول، تولوین او زایلین او همدارنگه څو کړیوال ارومات لکه نفتالین، لاسته راوړل کېږي.




N.D. Zelinskiy
(1861-1953)


1. په تخنیک کې بنزول د اکاډمیسن زیلنسکي د تعامل په نظر په لاندې ډول لاس راځي.




2. د بنزول استحصال د بنزول د تیزابو له مالگو څخه:



3. د بنزول هومولوگونه په اساني سره د بنزول د هلو جندار مرکباتو څخه په لاس راځي.




4. Eilhardt Mitscherlich جرمني پوه په 1833 م کال کې بنزول د بنزوئیک اسید د ډي کاربوکسیلیشن (Decarboxylation) څخه په لاس راوړ.




5. نفت په زیاته پیمانه اروماتیکي مرکبات لري. د تودوخي په لوړو درجو کې د ځانگړو طریقو په واسطه د نفتو څخه اروماتیکي مرکبات حاصلیږي. ددې سره سره حاصل شوي اروماتیکي مرکبات ورځنۍ اړتیاوي نه پوره کوي نو له دې کبله د الکانونو


فرکشن (Fraction) چي د نفتو څخه په لاس راځي د سيکلایزیشن (Cyclization) او (Dehydrogenation) په مرسته په اروماتیکي مرکباتو بدلیږي. د بیلګې په توګه؛ که هګزان د تودوخې په لوړه درجه کې د فشار لاندې په دوامداره توګه د کرومیم او المونیم اکساید نه تیر کړو نو بنزول حاصلیږي.



په ورته توګه تولوین د هیپتان څخه د پلاتین کتلست په شتون کې لاس ته راوړل کېږي.



6. د میتایل سایکلو پنتان او سایکلو هګزان د مخلوط د ډي هایډروجنیشن څخه بنزول حاصلیږي.




د بنزول فزیکي او کیمیاوي خواص:

بنزول یوه بې رنگه مایع ده، چې د سانتي ګراد په 5,5 درجو کې په ویلي کېدو او 80,1 درجو کې په ایشیدو راځي. بنزول د زیاتره عضوي محلولونو سره لکه ایتر، الکول، اسیتون اود خالصو سرکې تیزابو سره په هر نسبت مخلوط کېږي، اوبه هم تر 1% پوري په اوبو کې حلېږي.

بنزول زهري (Toxic) خواص لري چې د ډیر وخت لپاره د هغه تنفس کول د سر ګرځیدني، استفراق او بي هوښی سبب ګرځي. د بنزول زیاته اندازه د ویني سره کړویات خرابوي او هم په بدن کې Arenoxide جوړوي چې د سرطان د ناروغي سبب ګرځیدلی شي.

تعویضي بنزول کېدلی شي چې د سختو شرایطو لاندې لکه لوړه تودوخه، لوړ فشار او یا د کتلیست په شتون کې د بنزول د تعامل څخه د Br_2 ، HNO_3 ، H_2SO_4 او ځینی نورو معیارونو سره حاصل کړو.



د بنزين زیاتره کیمیاوي خواص د هغه د اروماتیکي کرکتر څخه سرچینه اخلي.

په لاندې جدول کې د ځینو اروماتیک مرکباتو فزیکي خواص درج شوي دي.

جدول (34):


کثافت	ایشیدو تکی	ویلی کیدو تکی	فورمول	اروماتیک هایدروکاربنونه
0.8790	80.1	5.4	C_6H_6	بنزول
0.8669	110.6	-93	$C_6H_5 - CH_3$	تولول
0.8802	144.4	-28	$C_6H_4(CH_3)_2$	کسیلول
0.8642	139.1	-53	$C_6H_4(CH_3)_2$	اورتو کسیلول
0.8610	138.4	13	$C_6H_4(CH_3)_2$	میتا کسیلول
0.8669	136.1	-95	$C_6H_4(CH_3)_2$	پارا کسیلول
0.8944	176.1	-25.4	$C_6H_5 - C_2H_5$	ایتیل بنزول
0.8618	152.4	-96	$C_6H_5 - C_3H_7 - H$	پروپیل بنزول
0.8640	152.5	-96.9		ایزو پروپیل بنزول (گومول)
0.9090	145.2	-30.6		وینیل بنزول (ستیرول)
0.9295	142.4	-44.8		فینیل استلین

د بنزول مهم مرکبونه په لاندې ډول دي.

نفتالین (Naphthalene):

د نفتالین مالیکولي فورمول $C_{10}H_8$ دی، دا مرکب په 1819 م کال کې د ډبرو د سکارو د قیر له کنډ څخه ترلاسه شوي او د هغه جوړښت د وسکرسینسکي (A.A. Voskresensky) په واسطه ټاکل شوي دي.


نفتالين کرسټلي جامده ماده ده او ټاکلي بوي لري، د ویلي کېدو ټکې يې 80°C اود هغه د ايشيدو ټکې 218°C ده، نفتالين رنگه ماده ده، په اساني سره الوخي او حتی په عادي تودوخه کې پراس کوي، نفتالين په اوبو کې نه حلېږي؛ خو په عضوی حل کوونکو کې حل کېږي. د نفتالين د ماليکول کاربني اسکليټ د بنزول له دوو هستو څخه جوړ شوي دی چې د کاربن د دوو اتومونو په واسطه شریکې او متراکم شوي دي، د نفتالين په ماليکول کې د بنزول په شان نه مطلق دوه گوني اړیکې او نه يوه گوني اړیکې شتون لري.



Naphthalene

انتراسين (Anthracene):

د انتراسين ماليکولي فورمول $\text{C}_{14}\text{H}_{10}$ دی، دا مرکب د قير په کنډ اود انتراسين په غوړيو کې شتون لري چې له هغوي څخه د تبلور په طريقه کې جلاکېږي، خالص انتراسين يو جامد کرسټلي او بې رنگه ماده ده اود لاجوردي فلورسنس لرونکي دي، د هغه د ویلي کېدو ټکې 217°C او د ايشيدو ټکې يې 354°C ده. انتراسين په اوبو کې غير منحل او په تودو بنزينو کې په اساني سره حل کېږي. انتراسين له څو هستو لرونکو اروماتیک هايډروکاربنونو څخه عبارت دي چې د خطي بنزين له دریو هستو څخه جوړ شوي اود هستو جوړښت يې مسطح دي. د هغه اسکليټي جوړښتي فورمول په لاندې توگه دي.



Anthracene


فينول (Phenol):

د نوموړي سلسلې نوم د فين (Phen) څخه چې د بنزول پخوانی نوم وه مشتق شوي دي، په فينول کې د هايډورکسي (OH) گروپ مستقيم د بنزول د کرۍ سره وصل وي. د اروماتيکي هايډروکسي مرکباتو ځينې خواص د الکولو سره توپير لري، دا ځکه چې اروماتيکي π - الکتروني سيستم د OH - گروپ پر فعاليت اغيزه لري د بيلگي په توگه فينول د الکولو په پرتله قوي تيزابي خواص لري.


فينول (هايډروکسي بنزول) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{OH}$ د نوموړي سلسلې اساسی مرکب شميرل کېږي چې اول ځل Runge په 1834م کال کې د ډبرو سکارو د قير څخه جدا کړ. که څه هم زياته اندازه فينول تراوسه پورې د ډبرو سکارو د قير څخه لاس ته راوړل کېږي اما د فينول ورځنی اړتيا نه پوره کوي نو له دې آمله په تخنيک او تکنالوژي کې فينول په نورو طريقو او ميتودونو هم استحصال کېږي.




دوه اتومه فينول:




دري اتومه فينول:



پيري گالول



الفا - هايډروکسي گيډروکسينون




گلوخين
(تراي هايډروکسي بنزول)

د فينول مشتقات:

په فينول اود هغه په مشتقاتو باندې روسي کيميا پوه Alexander Pavlovich Dianin څيړنې سرته ورسولي، چي په پايله کې يې Bisphenol A مرکب لاسته راوړ چې د Dianin د مرکب په نوم هم ياديږي.

Bisphenol (BPA): هغه مرکب دي چي د طبي او اقتصادي پلوه د فوق العاده ارزښت لرونکي دي. نوموړي مرکب په 1891 م کال کې د Dianin له خوا سنتيز شو. د (BPA) مرکب کيمياوي فورمول عبارت دي له:




4, 4'-(propane-2, 2-diyl) diphenol
Or 2, 2-bis (4-hydroxyphenyl) propane.



د فينول استحصال:

1. په اوسني وخت کې فينول زياتره د Cumen (Iso propyl benzol) څخه لاس ته راوړل کېږي.


کېومین لمړی د هوا د اکسیدیشن په واسطه په کېومین هایدرواکساید بدلېږي چې د نریو تیزابو سره په فینول او اسیتون باندې بدلېږي.




2. د فینول استحصال د اروماتیک اسیدونو د سلفو مالګو څخه:



3. د هلوچندار اروماتیکونو څخه د فینول لاسته راوړنه:



4. د کاربو اسیدونو له ګروپ څخه د فینول لاسته راوړنه:



فزیکي خواص (Physical properties):

فینول کرسټالي شکل لري په اوبو کې په ستونزه حل کېږي، د ځانګړي بوي لرونکي دي. انتې سپټیک او زهرناک مواد دي کله چې د پوستکې سره اړیکه ونیسي پوستکې تخریش کوي. د هایدروکسیل د ګروپونو (OH) په زیاتوالي سره د هغوي د انحلال وړتیا زیاتېږي.

ديارلسم څپرکې

هتروسايکلیک (Heterocyclic) مرکبات

هغه عضوی مرکبات دي چې دهغوي په کړۍ کې نه يوازي د کاربن اتومونه بلکې د نورو عناصرو اتومونه لکه اکسيجن ، سلفر ، نائتروجن اوداسي نور شتون لري.


هتروسايکلیک مرکبات په طبیعت کې زیات شهرت لري. هتروسايکلیک مرکبات د ویتامینونو، الکولوئېدونو، پېپتایدونو، انټي بیوټیکونو، نیوکلیوني تیزابونو په تشکیل کې شتون لري. د حیواناتو او نباتاتو په وجود کې هم مهمه فزیولوژیکي عملیه سرته رسوي. او همدارول د رنگ جوړونې ، درمل جوړونې ، پولیمیرجوړونې په صنعت کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي.

د هتروسايکلیک مرکبونو شمیر ورځ په ورځ د ډیریدو او وسعت په حال کې دي په همدې موخه د هتروسايکلیک مرکبات د کیمیا د مستقل علم په توګه مسمی شوي دي.


هتروسايکلیک مرکباتو ته د هغوي په ترکیب کې اکسيجن، سلفر او نائتروجن اتومونو اهمیت وربخښلې دي.

د هتروسايکلیک مرکباتو نوم ایښودنه (Nomenclature):


دغه مرکبات په دوو شکلونو (بین المللي یا ژنیو ، سیستماتیک او معمولي یا تجارتي) نومول کېږي. هتروسايکلیک نوم ایښودنه د اروماتیک کاربوسايکلیکونو په څیر ده.




Furan




Thiophene




Pyridine




Pyrrole




تیازول




دای ازین




1,2 - اکسازول



2 - Methyl furan



5 - Amino - 1,3 - Di azine



2 - Methyl Peredine

فزیکی خواص (Physical properties):


فوران ، تیوفین او پیروول بی رنگه مایع ده په اوبو کې غیرمنحل دي، د هغوي د ایشیدو
تکې د الیفاتیکی هایدروکاربنونو څخه لوړ دي او د بنزول د هومولوگونو په څیر خواص لري.

څوارلسم څپرکې

کاربوهایدریتونه (Carbohydrates)



کاربوهایدریتونه هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدرجن او اکسیجن عناصرو څخه جوړ شوي دي. کاربوهایدریتونه په طبیعت کې د نورو عضوی موادو په پرتله زیات شتون لري او په ټولو ژونديو جسمونو کې شتون لري چې د ژویو او له هغې ډلې څخه د انسانانو د خوړو مواد دي.

روسي عالم شمیو (Karl Genrikhovich Schmidt) په 1844 م کال کې دغه مرکبات د (Carbohydrate's) (угле боды) په نوم یاد کړل چې د اوبو څخه تشکیل شوي دي. د کاربوهایدریتونو کاربوهایدریتونه د پنځم کاربن څخه پیل کېږي.



عمومي فورمول چې د شمیو په واسطه پیشنهاد شوي دي د ټولو کاربوهایدریتونو لپاره صدق نه کوي، مگر د اکثره کاربوهایدریتونو لپاره صدق کوي.

کاربوهایدريتونه په نباتاتو کې د Photosynthesis عمليې په واسطه د کاربن ډای اکساید او اوبو څخه د اکسیجن په ازادیدو سره جوړیږي. په نوموړي انزایمي سنتیز کې د نور انرژۍ ته اړتیا لیدل کېږي چې د کلوروفیل (Chlorophyll) په واسطه جذب کېږي. د فوتوسنتیز په واسطه دغه جوړ شوي مهم قند گلوکوز (Glucose) د پولی سکرایډ په څیر په نباتاتو کې د نشایستی او په حیواناتو کې د گلايکوجن په توگه ذخیره کېږي. گلوکوز د تنفس په واسطه تجزیه کېږي کاربن ډای اکساید، اوبه او انرژۍ ازادیږي.



د کاربوهایدريتونو نوم ایښودنه:

د کاربوهایدريتونو په نوم ایښودنه کې د کاربوهایدريت د نوم په پای کې د (Ose) کلیمه ذکر کېږي مثلاً گلوکوز (Glucose)، مالتوز (Maltose)، فرکتوز (Fructose) اوداسي نور.

کاربوهایدريتونه د خپل تشکېلاتي گروپ په لحاظ په دوه ډوله دي Aldo او Keto

جدول (36):

سیستماتیک نوم	د کتون گروپ	د الیهاید گروپ	کیمیاوی فورمول	د کاربن شمیر
تریوز	کېتو تریوز	الدو تریوز	$C_3(H_2O)_3$	3
تتروز	کېتو تتروز	الدو تتروز	$C_4(H_2O)_4$	4
پنتوز	کېتو پنتوز	الدو پنتوز	$C_5(H_2O)_5$	5
هگزوز	کېتو هگزوز	الدو هگزوز	$C_6(H_2O)_6$	6
هیپتوز	کېتو هیپتوز	کېتو هیپتوز	$C_7(H_2O)_7$	7

د کاربوهایدریتونو ډلې (Classification of Carbohydrates):

قندونه د کیمیاوي جوړښت له نظره په څلور ډوله دي.

1. ساده قندونه (Mono saccharides)
2. مرکب قندونه (Oligo saccharides)
3. پیچلي قندونه (Poly saccharides)
4. د قندونو مشتقات (Derivative of saccharides)

1. ساده قندونه یا مونو سکرایډونه (Mono Saccharides):

ساده قندونه (Simple sugars) یا مونوسکرایډونه د کاربوهایدریتونو هغه ډول دي د هایډرولیز (Hydrolysis) د عملیې په وسیله په یو یا څو مالیکولو قندونو باندي نه بدلېږي او د هغوي په مالیکولونو کې د کاربن د اتومونو شمیر له 3 څخه تر 9 اتومونو پوري رسیږي. مونوسکرایډونه په خوراکي توکو کې شتون لري ، د هگزوز (Hexoses) په نوم یادېږي. چې د تغذیې له مخي ډیر اهمیت لري. گلوکوز ډیر ساده مونوسکرایډ دي چې په ژونديو اورگانیزمونو


کې د انرژي د تولید او د میتابولیزم په عملیه کې بنسټیز رول لوبوي، نوموړي مرکبونه په ځیگر او نسجونو کې ذخیره کېږي او د هغوي مهمي سرچیني انگور او شات دي. چې مهم یې عبارت دي له:

a. د ویني قند یا گلوکوز Glucose


b. د میوي قند یا فرکتوز Fructose

c. د مغذیاتو قند یا گلکتوز (گلکتوز) Galactose


گلوکوز د تغذیې له مخي ډیر اهمیت لري په ډیرو میوو او سبزیجاتو کې پیدا کېږي. گلوکوز په دي دلیل مهم دي چې د انرژي د اصل سرچینې د مغزي حجرې ځیني شمیرل کېږي. فرکتوز په میوو او شاتو کې شته، گلکتوز چې په طبیعت کې په ازادانه توګه نه پیدا کېږي د عصبي نسجو په جوړښت کې برخه اخلي.




D - Galactose
(Aldo hexose)




Mannose
(Keto hexose)



Glucose




Fructose



د ساده قندونو خواص:

1. قندونه د O, H, C څخه جوړ شويدي.
 2. په قندونو کې د H او O نسبت 2:1 دی.
 3. د مشرح فرمول د جوړښت له مخې مستقیم ځنځیر لرونکي دي.
 4. د فعال کاربن څخه پرته نور ټول کاربنونه د OH گروپونه لري.
 5. د هایدروکسیل گروپونو شمیر د یو څخه زیات وي.
 6. قندونه د یو فعال الډیهاید او یا کیتوني گروپ لرونکي وي.
- قندونه د الډیهاید او کیتون د گروپ د لرلو له امله په دوو برخو ویشل شويدي.
- (a) هغه قندونه چې فعال الډیهاید گروپ ولري د الډیهاید قندونو یا Aldo Sugar په نوم یادېږي چې گلیسرول الډیهاید یو الډو شوگریا الډیهاید قند دي.
- (b) هغه قندونه چې فعال کیتوني گروپ ولري د کیتوني قندونو یا Keto Sugar په نوم یادېږي.

د انسان په بدن کې نشايسته د يو شمير انزايمونو په واسطه تجزيه کېږي په گلوکوز تبديليږي. د بيلگي په توگه د تايلين انزايم چې د خولي په لارو کې شتون لري نشايسته په گلوکوز تبديلوي. 3. مونوسکرايدونه د بوتليروف (A.M Butlerov) د تعامل په مرسته يعني په قلوي محيط کې د ميږي له تيزابو څخه په لاس راځي.



ټول مونوسکرايدونه د کرسټلي ساختمان لرونکي دي چې سپين رنگ لري، خوږ خوند لري، له اوبو سره هايډروجنې اړيکه ترې؛ نو ځکه حل کېدونکې دي، کاربوهايډریتونه د ښې او کېن دوران په نظر د ايزومېرونو لرونکي دي. مونوسکرايدونه په اوبو کې حل کېږي. نشايسته او سلولوز په اوبو کې نه حلېږي خو سريښ ډوله ماده توليدوي.

د ساده قندونو ساختمان:

د قندونو نوري فعاليت (Optical Activity of Sugar) :

که چيري د نور وړانگي د Nicol - Ca تيري کړو دا وړانگي په دوو برخو ويشل کېږي چې يوه برخه وړانگي د Nicol څخه تيريږي دا وړانگي د Polarized وړانگو په نوم ياديږي. مگر د روښنايي يا د وړانگو دوهمه برخه د Nicol څخه مستقيماً نه تيريږي او کېږي چې دا وړانگي د Non Polarized وړانگو په نوم ياديږي.


که چیري د نور وړانگي د خو نیکولونو څخه تیري کړو نو Polarized وړانگي به تري په مستقیم ډول تیري شي که چیري د قندونو یو محلول د Polarized وړانگو په مقابل کې کېږدو په دغه حالت کې Polarized وړانگي د قند په نوعیت سره ښي یا چپ خواته کېږي که چیري په دي وخت کې وړانگي ښي لوري ته کېږي شي دا ډول قند د Dextrotatory په نوم او که چیري وړانگي چپي خوا ته کېږي شي د Levrotatory په نوم یادېږي .

د Dextrotatory ښه (+1) D او Levrotatory ښه (-1) L ټاکل شويده .

Optical activity عملیه د قندونو د تشخیص اود قندونو د محلولونو د غلظتونو د معلومولو لپاره په کارېږي.


پورته مطلب په لاندې توگه توضیح کوو:

که ساده قندونه د $C = O$ گروپ څخه په لیری غیرمتناظر کاربن (Asymmetric Carbons) باندي د OH - گروپ د زنځیر ښی خواته واقع وي په D (Dextro) او که کېږي خوا ته واقع وي په L (Laevo) ښودل کېږي.




D(-) - Erythrose L(+) - Erythrose D(-) - Threose L(+) - Threose





هغه مرکبات چې دوه فعال نوری کاربنونه (Asymmetric Carbons) لري او پر دواړو کاربنونو باندي کم تر کمه دوه یو شان معوضي نصب وي نو په دي حالت کې د نوموړو مرکباتو ایزومیری د Erythro-Form او Threo-Form په توگه ښودل کېږي. په Erythro-Form کې دواړه یو شان معوضي د مثال په توگه د OH - گروپونه د فیشر د ساختماني فورمول په یوه خوا او د Threo-Form کې دواړو خواوو کې واقع وي.




Erthro - Form



Threo - Form



زیاتره طبیعی مونوسکرایدوننه د Pentosen او Hexosen په خیر پیدا کیري چې د هغوي د غوره او طبیعی Aldopentosen ، Aldohexosen او همدارنگه Ketohexosen د فیشر ساختمانې فورمولونه په لاندې توگه دي.





D(+) - Glucose

L(-) - Glucose

D(+) - Mannose

L(-) - Mannose



په طبیعت کې قندونه د جوړښت له مخې د وروستي دویم کاربن له نظره طبقه بندي کوي یعنې شماره د فعال کاربن څخه شروع کېږي، چې د قند نوم ایښودل د پنځم کاربن د هایدروکسیل له مخې معلومیږي.

که چیرې د پنځم کاربن د هایدروکسیل گروپ ښی خواته واقع وي نو د D- glucose په نوم او که چیرې چې خواته واقع وي نو د L- glucose په نوم یا دیږي. همدارنگه الفا او بیتا هم لري خو هغه وخت رامنځ ته کېږي چې په اوبو کې حل شي.

2. مرکب قندونه (Oligo Saccharides):

(دوه قیمتته قندونه یا دای سکرایدونه) (Disaccharides):


هغه قندونه دي چې د دوه تر لسو پوری ساده یو قیمتته قندونو د یو ځای کېدو څخه جوړ شوي وي او د Hydrolysis د عمليي په واسطه تری د دوو څخه تر لسو پوري ساده قندونه جوړیږی. په دوه ډوله دي:

1. **Homo Oligo Saccharides**: د هغه قندونو څخه عبارت دي چې د یو ډول ساده قندونو

د یو ځای کېدو څخه جوړیږي ددې ډول قندونو مثالونه Maltose او Cellobiose دي چې وروسته به وڅیړل شي.

2. **Hetro Oligo Saccharides**: هغه قندونه دي چې د دوو څخه تر دریو پوري مختلف یا ډول ډول قندونو څخه تشکیل شوي وي مهم مثالونه یې Lactose او Saccharose دي.

مرکب قندونه د دوه مالیکوله مونوسکراید د ترکیب څخه چې یو مالیکول اوبه د لاسه ورکوي حاصلیږي چې مهم مونو سکرایدونه گني قند یا سکروز (بوره)، لکتوز او مالتوز دي.




د ډای سکرایدونو عمومي خواص:

1. د ډای سکرایدونو عمومي فورمول $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ دی.
2. ډای سکرایدونه سپین رنگ لري او خوند یې خوږ دي.
3. د ټولو ډای سکرایدونو مالیکولونه بني خواته تاویږي او نور پولاریزیشن کوي.
4. ډای سکرایدونه هایدرولیز کېږي او د هغوي د هایدرولیز په پایله کې مونوسکرایدونه لاسته راځي.
5. د مهمو ډای سکرایدونو څخه یوه بوره ده، او نور مهم ډای سکرایدونه لکتوز، مالتوز او سلبیوز دي.

گلوکوز (Glucose) یا د گني قند (بوره):

جرمني کيمياپوه Andreas Marggraf په 1747 م کال کې Glucose د ممیزو (Raisins) په لاس راوړ.

بوره د یو مالیکول گلوکوز او یو مالیکول فرکتوز د نښلیدو له امله لاس ته راځي:




گلوکوز په ډیره کچه په نباتاتو؛ لکه لبلبو او گنيو کې موندل کېږي چې د اکسترکشن (Extraction) په میتود د هغوی څخه خالصه بوره په لاس راوړل کېږي. بوره په اوبو کې په اساني سره حل کېږي؛ خو په الکولو کې ډیره لږه حل کېږي. کله چې بوره هضم شي؛ په دی صورت کې په ځیگر کې گلوکوز او فرکتوز جوړ او وروسته له جوړیدو څخه په وینه کې جذبېږي.


گلوکوز د انگورو د قند په نوم هم یادېږي. کاربوهایدریتونه مخکې له دې چې په بدن کې انرژي تولید کړي لمړي په گلوکوز تبدیلېږي او بیا انرژي تولیدوي. گلوکوز په ډیره لږه اندازه په وینه او ادرارو کې شته. که چیري په ادرارو کې د گلوکوز اندازه زیاته شي د شکر د ناروغي (Diabetes) سبب گرځي. د قندي موادو کنترول په بدن کې د انسولین د هورمون په واسطه کېږي. گلوکوز یوه سپین رنګه ماده او خوږوالي یې د بوري په اندازه نه دي که چیري گلوکوز په ځان کې یو مالیکول اوبه ولري د مونوهایدرات (Mono hydrate) او هغوي چې د اوبو مالیکول نه لري د وچ گلوکوز (Un hydrous) په نوم یادېږي.

د گلوکوز څخه د شړیني، چاکلیټ او شربت جوړولو فابریکو کې ګټه اخیستل کېږي.


Emil Fischer په 1902 م کال کې د گلوکوز په څیړنو او جوړښتیز فورمول جوړولو د نوبل (Noble) جایزه ترلاسه کړه.

**Glucose****لکتوز (Lactose) یا د شیدو قند:**

لکتوز د شیدو په قند هم مشهور دي ، ځانگړي قند دي چې د 4 – 6 سلنه د غواگانو په شیدو کې او د 5 – 8 % سلنه د مور په شیدو کې شته دي لکتوز نباتي سرچینې نه لري.

**مالتوز (Maltose) یا د اوربشو قند:**

د مالتوز سرچینه د اوربشو دانې او نور نباتات دي. مالتوز کېدای شي د نشایستی او گلايکوجن څخه د امایلیز (Amylase) انزایم د کړنې په واسطه په لاس راوړل شي. نوموړي قند په 102 - 103°C تودوخه کې ویلې کېږي چې د څښلو اود خوراکي موادو په تولید کې ورڅخه گټه اخیستل کېږي. که چیري مالتوز د تیزابونو په شتون کې هایډرولیز شي، په گلوکوز بدلیږي.



3. پېچلي مرکب قندونه يا (Polysaccharides):

د څو ماليکوله ساده قندونو د يو ځای کېدو څخه منځ ته راځي مرکب قندونه د مختلفو عواملو د تاثير په نتيجه کې لکه تيزابون او انزايمو په و سيله تحليل او تجزيه کېږي او په ساده قندونو بدليږي او په هضمي سيستم کې جذبېږي دا ډول قندونه چې د تغذيې له مخي ډير اهميت لري د نشايستي، گلايکوجن او فايبري خوراکي سلولوز، پکيتين (د سلولوز سخت ډول) او لگنين نمونه اخيستلاي شو.

نشايسته (Starch):


نشايسته د گلوکوز د ماليکولونو د ترکېب ځيني لاسته راځي او د انسان په بدن کې د گټې وړ گرځي. په دانو او نباتي ريښو کې شته، د غله جاتو او حبوباتو عمده برخه جوړوي، په ريښو او د ځمکې لاندي لکه په کچالو او په ځينو نباتاتو کې په ډيره اندازه پيدا کېږي. اما اندازه يې په ټولو نباتاتو کې يو د بل سره توپير لري، د بيلگې په توگه په جوارو کې 60% نشايسته شتون لري.

د نشايستي عمومي فورمول $(C_6H_{10}O_5)_n$ دي.

نشايسته د هايډروليز په وخت کې چي د انزاييم په واسطه صورت نيسي، لمړي په مالتوز او بيا په گلوکوز تجزيه کېږي.

گلايکوجن يا حيواني نشايسته:

د گلايکوجن ماليکول نشايستي ته ورته دي او د څو زرو د گلوکوز د ماليکولو د ترکېب څخه جوړ شويدي، گلايکوجن په وينه او د حيواناتو په عضلو کې شته دي او يوازي د حيواناتو د کاربوهايډريتو د ذخيري څخه شميرل کېږي نو له دي امله ورته حيواني نشايسته وايې د اړتيا په وخت کې ذخيره شوي گلايکوجن د دوهم ځل له پاره په گلوکوز تحليل، تجزيه او تبديليږي او د گټې وړ گرځي نشايسته په اوبو کې منحل ده.



د گلايکوجن جوړښت چې هره دايره يې يو ماليکول گلوکوز دی.

د نشايستی خواص او استعمال:

نشايسته سپين، اوبه جذب کوونکي پوډر دي، چې په يخو اوبو کې نه حلېږي. که نشايستی ته د اوبو سره نږدې تر 90°C پورې تودوخه ورکړل شي نو د نشايستی يوه برخه (Amylose) د اوبو سره کلويډي محلول (Kalloid) جوړوي. ددغه محلول د فلترات څخه د الکولو په واسطه حل شوي نشايسته جداکېږي، د ايودين او پوتاشيم ايودايد د محلول سره ځانگړي آبي رنگ ورکوي. دغه تعامل د نشايستی او ايودين د تشخيص لپاره استعمالېږي. اميلوپکټين (Amylopectin) په اوبو کې نه حلېږي، د ايودين سره سور بنفش رنگ ورکوي.

که د نړيو تيزابو سره نشايسته (Amylose + Amylopectin) ته جوش ورکړل شي نو تر D - Glucose پورې تجزيه کېږي. که د نشايستي هايډروليز د مخه قطعه شي، نو د پولی سکر ايد زنځير په مختلفو کوچنيو ټوټو جداکيدل ډيره ستونزمنه ده.

که چيري نشايستی ته تر 180°C پوري تودوخه ورکړل شي په يوه سرينبناکه ماده (Dextrin) بدلېږي.

نشايسته په زياته پيمانه دغذا لپاره د وريجو، کچالو، اوږو او داسی نورو په شان په مصرف رسېږي.

سلولوز (Cellulose):

د نباتي حجرو دیوالونه په زیاته اندازه د سلولوز څخه جوړ شوي دي. پنبه 98% سلولوز لري، د لرگیو څخه 50% او د وانبو څخه نږدې 30% سلولوز لاس ته راوړل کیږي. سلولوز په اوبو او عضوي محلولو کې نه حلېږي. خالص سلولوز د پنبې څخه حاصلېږي.

د سلولوز فورمول $(C_6H_{10}O_5)_n$ دي، د سلولوز د مکمل هایدرولیز (Hydrolysis) څخه نږدې $(C_6H_{12}O_6)$ D – Glucose اود قسمي هایدرولیز څخه تر ځانګړو شرایطو لاندې دوه قیمتې قند Cellobiose جوړېږي.

د سلولوز نسبې مالیکولي کتله د 200000 نه تر څو میلیونو پورې ټاکل شوي ده چې د سلګونو تر زرګونو ګلوکوز مالیکولونو سره مطابقت کوي.

د سلولوز استعمال:

سلولوز په تخنیک کې ډیر زیات اهمیت لري او د لرگیو څخه د تیزابي (Sulfite سلفیت) طریقې او یا د القلي (Sulfate سلفات) طریقې په واسطه لاس ته راوړل کیږي.

څرنګه چې د ګلوکوز هر واحد د سلولوز په زنځیر کې درې ازاد هایدروکسیل ($-OH$) ګروپونه لري، چې په مختلفو کیمیاوي موادو سره تعامل کوي اود سلولوز مختلف مشتقات حاصلېږي. له همدې کبله د سلولوز د استعمال یو څو بیلګو څخه یادونه کوو.

د سلولوز زیات مقدار په تخنیک کې د کاغذ جوړولو لپاره په کار وړل کیږي. د لرگیو څخه حاصل شوي سلولوز د تیزابو سره په ګلوکوز هایدرولايز کیږي چې د ایتانولو د جوړولو اود حیواناتو د تغذیې لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.

4. د قندونو مشتقات (Derivative of saccharides):

هغه مرکبات دي چې د قندونو د Redox څخه په انساجو کې تولیدیږي او د حیواناتو د ژوند د پاره ډیر مهم دي د قندونو د اکسیدیشن څخه درې ډوله تیزابونه جوړیږي.

A. که چیرې د گلوکوز لمړي نمبر کاربن اکسیدیشن شي Gluconic acid گلوکونیک اسید جوړیږي. که چیرې دا کار د انساجو په داخل کې صورت ونیسي N.A.D.H جوړیږي چې د دې مرکب څخه بدن د شحمیاتو په جوړولو کې استفاده کوي.

B. که چیرې د گلوکوز وروستي یا شپږم نمبر کاربن اکسیدیشن شي Gluconic acid ورڅخه لاسته راځي د حیواناتو په انساجو کې د Gluconic acid او Vit-C څخه 300 Poly Saccharides جوړیږي.

C. که چیرې د یو ساده یو قیمت قند یا گلوکوز لمړي او وروستي دواړه کاربنونه اکسیدیشن شي سکریک اسید Saccharic acid جوړوي. چې د دې ډول تیزابونو څخه د حیواناتو په انساجو کې د انرژي د تولید د پاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د قندونو د ریدکشن څخه دوه ډوله الکول جوړیږي.

پنځلسم څپرکې

د هايډروکاربنونو نائټروجن لرونکي مرکبات

امينونه (Amines)

امينونه د امونيا له مشتقاتو څخه هم شميرل کېږي. ځکه که د امونيا په مرکب کې د هايډروجنونو په عوض د الکايل راډيکل يا د اريل راډيکل وصل شي اليفاتيک او اروماتيک نائټروجن لرونکي هايډروکاربنونه لاس ته راځي.

د تعويض شوي راډيکل له مخي امينونه په لاندي دري گروپونو ویشل کېږي.

1. **اولي امينونه (Primary Amines):** دغه ډول امينونه د يو راډيکل لرونکي وي چي د

امونيا د يو اتوم هايډروجن سره تعويض شوي وي.


نږدي ټول اولي امينونه د اړونده نيترو مرکباتو د ارجاع کولو څخه حاصلېږي.

2. **دوهمي امينونه (Secondary Amines):** د دغه ډول امينونو فورمول د دوه راډيکلونو



لرونکي وي چي د امونيا د دوو اتومونو هايډروجنونو سره تعويض شوي وي.

3. **درېمي امينونه (Tertiary Amines):** دغه ډول امينونه د دريو راډيکلونو لرونکي وي چي



د امونيا د دريو هايډروجنونو سره تعويض شوي وي.





امونيا



اولي امين



دوهمي امين




درېمي امين

انیلین (Aniline):

انیلین (Amino benzol) لمړی ځل لپاره یوه درمل جوړونکي Otto Unverdorben په 1826 م کال کې د طبیعي اندیگو Indigo څخه د Kalk (چونې) د تقطیر په واسطه حاصل کړ او په 1834 م کې Friedlieb Runge ډبرو سکارو کې په ثبوت ورساوه. وروسته Carl Julius Fritzsche په 1840 م کې د Indigo (anil، پرتگالی) د جداشتوی محصول په توګه دوباره کشف کړ او د هغې نوم یې Aniline کینود.

Nikolay Zinin تعامل: د روسیې د فزیکو-کیمیاوي ټولنې لمړي ریس Zinin په 1842 م کال کې Aniline د نائتروبنزول د ریډیکشن په پایله کې لاسته راوړ.




د امینونو نوم ایښودنه:

1. **معمولي طریقه:** لمړي د الکایل ګروپ چې د نایتروجن سره اړیکه لري ورپسې د Amine کلیمه ذکر کېږي.


$\text{CH}_3 - \text{NH}_2$, $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH}_2$, $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_3$, $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5$
(Methyl Amine) , (Ethyl Amine) , (Di methyl Amine), (Di ethyl Amine)

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{N} - \text{CH}_3 \end{array}$, $\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ | \\ \text{C}_2\text{H}_5 - \text{N} - \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$
(Tri methyl Amine) (Tri ethyl Amine)

2. **IUPAC په طریقه:** لمړي اوږد زنځیر ټاکل کېږي بیا په اصلي زنځیر کې شمیره له هغه طرفه پیل کېږي چې نایتروجن نږدې وي. وروسته له هغه د معوض لرونکي کاربن شمیره ، بیا د اړوند الکانونو نوم او په پای کې د Amine کلیمه ذکر کېږي.



(2 – Butane Amine)




(2 – Methyl Amine)

په دوهمي او دريمي امينونو کي د امين د هايډروجن سره تعويض شوي راډيکلونه د (N) په مختاري سره مشخص کيږي يعني لمړي د (N) توري بيا کوچني راډيکل او وروسته د اصلي زنځير د کاربن شميره او په پای کي د Amine کلیمه ذکر کيږي. لکه:




3 2 1

(N – Methyl Propane – 1 – Amine)



2 1





4 3 2 1

(2N-N – Tri methyl Butane – 1 – Amine)



(N/N – Di methyl Ethane Amine)

د امینونو کیمیاوی خواص:


1. د H_2SO_4 تعامل: امینونه د H_2SO_4 سره تعامل کوي الکایل المونیم سلفیت مرکب جوړوي.



2. د HNO_2 سره تعامل: اولي او دوهمي امینونه د نایترس اسید سره تعامل کوي الکول او اوبه جوړوي. لیکن دريمي امین د نایترس اسید سره تعامل نه کوي.





3. د ایتلین اکساید سره تعامل :



4. **Nikolai Menshutkin تعامل:** د مینسوتکین تعامل په پایله کې دریمې امین په الکایل امونیم کلوراید مالگو بدلیږي.



(Discovered by the Russian chemist Nikolai Menshutkin in 1890)





د امینونو لاسته راوړل:

د امینونو د لاسته راوړلو مهمې طریقي په لاندې توګه دي.

1. د الکایل هلایدونو سره د امونیا تعامل:





2. د سیانایدونو له ارجاع څخه: د Ni کتلست په شتون کې.





3. د امونیا سره د الکولونو تعامل:



د اولي امینونو لاسته راوړل:



د دوهمي امینونو لاسته راوړل:



د دریمي امینونو لاسته راوړل:




د امینونو د استعمال ځایونه:

د امینونو او د هغوي د مشتقاتو څخه د درمل جوړونې په صنعت کې د ځینو میکروبي ناروغیو په وړاندې د درمل جوړولو لپاره او همدارنگه د رنگ جوړولو په صنعت کې د مختلف النوع رنگونو د جوړولو لپاره او په کرهڼه کې د کیمیاوي سرو او د نباتاتو او گیاه گانو د آفاتو ضد درمل جوړولو کې په زیاته پیمانه کارول کېږي.

امایدونه (Amides or Corboxiamides)

که چیري د کاربوکسلیک اسیدونو په فورمول کې د هایدروکسیل (OH-) گروپ په (NH₂-) عوض شي امایدونه په لاس راځي.



د (R) راډیکل کېدای شي الیفاتیکی یا اروماتیکی وي نو ځکه امایدونه په دوو ډولونو ویشل کېږي ، الیفاتیکی امایدونه او اروماتیکی امایدونه.

فزیکي خواص:

Form amide (H – CO – NH₂) په عادي تودوخه کې په مایع حالت سره وي نور امایدونه په جامد او سپین کرسټلونو په شکل وي. د ایشیدو او ویلی کېدو ټکي یې د هم کاربنه کاربوکسلیک اسیدونو په پرتله زیات دي.

ساده او کم کاربنه امایدونه په آسانې سره په اوبو کې حل کېږي او د کاربوکسلیک اسیدونو په څیر د اوبو د مالیکول سره قوي هایدروجني اړیکه تړي.

د امایدونو نوم ایښودنه:

1. معمولي طریقه:

په دغه طریقه کې د اسیدونو د Acid کلیمه حذف کېږي وروسته د (- ic) پرځای Amide کلیمه راوړل کېږي. لکه

Formic Acid (H – COOH) ، Form Amide (H – CO – NH₂)

Acetic Acid (CH₃ – COOH) ، Acet amide (CH₃ – CO – NH₂)

Propanioc Acid (CH₃ – COOH) ، Propan amide (CH₃ – CO – NH₂)

2. **د IUPAC په طريقه:** په دغه طريقه کې لمړي د اړونده الکان نوم او وروسته د Amide کلیمه ذکر کېږي. لکه



Methane (CH₄)

Ethane (C₂H₆)

Methane amide (CH₃ – CO – NH₂) , Ethane amide (CH₃ – CH₂ – CO – NH₂)


Propane amide (CH₃ – CH₂ – CH₂ – CO – NH₂)

ځينې نور مثالونه:




(N- methyl – propane amide)

(N-N – di methyl – ethane amide)




د امايدونو په لاس راوړل:



1. د امونيا سره د اسيل هلايدونو تعامل:



2. د سيانايډونو د هايډریشن له عمليې څخه:




3. د امونيا او د ايسټرونو له تعامل څخه:



امينو اسيدونه (Amino Acids)

امينواسيدونه د نائتروجن لرونکو مرکباتو له جملې څخه دي چي په خپل ترکيب کې د کاربوکسيل او اميد گروپ لري. او عمومي فورمول يې په لاندې توگه دي.




فيزيکي خواص (Physical properties):

امينواسيدونه او د هغوي مشتقات هم قلوي او هم اسيدي خاصيت لري او په سپين رنگه کرسټلونو په شکل په جامد حالت وي. په اوبو کې منحل او په عضوي محلولونو کې کم منحل يا غير منحل دي.


امينواسيدونه د حيواني او نباتي ژونديو موجوداتو د عضوي ت د پروټيني موادو په ساختمان او ترکيب کې شتون لري.

د طبعي امينواسيدونو شمير تراوسه پوري 20 عدده دي چي د دوي د جملې څخه لاندې امينواسيدونه د انسان د وجود لپاره اړين دي. چي بايد د غذا له لاري ترلاسه شي په داسي حال کې چي د امينواسيدونو بقيي د بدن د ميتابوليزمي او کيمياوي فعاليت له مخي تامين کېږي.


1. Valine (Val)




2. Leucine (Leu)




3. Iso Leucine (ILe)




4. Threonine (Thr)



5. Methionine (Met)



6. Lysine (Lys)

**د امینواسیدونو ډولونه (Types of Aminoacids):**

د (R) د گروپ د خواصو په اساس امینو اسیدونه په درې ډولونو ویشل کېږي.

1. هغه امینواسیدونه چې د هغوي د (R) گروپ قطبي وي، د دغه ډول امینواسیدونو شمیر

7 دي چې عبارت دي له: (Gly) Glycine، (Val) Valine، (Leu) Leucine، Iso

(I-Le) Leucine، فینايل النین، (Ala) Alanine، او (Pro) Proline.

2. هغه امینواسیدونه چې د هغوي د (R) گروپ قطبي خو خنثی وي، د دوي شمیر هم 7 عدده دي چې عبارت دي له: (Ser) Serine ، (Thr) Troenine ، (Met) Methionine ، Cysteine ، (Cys) ، (Trp) Tryptopan ، (Asn) Asparigin او (Gln) Glutamine .
3. هغه امینواسیدونه چې د هغوي د (R) گروپ اسیدي یا قلوي وي . د دغه امینواسیدونو شمیر 6 عدده دي.

Tyroasine (Tyr) ، Glutamic Acid (Glu) ، Spartic Acid (Asp) ،
Histidin (His) ، Argenine (Arg) ، Lysine (Lys)

شپاړسم څپرکې

وېټامينونه (Vitamins)

وېټامين Vitamin د دوه کلیمو څخه اخیستل شوی چې (Vita) معني ژوند او (Amin) معني امین دی، چې امینونه د عضوی مرکباتو کورنۍ ده. څرنگه چې ټول وېټامينونه امینونه ندي خو په همدې نوم په نړۍ کې پیژندل شويدي.

وېټامينونه عضوی کتلتستونه يا اغيزمن مواد دي چې د انسان په بدن کې په کمه اندازه جوړیږي. د انسانانو او حیواناتو د بدن د عادي میتابولیزم (Metabolism) لپاره آړین دي، که چیرې دغه عضوی کتلتستونه يا اغيزمن مواد په خوړو کې نه وي نو د ډیرو سختو ناروغيو د منځ ته راتگ امکان شته. وېټامينونه د انسان په بدن کې نه جوړیږي باید د غذا له لاري واخیستل شي.

وېټامينونه د انحلالیت په اساس په دوه ډوله دي:

1. په اوبو کې منحل وېټامينونه

2. په شحمیاتو کې منحل وېټامينونه

په اوبو کې منحل وېټامينونه په لاندې ډول دي:

1. Thiamine يا Vitamin-B1

2. Riboflavin يا Vitamin -B2

3. Pantothenic يا Vitamin -B5

4. Pyridoxine يا Vitamin -B6

5. Niacine (Nicotinic acid) يا Vitamin -PP

6. Biotin يا Vitamin -H

7. Cobalamin يا Vitamin -B12


8. Folic acid يا Vitamin -B9

9. Ascorbic acid يا Vitamin -C

په اوبو کې د منحل ویتامینونو کېمیاوي فورمولونه په لاندې ډول دي:

1. Vitamin-B1 یا Thiamine:


B1 ویتامین لمړي ویتامین دي چې وخیږل شو. د C. Funk له خوا په 1911 م کال کې وموندل شو. په دې ویتامین کې د Pyrimidin کړۍ د یو میتیلین په مرسته د تiazol (Thiazol) کړۍ سره تړلې ده. نوموړی ویتامین نږدې په ټولو حیوانی او نباتی انساجو کې پیدا کیږي. تيامین د جېوباتو په پوستکۍ، خمیره او کچالو کې موندل کیږي، د حیواناتوینه او پښتورګي د تيامین غوره سرچینې دي.



2. Riboflavin یا Vitamin –B2:


په B2 ویتامین کې د Flavin یا Isoalloxazin کړیوال سیستم چې د Benzopteridin له مشتقاتو څخه دي، شتون لري. Riboflavin په طبیعت کې په زیاته پیمانه موندل کیږي، ژېړرنگی ژېړرنگه مواد دي چې په اوبو کې حل کیږي.

شیدي، غوښه او میوه جات د B2 ویتامین غوره سرچینې دي.




3. Vitamin -B5 یا Pantothenic

په B5 ویتامین کې د β - الاین د امین ګروپ د Pentanoic Acid د کاربوکسیل له ګروپ سره د اسید په بڼه تړل شوي دي. نوموړي ویتامین په طبیعت کې په پراخه کچه موندل کېږي. شیدې، هګي، پښتورګې، ینه، سره بانجان، ګلپي او کچالو یې غوره سرچینې ګڼل کېږي.



4. Vitamin -B6 یا Pyridoxine

د B6 ویتامین د پوه له خوا د خمیرې څخه جلا شو. د B6 ویتامین د تودوخې په وړاندې مقاوم او بې رنگه کرسټلونه لري. کبان، د هګي ژیر، غوښه، شیدې، خمیرمایه، حبوبات، ګلپي د B6 ویتامین سرچینې دي.




pyridoxine
(vitamin B₆)

(4,5 – Bis(Hydroxy methyl) – 2 – methyl – Pyridin – 3 – Ol)

5. Nicotinic acid (Vitamin -PP یا Nicotinic acid):

د Picolin د اکسیدیشن څخه د پوتاشیم پرمنگنیټ په شتون کې Nicotinic acid او نور مرکبات حاصلیږي. غوښه، پښتورگی، ینه، کب، هګي، شیدي، وریجی، غنم، بادام، سره بانجان، چای، قهوه او پانه لرونکي نباتات د Vitamin – PP سرچینې ګڼل کیږي. د نوموړي ویتامین د فقدان او کمبود په صورت کې د عصبي سیستم، هاضمي سیستم او پوستکي ناروغي رامنځ ته کیږي.




6. Biotin (Vitamin -H یا Biotin):

Biotin په 1936 م کال د Kogl له خوا د هګي د ژړو څخه او وروسته د Vigneaud له خوا د ځیګر څخه جلا شو. طبیعي بیوتین د تودوخې په وړاندې ځواکمن دي.

د H ویتامین د مهمو موادو له جملې څخه شمیرل کیږي. چي د جحراتو وده عیاروي او د مایکروارګانیزم د ډیرښت لپاره آړین فکتور دي.


په حیواناتو او نباتاتو کې په لږه اندازه پیدا کیږي. په ثبوت رسیدلې چې د انسان په بدن کې د پوستکي د عادی دندې لپاره د H ویتامین ضروري او موثر دي.



7. Cobalamin یا Vitamin -B12:

په کال 1948 م کې K. Folkers او E.L Smith په جدا ډول د B12 ویتامین په کرسټلی بڼه د ځیگر څخه جلا کړ. وروسته نوموړی ویتامین په بیولوژیکي موادو لکه شیدو، غوښه او په ځینو خاصو بکټریاوو کې وموندل شو.

د B12 ویتامین د کوبالت (CO) د شتون له سببه د Cobalamin په نوم یادېږي. د B12 ویتامین لاندې جوړښت په 1955 م کال د D.Crowfoot Hodgkin له خوا تشرېح شوی دي.




8. Folic acid یا Vitamin -B9:

د B9 ویتامین په 1938 م کال کې د Stokstad په واسطه د ځیگر څخه جلا شو. وروسته د پالکو د پانو او یو سلسله مایکروارگانیزمونو څخه په لاس راوړل شو. په لاتین کې Folium پانې

ته ويل کيږي له دي امله د Folic acid په نوم ياديږي. نوموړي ویتامين په پاسوليه، ماچوبه (يوډول سبزي)، لوبيا اود غنمو په تيلو کې موندل کيږي.

د فولیک اسيد په جوړښت کې Petrdine، Para amino benzoic او Glutamic acid شامل دي. له همدې کبله د Petroylglutamic acid په نوم ياديږي.





9. Ascorbic acid يا Vitamin -C:

د C ویتامين په 1926 م کال کې د Szent - Gyorgyi په واسطه جدا شو. او جوړښت يې په 1932/33 کال کې د Micheel او Hirst په واسطه تشرېح شو.

په 1933 م کال کې Haworth او Reichstein هر يو په ځانگړي توگه د C ویتامين سنتيز کړ. L(+)-Ascorbic acid اسيد په اوبو کې منحل ویتامين دي په ځانگړي توگه په تازه ميوه جاتو (مالټه، نارنج، او همدارنگه په کچالو، مرچ، بانجان او د کرم په ډولونو کې موندل کيږي. په بدن کې د هايډروفيل انټی اکسیدون په توگه عمل کوي. چي بدن ته په غذا کې نوموړي ویتامين ونه رسيږي د Skorbut د ناروغي سبب گرځي چي د پوستکي او د غاښونو د وري په ویني کیدو پيژندل کيږي.

VITAMIN C



په شحمو کې منحل ویتامینونه:

په شحمو کې منحل ویتامینونه د غذایي موادو په شحمې برخه کې موندل کېږي د بیلګې په توګه کله چې کوچ له مستو څخه جلا شي په شحمو کې منحل ویتامینونه په مسکه کې ځای په ځای کېږي او په اوبو کې منحل ویتامینونه په اوبلن محیط کې پاتې کېږي.

په شحمو کې منحل ویتامینونه د شحمیاتو سره یو ځای جذبېږي او د وینې له لارې ځګړېږي، ته انتقالېږي او په یڼه کې ذخیره کېږي. د نوموړو ویتامینونو انتقال په وینه کې د لیپو پروتینونو په واسطه صورت نیسي.

څرنګه چې په شحمو کې منحل ویتامینونه په اوبو کې غیر منحل دي له همدې کبله په تشو متیازو کې نه اطراح کېږي لکن په صفرا او ډکو متیازو کې څه ناڅه اطراح کېږي. دا ویتامینونه په عضویت کې ذخیره کېږي چې له همدې سببه د زیات استعمال په صورت کې ددغه ویتامینونو په ځانګړې توګه د ویتامین A، D او K تسمم منځ ته راتللی شي. ځګړ ددې ویتامینونو غوره سرچینه ده.

الکالوئیدونه (Alkaloides)

په نباتاتو کې پیدا کېدونکې مادي دي کوم چې نایتروجن لرونکي هتروسکلیک مرکبات دي.


تقریباً دوه زره (2000) الکالوئیدونه پیژندل شوي دي چې ډیری یې زهرجن دي بی رنگه کلکې (جامدي) مادي دي خو ځینی په مایع ډول هم شته خو شمیر یې لږ دی. د ځینو څخه په لاندې ډول یادونه کوو:

1. نیکوتین (Nicotine):

بې رنگه دی چې په هوا کې يې رنگ نښواری کېږي ټنباکو ته ورته بوی لری تیز خوند لرونکي مایع ده په ټنباکو کې د (0,6% - 0,9%) پورې پيدا کېږي. د ټنباکو د اکسټرکشن څخه لاسته راځي، ډیر سخت زهرناک دي د انسان بدن لمرې پاروي بیا په عصبي سیستم اثرکوی که چیري د نیکوتین (50-100mg) وخورل شی د مرگ سبب گرځي. یو سگریټ تقریباً د (12-15mg) نیکوتین لري چې ددی څخه تقریباً (30-50%) د سگریټ په دود (لوگي) کې برخه لري. کرهڼه کې د مضره حشراتو د وژنې او مخنیوي لپاره استعمالیږي.

د نیکوتین فورمول په لاندې ډول دي.


NICOTINE



1. مورفین (Morphine):

بې رنگه کرسټالي جوړښت لري په تاریاكو (افیون) کې پيدا کېږي، په 1952 م کال په مصنوعي ډول جوړ شول. د ډیر سخت درد د مخنیوي لپاره پکارېږي مگر په ډیر لږ وخت انسان عملي کوي بیا تری خلاصیدل ډیر کړاوجن وي.

فورمول يې په لاندې توگه دي.



سرچينې او اخذليکونه:

1. گلزاد، پروفیسور پوهاند دوکتور اسرارالدین، عضوی کیمیا درسی چپتر، کابل پولی تخنیک پوهنتون، کال 1389 ل.ل.
2. حسني، پروفیسور پوهندوي دوکتور محمداکبر، عضوی کیمیا درسی چپتر، کابل پولی تخنیک پوهنتون، کال 1390 ل.ل.
3. ولیزی، پوهندوی دوکتور گل حسن، عضوی کیمیا (2)، دهندریپرو مطبعه، کال 1387 ل.ل.
4. نهالگر، پوهنمل شیرمحمد، عمومی عضوی کیمیا، میهن خپرندویه ټولنه، پېښور، کال 1385 ل.ل.
5. باهر، دوکتور صالح محمد، کیمیا عضوی الیفاتیک، انتشارات قدس، چاپ سوم، سال 1394 هـ ش.
6. هیله من، پوهنوال فرمان الله، عضوی کیمیا، میهن خپرندویه ټولنه، ننگرهار پوهنتون، ښوونې او روزنې پوهنځی، کال 1393 ل.ل.
7. شیمی آلی (1)، رشته صنایع شیمیایی. مولفان: علی سیدی اصفهانی، مرتضی خلخالی، ویرایش دوم، سال 1394 هـ ش.
8. بېلابېلې ویب پاڼې.

9. Solomon

Fundamentals of Organic Chemistry, Fourth Edition.

10. Janice Gorzynski Smith

Organic Chemistry, University of Hawai'i at Manao, Third Edition, 2011.

11. Paula Yurkanis Bruice

Organic Chemistry, Fourth Edition.

12. John McMurry

Fundamentals of Organic Chemistry, Cornell University, Seventh Edition.

13. Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten, Catherine J. Murphy

Chemistry, The Central Science, Eleventh Edition, 2009.

14. Robert V. Hoffman

Organic Chemistry An Intermediate Text, New Mexico State University,
Second Edition, 2004.

15. В. Л. Белобородов, С. Э. Зурабян, А. П. Лузин, Н. А. Тюкавкина
Органическая Химия, Книга 1 Основной курс, МОСКВА · 2003.
16. А. П. Лузин, С. Э. Зурабян, Н. А. Тюкавкина, Ю. А. Колесник, А. А.
Кост, М. А. Штальман.
Органическая Химия, МОСКВА “МЕДИЦИНА” · 2003.
17. Н. А. АБАКУМОВА, Н.Н. БЫКОВА.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ОСНОВЫ БИОХИМИИ. Часть 1, 2010.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library