کتاب پیژندنه

د کتاب نوم:	اقتصادي رياضي
څانګه:	محاسبه
مولف:	عبدالعزيز جليلی
ژباړن:	عزت الله ځواب

د څار کمېټه:

- محمد آصف ننګ د تخنيکي او مسلکي زده کړو معين
- ډيپلوم انجنير عبدالله کوزاي د تعليمي نصاب رييس
- محمد اشرف وحدت په تعليمي نصاب کې د معينيت د مقام سلاکار

د تصحيح کمېټه:

- محب الرحمن محب
- عبدالجميل ممتاز
- احمد فهيم سپين غر

د ګرافيک او ډيزاين څانګې مسئول :	محمد جان عليرضايي
ګرافيک او ډيزاين:	محمد سليم خان
چاپ کال:	۱۳۹۲ لمريز کال
تيراژ:	۳۰۰۰
چاپ ځل:	لومړی
وېب پاڼه:	www.dmtvet.gov.af
برېښنالیک:	info@dmtvet.gov.af
کډ ISBN:	۹۷۸۹۹۳۶۳۰۰۵۳۸

Ketabton.com

د چاپ حق د تخنيکي او مسلکي زده کړو له معينيت سره خوندي دی

(c) ketabton.com: The Digital Library

ملي سرود

دا وطـــن افغانســـتان دی دا عـــزت د هر افـــغان دی

کـــور د سولې کـــور د تورې هر بچـــی یې قـــهرمان دی

دا وطـــن د ټولو کـــور دی د بلوڅـــو د ازبکـــو

د پـــښتون او هـــزاره وو د ترکمنـــو د تاجکـــو

ور سره عـــرب، ګـــوجر دي پامیـــریان، نورستانیـــان

بر اهـــوي دي، قـــزلباش دي هم ایمـــاق، هم پـــشه یان

دا هیـــواد به تل ځلیـــږي لکـــه لمـــر پر شـــنه آسمان

په سیـــنه کې د آسیـــا به لکـــه زړه وي جـــاوبدان

نـــوم د حـــق مـــو دی رهـــبر وایو الله اکبـــر وایو الله اکبـــر

(c) ketabton.com: The Digital Library

د پوهنې وزیر پېغام

ګرانو زده کوونکو، محصلانو او درنو ښوونکو!

د یوې ټولنې وده او پرمختګ کاملاً د همغې ټولنې د پیاوړو کاري کادرونو، بشري قوې او ماهرو فکرونو په کار او زیار پورې تړلې دي. همدا بشري قوه او کاري متې دي چې د هیواد انکشافي اهدافو ته د رسیدو لارې چارې طی کوي او د یوه نیکمرغه، مرفه او ودان افغانستان راتلونکی تضمینوي.

انسان په خپل وار سره د الله تعالی له جانبه او هم د خپل انساني فطرت له اړخه مؤظف او مکلف دی چې د ځمکې په عمران او د یوه سوکاله ژوند د اسبابو او ایجاباتو د تکمیل لپاره خپل اغیزمن نقش، همدارنګه ملي او اسلامي رسالت ادا کړي.

له همدې ځایه ده چې د یوه ژوندي او فعال انسان نقش، د خپل ژوند د چاپیریال او خپلې اړوندې ټولنې په اړه، تل مطلوب او په هیڅ حالت کې نه نفی کیږي او نه هم منقطع کیږي.

په ټول کې د پوهنې نظام او په خاصه توګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت مسوولیت او مکلفیت لري چې د اسلامي ارزښتونو، احکامو او همداراز معقولو او مشروعو قوانینو ته په ژمنتیا سره، د افغانستان په انکشاف کې فعاله، چابکه او موثره ونډه واخلي، ځکه دغه ستر او سپیڅلي هدف ته د رسیدو په خاطر د انساني ظرفیت وده، د حرفوي، مسلکي او تخنیکي کادرونو روزنه او پراختیا یو اړین مقصد دی. همدا په تخنیکي او مسلکي زده کړو مزین تنکي ځوانان کولی شي چې په خپلې حرفې او هنر سره په سیستماتیک ډول د هیواد انکشاف محقق او میسر کړي.

جوته ده چې په افغانستان کې د ژوند تګ لاره، دولتداري او ټولنیز نظام د اسلام له سپیڅلو احکامو څخه الهام اخیستی، نو لازمه ده چې زموږ د ټولنې لپاره هر ډول پرمختګ او ترقي باید په علمي معیارونو داسې اساس او بنا شي؛ چې زموږ د کارګر نسل مادي او معنوي ودې ته پکې لومړیتوب ورکړ شي. د حرفوي ظرفیت جوړونې تر څنګ د ځوانانو سالم تربیت او په سوچه اسلامي روحیې د هغوی پالنه نه یوازې پخپل ذات کې یوه اساسي وجیبه ده، بلکې دا پالنه کولی شي چې زموږ وطن پخپلو پښو ودروي، له ضعف څخه یې وژغوري او د نورو له سیاسي او اقتصادي احتیاج څخه یې آزاد کړي.

زموږ ګران زده کوونکي، محصلان، درانه استادان او مربیون باید په بشپړه توګه پوه شي، چې د ودان او نیکمرغه افغانستان ارمان، یوازې او یوازې د دوی په پیاوړو متو، ویښ احساس او نه ستړي کیدونکي جد او جهد کې نغښتی او د همدغو مسلکي او تخنیکي زده کړو له امله کیدای شي په ډیرو برخو کې د افغانستان انکشافي اهداف تر لاسه شي.

د دې نصاب له ټولو لیکوالانو، مولفینو، ژباړونکو، سموونکو او تدقیق کوونکو څخه د امتنان تر څنګ، په دې بهیر کې د ټولو کورنیو او بهرنیو همکارانو له مؤثرې ونډې او مرستو څخه د زړه له کومې منه کوم. له درنو او پیاوړو استادانو څخه رجامندانه هیله کوم چې د دې نصاب په ګټور تدریس او فعاله تدریب سره دې د زړه په ټول خلوص، صمیمي هڅو او وجداني پیکار خپل ملي او اسلامي نقش ادا کړي. د نیکمرغه، مرفه، پرمختللي او ویاړمن افغانستان په هیله

فاروق وردګ
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پوهنې وزیر

(c) ketabton.com: The Digital Library

لړليک

څپرکي	سرليکونه	پاڼې
لومړی	د رياضي ځينې مفاهيم او اصطلاحات	۱-۱۰
دويم	معادلې او توابع	۱۱-۲۸
دريم	الجبري معادلې	۲۹-۵٤
څلورم	رديفونه او سلسلې	۵۵-٦۲
پنځم	لوګارتم	٦۳-۸۰
شپږم	مترکس او ديترمينانت	۸۱-۸۸
اووم	د توابعو لمټ او مشتقات	۸۹-۹۲
اتم	د تابع تزايد او مشتقات	۹۳-۱۱۲
	سرچينې او اخيستنې	۱۱۳
	د ښوونيز نصاب د پراختيا د رياست پيغام	۱۱٤

(c) ketabton.com: The Digital Library

سریزه

په پیل کې هڅه شوې ده، چې د ځینو اصطلاحاتو او مفاهیمو په توضیح کولو سره لوستونکي د ریاضي له ژبې سره اشنا کړو او دوی د هغو مفاهیمو یو ټولیز تصویر له ځان سره ولري، چې اړتیا ورته لري.

دا کتاب د انستیټیوټ د لومړي کال د موضوعاتو په سویه ساده مثالونه لري، چې د توابعو په ګرافونو، معادلاتو، د معادلو په سیستم، مټرکسونو، دیټرمنانټونو، لوګارتم، سلسلو، ډټونو، مشتقاتو، د مشتق د کارولو او ورسره د تابع د تحولاتو او د صنعت او اقتصاد لپاره لارښوونې لري.

دا موضوعات په ساده عامو جملو کې له بېلګو سره یو ځای توضیح شوي.

له دې هرې موضوع نه یو ځانګړی کتاب جوړېږي؛ خو دلته هڅه شوې ده، چې په شنلي او لنډ ډول د ډېرو ساده او روښانه مثالونو پر مټ توضیح شي.

د دې مثالونو په زده کړې سره محصلین کولی شي، چې کم تر کمه د دې کتاب موضوعات زده او درک کړي.

سربېره پر دې د دې موضوعاتو په زده کولو سره محصل نه یواځې دا چې کولای شي د خپلې مسلکي ریاضیکي ساحې ستونزې حل کړي، بلکې له دې ور هاخوا کولای شي، چې د پرمختللیو ریاضیاتو لپاره تیاری و نیسي.

دا کتاب د محاسبې په ځانګو کې د تدریس وړ دی، د دې کتاب د لیکلو اصلي انګېزه د مفرداتو د راټولولو، د اداري او د محصلینو د غوښتنو او د مسلکي معینیت د تعلیمي نصاب د پراختیا د محترم ریاست هڅه او لارښوونه وه.

د دې کتاب په تدوین کې د معاصرو لویو ریاضي پوهانو له تألیفاتو او د اقتصادي مدیریت او حسابداری د ځانګو له ریاضیکي درسونو نه ګټه اخیستل شوې ده. دا کتابونه به له نیمګړتیاوو خالي نه وي؛ خو هیله ده محصلین، ځېرونکي او د نظر خاوندان په خپلو ارزښتمنو نظرونو او منطقي وړاندیزونو د دې کتاب په سمون او بشپړتیا کې له لیکوال سره همکاري وکړي.

په درنښت

عبدالعزیز جلیلي

(c) ketabton.com: The Digital Library

ټولیزه موخه:

د محاسبې په چاروکې د لازمو او د اړتیا وړ مهارتونو لاسته راوړل، د اقتصادي ریاضي د اصولو، اصطلاحاتو او قواعدو سره سم د ریاضي د مسایلو حل او په تولید، صنعت، احصایې او نورو برخو کې د دې کارول او ورسره د انسانانو ورځنی تکامل او پرمختګ او د ژوند په چارو کې له اقتصادي ریاضي نه ګټه اخیستل.

(c) ketabton.com: The Digital Library

د رياضي ځينې مفاهيم او اصطلاحات

ټولیزه موخه

د رياضي د اصطلاحاتو بيانول، تحليل او کارونه

د زده کړې موخې: د دې څپرکي په پای کې به محصلين د لاندېنيو موضوعاتو په اړه معلومات لاسته راوړي:

- له قواعدو، اصولو او اصطلاحاتو څخه په سمه توګه ګټه اخيستنه او د هغو توضيح.
- د مسايلو په بيان او حل کې د قواعدو، اصولو او اصطلاحاتو کارونه او ورسره د اقتصادي رياضي د مسايلو هوارول.
- د مفاهيمو او اصطلاحاتو په اړه د اقتصادي رياضي د موضوعاتو او قضيو تجزيه او تحليل.

Exponentتوان يا (طاقت)

هر کله چې يو الجبري حد څو ځلې په خپل ځان کې ضرب شي، کولای شو هغه داسې وليکو:

$$\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \ldots\ldots\ldots \cdot a}_{n} = a^n$$

په دې صورت کې a ته قاعده (Base) او n ته توان يا طاقت ويل کېږي.
طاقت په الجبر کې د قوانينو لرونکی دی.

د طاقت لرونکو عددونو قوانين

۱- د ضرب قانون: که چېرې قاعدې مساوي وي، له قاعدو څخه د يوې قاعدې په نظر

(c) ketabton.com: The Digital Library

کې نیولو سره توانونه جمع کېږي. مثلاً:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$1-a^2 = a \cdot a \qquad a^3 = a \cdot a \cdot a$$

$$a^2 \cdot a^3 = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a = a^{2+3} = a^5$$

$$2-x^4 \cdot x^3 = x^{4+3} = x^7 \qquad 3-(-x)^2 \cdot (-x)^5 = (-x)^{-2+5} = (-x)^3$$

$$3-x^{2m+3} \cdot x^{-m-5} = x^{m-2}$$

که چېرې قاعدې مختلفې او توانونه مساوي وي، په دې صورت کې قاعدې ضربېږي او له توانونو څخه یو نیول کېږي. مثلاً:

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$1-(3xP)^5 \cdot (2aPx)^5 = (6aPx)^5$$

$$2-(2xy)^{m+3} \cdot (-2x^2aP)^{m+3} = (-4x^3aPy)^{m+3}$$

که چېرې یو توان په سر بل توان ولري، په دې صورت کې له لاندې رابطې څخه کار اخسیتل کېږي:

$$(a^n)^m = a^{nm} \rightarrow (x^2)^3 = x^2 \cdot x^2 \cdot x^2 = x^6$$

$$(x^2)^3 = x^6$$

$$\left((x^{-2})^3\right)^2 = x^{-2 \cdot 3 \cdot 2} = x^{-12}$$

2- د تقسیم قانون: که چېرې قاعدې مساوي وې له قاعدو څخه یوه قاعده په نظر کې نیول کېږي او د صورت له توان څخه د مخرج توان منفي کوو:

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

مثال:

$$1-\frac{a^5}{a^3} = \frac{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}{a \cdot a \cdot a} = a \cdot a = a^2$$

$$\frac{a^5}{a^3} = a^{5-3} = a^2$$

که چېرې په پورته رابطه کې توانونه مساوي وي لاندې نتیجه په لاس راځي.

$$\frac{a^n}{b^n} = a^{n-n} = a^0 = 1 \rightarrow \left(\frac{a^n}{a^n}\right) = \left(\frac{a}{a}\right)^0 = 1$$

که د تقسیم په قانون کې قاعدې مختلفې او توانونه مساوي وي کولای شو ولیکو:

(c) ketabton.com: The Digital Library

یعنې قاعدې تقسیمېږي او پر یوه توان لیکل کېږي.

$$\frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$$

مثال:

$$\frac{\left(6x^3p^2\right)^4}{\left(3x^2p\right)^4}=\left(\frac{\left(6x^3p^2\right)}{\left(3x^2p\right)}\right)^4=(2xp)^4$$

له پورته رابطې څخه لاندې رابطه پیداکولای شو.

$$a^{-1}\cdot a^1=1\rightarrow a^{-1}=\frac{1}{a}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n}\cdot\left(\frac{a}{b}\right)^{-n}=1$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^n}=\frac{1}{\frac{a^n}{b^n}}=\frac{b^n}{a^n}=\left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n}=\left(\frac{b}{a}\right)^n$$

مثالونه:

$$1-(mx)^{-5}\div(mx)^{-3}=(mx)^{-5+3}=(mx)^{-2}=\frac{1}{(mx)^2}$$

$$2-\left(\frac{1}{n}\right)^{-3/2}\div(n-1)^{-3/2}=\frac{\left(1/3\right)^{-3/2}}{(n-1)^{-3/2}}=\left(\frac{1}{n}\right)^{-3/2}\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^{3/2}$$

$$=\left(\frac{1}{n}\right)^{-3/2+3/2}=\left(\frac{1}{n}\right)^0=1$$

فکتوریل، د فکتوریل مفهوم او د فکتوریل د استعمال ځای

د طبیعي عددونو سیټ په نظر کې نیسو: $N=\{1-2-3-4-5-6-7-8-9.....\}$

یو په بل کې د دې ټولو عددونو د ضرب حاصل فکتوریل نومېږي او په لاندې ډول ښودل کېږي.

$$1\cdot2\cdot3\cdot4.....n=n!$$

د n! دا رنګه ښودنې ته د n فکتوریل ویل کېږي، کولای شو n! په لاندې ډول هم وړاندې کړو.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$n! = n(n-1)(n-2)(n-3).....3\cdot 2\cdot 1$$
$$n! = n(n-1)! \Rightarrow (n-1)! = \frac{n!}{n}$$
$$(1-1)! = \frac{1!}{1}$$

که چېرې $n = 1$ قېمت واخلي په نتيجه کې صفر فکتوريل دی.

$$0! = 1$$

مثالونه:

$$5! = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5 = 120$$
$$(n-3)! = (n-3)(n-4)(n-5)...3\cdot 2\cdot 1$$
$$(n+1)! = (n+1)n!$$

فکتوريل په ترکيبي انالیز کې د کارونې زيات ځايونه لري، همدارنګه د ضريب د لاسته راوړلو لپاره د بينوم حدونو انکشافي شکل $(a+b)^n$ کېدای شي د ګټې اخستنې وړ وي.

۱ - د پارټيشن په عمليه کې بدلون (permutation)، چې د شيانو، اعدادو، حروفو او کلماتو مخې ته ځای پرځای کول دي، د مثال په ډول:

د a توری يواځې يو بدلون لري a

a,b د دوو بدلونونو لرونکي دي ab , ba

a,b,c د شپږو بدلونونو لرونکي دي abc bac cab acb bca cba

له پورتنيو رابطو څخه دا نتيجه په لاس راځي.

$$1! = 1 \qquad 2! = 1\cdot 2 = 2$$

$$3! = 1\cdot 2\cdot 3 = 6$$

ګورو چې د اجزاء په زياتېدو د ډلو شمېر هم زياتېږي، که اجزاء هرځومره زياتېږي د ډلو پېژندل ستونزمن کېږي؛ خو کولای شو، چې له فکټوريل څخه په ګټې اخستنې د هغو شمېر معلوم کړو، د مثال په ډول که m د اجزاء شمېر وي د ډلو شمېر به يې د دې $Pm = m!$ فورمول د اجزاوو د ځای پر ځای کولو له مخې ټاکل کېږي.

مثال: د يو څلور رقمي عدد 1,3,5,4 د ځای پر ځای کولو د رقمونو شمېر په کار دی، په دې ځای کې لکه څنګه چې ارقام څلور رقمي دي د پورته فورمول له مخې لرو:

$$P_4 = 4! = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4 = 24$$

۲ – په ترتيب (Arrangement) کې

$$\left(\begin{matrix} n \\ A_m \end{matrix}\right) = \frac{m!}{(m-n!)}$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

۳ - په ترکیب کې

$$\binom{m-n}{m} = \frac{m!}{(m-n)!n!}$$

په دوه حده انکشاف کې

$$(a+b)_n^n \in IN$$

$$(a+b)^n = \frac{a^n}{0!} + \frac{na^{n-1}}{1!}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}\cdot b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^{n-2}\cdot b^2 + ... + \frac{n!}{n!}b^n$$

$$(a+b)^7 = \frac{a^7}{0!} + \frac{7ab}{1!} + \frac{6\cdot 7}{2!}a^5b^2 + \frac{5\cdot 6\cdot 7}{3!}a^4b^3 + \frac{4\cdot 5\cdot 7}{4!}a^3b^4 + \cdots\cdots + b^7$$

$$(a+b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7$$

یادونه: باید وویل شي چې د ریاضي په یو شمېر موضوعاتو کې، چې فکتوریل کارول کېږي د ترکیبي انالیز موضوعات یادول د دې کتاب په بحث کې نه دي؛ بلکې د فکتوریل د کارونې ځایونه پکې شامل دي.

مثلاً:

$$e = \sum_{K=0}^{n} = \frac{1}{K!}$$

جذري الجبري افادې

که $n \in N, a, x \in R^+$ او $x^n = a$ وي؛ نو $x = \sqrt[n]{a}$ دی. لیدل کېږي، چې د دې رابطو په منځ کې منطقي تعادل موجود دی.

مثالونه

$$x^n = a \Leftrightarrow x = \sqrt[n]{a}$$

$$2^4 = 16 \Leftrightarrow \sqrt[4]{16} = 2$$

$$3^3 = 27 \Leftrightarrow \sqrt[3]{27} = 3$$

جذر

که الجبري افاده د کسري توان $a^{m/n}$ لرونکې وي، کولای شو هغه د الجبري جذر په شکل ولیکو

دعدد توان تر جذر لاندې a

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

د جذر توان n

مثالونه

$$(3x)^{2/3} = \sqrt[3]{(2x)^2}, (x+y)^{7/6} = \sqrt[6]{(x+y)^7} = \sqrt[6]{(x+y)^6}\cdot\sqrt[6]{(x+y)} = (x+y)^6\cdot\sqrt{x+y}$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د جذرونو همدرجه کول

که جذري الجبري افادې د مختلفو جذري درجو لرونکې وي؛ د همدرجه کولو لپاره يې ترټولو کوچنی مشترک مضرب د جذرونو درجې ټاکو، په جذري درجه يې تقسيموو او نتيجه د افادې په طاقت کې تر جذر لاندې نيسو.

مثال

$$\sqrt[5]{a^2}, \sqrt[3]{b} = \sqrt[15]{a^6}, \sqrt[15]{b^5}$$

$$\sqrt[5]{3^2}, \sqrt[5]{2} = \sqrt[15]{3^6}, \sqrt[15]{3^5}$$

د جذرونو مقايسه

په هغه صورت کې چې جذر همدرجه وي، هغه جذر لوی دی چې مجذور يې لوی وي.

مثال

$$\sqrt{64}, \sqrt{25}$$

$$\sqrt{64} > \sqrt{25}$$

که د جذرونو درجې يو شان نه وي، اول يې همدرجه کوو او بيا يې مقايسه کوو.

مثال

$$\sqrt[5]{6}, \sqrt[3]{4}$$

$$\sqrt[15]{6^3}, \sqrt[15]{4^5} \rightarrow \sqrt[15]{216}, \sqrt[15]{1064} \rightarrow \sqrt[5]{6} < \sqrt[3]{4}$$

مثال

$$\sqrt{3}, \sqrt[3]{2} \rightarrow \sqrt[6]{3^2}, \sqrt[6]{2^2}$$

$$\sqrt[6]{9}, \sqrt[6]{4} \Rightarrow \sqrt{3} > \sqrt[3]{2}$$

د جذرونو فورمولونه

$$1)\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

$$2)\sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m = a^{m/n}$$

$$3)\sqrt[n]{a^n} = (a)^{n/n} = a$$

$$4)\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$5)\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$6)\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

پر جذري الجبري افادو باندې اساسي عملیې

د هغو جذرونو ضرب، چې د يو شان جذري درجو درلودونکې وي:

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$1)\sqrt[n]{a^m}\cdot\sqrt[n]{a^t}=\sqrt[n]{(a)^{m+t}}$$
$$2)\sqrt[3]{(3x)^3}\cdot\sqrt[3]{(2x)^2}=\sqrt[3]{(3x)^3\cdot(2x)^2}=\sqrt[3]{108x^5}$$
$$3)\left(-2\cdot\sqrt[4]{2x^2y^3}\right)\left(3\sqrt[4]{3x^3y^2}\right)=-6\cdot\sqrt[4]{6x^5y^5}=-6xy\sqrt[4]{6xy}$$

که چېرې جذري توانونه متفاوت وي، همدرجه کوو يې او بيا يې ضربوو .

مثال

$$1)\sqrt[3]{x^2y^4}\cdot\sqrt{xy}=\sqrt[6]{(x^2y^4)^2}\cdot\sqrt[6]{(xy)^3}$$
$$=\sqrt[6]{(x^4y^8)}\cdot\left(x^3y^3\right)=\sqrt[6]{x^7y^{11}}=xy\cdot\sqrt[6]{xy^5}$$
$$2)\sqrt[5]{2x^3y^2}\cdot\sqrt{2xy}=\sqrt[10]{(2x^3y^2)^2}\cdot\sqrt[10]{(2xy)^5}$$
$$=\sqrt[10]{(4x^6y^4)(32x^5y^5)}=\sqrt[10]{(2^2x^6y^4)(2^5x^5y^5)}$$
$$=\sqrt[10]{(2^7x^{11}y^9)}=x\cdot\sqrt[10]{(2^7xy^9)}$$

د جذرونو د تقسيم عمليه

که چېرته جذري توانونه مساوي وي، تر همدغه جذري توان لاندې مجذورونه تقسيموو.

$$\frac{\sqrt[n]{x^p}}{\sqrt[n]{x^t}}=\sqrt[n]{x^{p-t}}$$

مثالونه

$$1)6\cdot\sqrt[4]{3}\div3\cdot\sqrt[4]{2}=2\cdot\sqrt[4]{\frac{3}{2}}$$
$$2)\sqrt[3]{m+n}\div\sqrt[3]{(m+n)^2}=\frac{\sqrt[3]{m+n}}{\sqrt[3]{(m+n)^2}}=\frac{1}{\sqrt[3]{m+n}}$$

که چېرې جذرونه مختلفې درجې ولري:

$$1)\sqrt[3]{(ax)^5}\cdot\sqrt{ax}=?$$
$$=\sqrt[6]{((ax)^5)^2}\cdot\sqrt[6]{(ax)^3}=\sqrt[6]{(ax)^{10}\cdot(ax)^3}=\sqrt[6]{(ax)^{13}}=(ax)^2\cdot\sqrt[6]{ax}$$

تر جذرونو لاندې د افادو د عامل رفع او د هغو عکس

د امکان په صورت کې د جذر د درجې په نظر کې نيولو سره مجذور تجزيه کوو او له جذر نه يې خلاصوو.

$$1)\sqrt[3]{54x^5}=\sqrt[3]{27x^3\cdot2x^2}=\sqrt[3]{(3x)^3\cdot2x^2}=3x\sqrt[3]{2x^2}$$
$$2)\sqrt{54x^5}=\sqrt{9\cdot6x^4\cdot x}=\sqrt{3^2\left(x^2\right)^2\cdot6x}=3x^2\cdot\sqrt{6x}$$
$$3)\sqrt[3]{81x^9y^3}=\sqrt[3]{27\cdot3x^9\cdot y^3}=3x^2y\sqrt[3]{3}$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د مجذور په توګه د غير جذري افادې راوړل

په دې صورت کې د افادې توان د جذر د توان په اندازه پورته وړو: يعنې $a\cdot\sqrt[5]{b}=\sqrt{a^5b}$

مثالونه

$1)2\cdot\sqrt{3}=\sqrt{2^2\cdot 3}=\sqrt{4\cdot 3}=\sqrt{12}$

$2)y\cdot\sqrt[3]{2x}=\sqrt[3]{(2y)^3\cdot 2x}=\sqrt[3]{8xy^3}$

د جذرونو د جمعې او تفريق عملیې

په جذري افادو د جمعې او تفريق عمليه هغه وخت ترسره کولای شو، چې جذرونه يو شان وي. جذرونو ته هغه وخت يو شان جذرونه وايو، چې جذري درجه يې له يو بل سره مساوي او تر جذر لاندې افادې له يو شان درجې او تورو تشکيل شوې وي.

مثلاً:

$1)3\sqrt[5]{3a^2x}-\sqrt[5]{3a^2x}=(3-1)\sqrt[5]{3a^2x}=2\sqrt[5]{3a^2x}$

$2)\sqrt{2}+\sqrt{8}=\sqrt{2}+\sqrt{4}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{2}+2\sqrt{2}=(1+2)\sqrt{2}=3\sqrt{2}$

مرکب جذرونه

د يوه جذري عدد ترکيب له يوه غير جذري عدد سره او يا هم د دوو يا څو غير مشابه همدرجه جذرونو ترکيب ته مرکب جذرونه وايي.

مثلاً:

$2-\sqrt{2},\sqrt{5}+3,\sqrt{x}+a,\sqrt{a}-\sqrt{b}$

$a\sqrt{x}+2y,-m+\sqrt{n},2\sqrt{c}-\sqrt{x}$

۱- د مرکبو جذرونو د جمعې اوتفريق عمليه: پر مشابه جذرونو د جمعې او منفي عمليه کېدای شي؛ نو بناً په مرکبو جذرونو کې هم دا قاعده د تطبيق وړ ده.

$1)A=3+2\sqrt{5}A+B=\{3+2\sqrt{2}+(-7+4\sqrt{5})\}=-4+6\sqrt{5}$

$B=4\sqrt{5}-7$

$3+2\sqrt{5}$

$2)A-B=\dfrac{\mp 7\pm\cdot\sqrt{5}}{10-\sqrt{5}}$

$3)A=3x+4\sqrt{2y}$

$B=-3\sqrt{2y}+x$

$3x+4\sqrt{2y}$

$\mathrm{A}+\mathrm{B}=\dfrac{x-3\sqrt{2y}}{4x+\sqrt{2y}}$

$3x+4\sqrt{2y}$

$A-B=\dfrac{\pm x\mp 3\sqrt{2y}}{2x+7\sqrt{2y}}$

(c) ketabton.com: The Digital Library

۲- د مرکبو جذرونو د ضرب عملیه: په مرکبو جذرونو کې د ضرب عملیه د الجبري پولینومونو د ضرب په څېر ده:

مثال:

$$1)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)=x-y$$

$$2)\left(x+\sqrt{y}\right)\left(2x-\sqrt{y}\right)=2x^2-x\sqrt{y}+2x\sqrt{y}-\sqrt{y^2}=2x^2-x\sqrt{y}+y$$

د جذرونو د ناطق کولو عملیه

په یوه جذر کې ناطق کول داسې یوه عملیه ده، چې که چېرې تر جذر لاندې افاده ضرب شي او له هغې څخه یوه غیر جذري افاده لاسته راشي، په مرکبو جذرونو کې د ناطق کولو عامل د هغې مزدوج دی، هره جذري افاده په ځانګړي ډول د ناطق کولو عامل لري.

$$1)\sqrt[n]{x} \quad \rightarrow \quad \sqrt[n]{(x)^{n-1}}$$

$$2)\sqrt[3]{x} \quad \rightarrow \quad \sqrt[3]{x^2}$$

$$3)\sqrt[7]{m^3} \quad \rightarrow \quad \sqrt[7]{m^4}$$

$$4)\sqrt{P} \quad \rightarrow \quad \sqrt{P}$$

$$5)2x+\sqrt{y} \quad \rightarrow \quad 2x-\sqrt{y}$$

$$6)3x+\sqrt{2m} \quad \rightarrow \quad 3x-\sqrt{2m}$$

$$7)\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y} \quad \rightarrow \quad \left(\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}\right)$$

$$8)\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y} \quad \rightarrow \quad \left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}\right)$$

۳- د مرکبو جذرونو د تقسیم عملیه: د مرکبو جذرونو د تقسیم په عملیه کې له ناطق سازۍ نه په ګټه اخیستو مخرج په غیر جذري افاده بدلوو او بیا د تقسیم عملیه تر سره کوو.

مثالونه

$$1)\frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}=\frac{(x-y)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}=\frac{(x-y)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}{x-y}=\sqrt{x}+\sqrt{y}$$

$$2)\frac{x-y}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}=\frac{(x-y)\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}\right)}{\left(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}\right)\left(\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}\right)}=\frac{(x-y)\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}\right)}{(x-y)}=$$

$$=\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

لومړي څپرکي پوښتنې

۱- د اعدادو په کرښه د $\sqrt{5}$ موقیعت وټاکئ؟

۲- له طاقت او جذر نه یې خلاص کړئ؟ $i^5,-i.i^3,i^8.i$

$\sqrt{i^4},\sqrt[6]{-1},\sqrt[4]{-16}$

۳- لاندې افادې جذري شکل ته راوړئ؟ $\left(x^2-1\right)^{1/2},\left(2xy^3\right)^{1/2}$

٤- لاندې افادې د طاقت په شکل ولیکئ؟ $\sqrt[14]{(x+a^2)^7},\sqrt[4]{(3xy)^6}$

٥- همدرجه یې کړئ؟ $\sqrt[6]{2n},\sqrt[3]{9n},\sqrt[5]{y^2+1},\sqrt[15]{y^2+1}$

٦- مقایسه یې کړئ؟ $\sqrt[7]{6},\sqrt[6]{5},\sqrt[5]{4},\sqrt[3]{3},\sqrt[5]{x^2},\sqrt[5]{x}$

۷- لاندې افادې ساده کړئ؟ $\sqrt{\sqrt[4]{\sqrt[2]{(x+y)^{32}}}},\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt{(5x)^{24}}}}$

۸- تقسیم یې کړئ؟ $\sqrt{15ab^2}\div\sqrt[3]{3a^2b},\sqrt[7]{8x^3}\div2\sqrt[5]{x^2}$

۹- ضرب یې کړئ؟ $\sqrt[3]{3x^2},\sqrt{9x},\sqrt[3]{x^2}\cdot\sqrt[5]{x}=?$

۱۰- ممکنه عاملونه له جذر نه رفع کړئ؟ $\frac{2}{3}\sqrt{50ab^5},\frac{1}{3}\sqrt{27x^3y^2}$

(c) ketabton.com: The Digital Library

معادلې او توابع

ټولیزه موخه

د معادلو، توابع او د هغو د ډولونو په مفهوم پوهېدنه او د توابعو ګراف او په اقتصادي مسایلو کې د هغو کارونه

د زده کړې موخې: د دې څپرکي په پای کې به محصلین په لاندې برخو کې معلومات ترلاسه کړي:

- د رابطې او تابع مفهوم او د هغو د تحولاتو د ساحې پېژندنه.
- د یو شمېر کاري توابعو او د هغو پېژندل، چې د مربوطه ساحې په منځ کې په کارېږي.
- د ګرافونو رسمولو لپاره له توابعو څخه کار اخیستل او په اقتصادي ډګرونو کې د کمي او کیفي بدلونونو ښودنه.
- د یوې اقتصادي پروژې د اقتصادي رشد په مسایلو کې له توابع نه ګټه اخیستنه.

رابطه او تابع

د رابطې مفهوم: په ټولنیز ژوند کې د انسانانو تر منځ بېلابېلې اړیکې شتون لري لکه : محمود د احمد ورور دی، کریم د محمود پلار دی.

وکیل د محمود ملګری دی، مجید د قیوم ملګری دی او داسې نور، په پورته مثالونو کې ورور کېدل، پلار کېدل او ملګری کېدل د انسانانو تر منځ اړیکې راښیي.

د همدې په څېر د ریاضي د کمیتونو په منځ کې بېلابېلې اړیکي شتون لري **لکه:** $a = b$, $2 > 1{,}5$, $11 > 3 - 9$ او نور ، چې $<$ ، $>$ او $=$ علامې د دوو عددونو یا دوو الجبري افادو په منځ کې رابطه ټاکي، همدارنګه د سیټونو تر منځ هم اړیکې شته.

(c) ketabton.com: The Digital Library

لومړی مثال: که چېرې د $A=\{a,b,c,d\}, B=\{2a,2b,2c,2d\}$ سېټونه په نظر کې ونیسو، ګورو، چې د B سېټ عناصر د A سېټ د عناصرو له دوه چنده کېدو څخه لاسته راغلي؛ نو د A او B سېټونو ترمنځ اړیکه دوه چنده کېدل دي، چې کولای شو په لاندې شکل یې وښایو.



که د دوه چنده کولو رابطه په R وښایو، په دې حالت کې دA او B سېټونو عناصر د R رابطې ته په پام سره لاندې مرتب جوړه سېټونه راښيي.

$$R=\{(a,2a)\ (b,2b)\ (c,2c)\ (d,2d)\}$$

په دې حالت کې R د مرتب شویو جوړو ګڼ سېټ دی، چې د هرې جوړې اوله مرکبه د A سېټ د عنصر مرتب او د هغې دویمه مرکبه د B سېټ عنصر ښيي. همدارنګه دA سېټ د ډومین Domain په نوم یا د هغې د تعریف ساحه او د B سېټ دRange په نوم د رابطې د قیمتونو ساحه یادولای شو:

دویم مثال



(c) ketabton.com: The Digital Library

لیدل کېږي چې د P او Q سیټ تر منځ رابطه د مربع کېدو رابطه ده، چې هغه د ترتیب شویو جوړو په شکل لیکو.

$$F = \{(1,1), (2,4), (-2,4), (3,9), (-3,9)\}$$

درېیم مثال:



د M او N دوه سیټونه مطالعه کوو، د M او N تر منځ رابطه مضرب کېدل راښیي، چې کولای شو هغه په لاندې مرتب شویو جوړو کې وښایو.

$K = \{(18,3), (18,6), (12,11), (34,17), (35,5), (35,7)\}$ سیټ

کله چې د A او B سیټونو عناصر د یو شرط او اصل لاندې ترتیب شوې جوړې جوړې کړي دا اصل او شرط د A او B سیټونو تر منځ رابطه ده.

که چېرې د A او B دوو سیټونو د عناصرو تر منځ یو پر یوه رابطه پیدا شي د A سیټ د B سیټ سره معادله رابطه لري.



که چېرې M یو اختیاري سیټ وي د R یو فرعي سیټ له $M \times M$ څخه د M په رابطه کې وایو:

(c) ketabton.com: The Digital Library

$R \subset M \times M$

معمولاً د $(x,y) \in R$ لپاره داسې لیکل کېږي. $x \approx y$

معادله رابطه

په M کې یوې رابطې ته هغه وخت معادله رابطه ویل کېږي، چې

د انعکاس خاصیتونه $x \approx x \quad x \in m$ د ټولو لپاره

تناظري خاصیتونه $x \approx y \Rightarrow \quad y \approx x$

انتقالي خاصیتونه $x \approx y, y \approx z \Rightarrow x \approx y$ وي.

نوت: هرکله چې یوکیفي سیټ وی، نو دټولو جفتو مرتب سیټ.

$M \times M := \{(x,y) / x, y \in M\}$

ته د M کارتیزین د ضرب حاصل وایي.

لاندې هر یو مثال یوه رابطه را پېژني:

$1)\{(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(2,0)\}$

هغه سیټ چې د هرې جوړې د اعضاوو مجموعه یې له 3 څخه کمه ده.

$2)\{(0,1),(1,1),(3,1)\}$

$3)\{(1,4),(1,8),(1,9)\}$

$4) y^2 = x, y = x^2, y = \pm\sqrt{x}$

$5) f(x) = 2x^3 - 3$

توابع

د انالیز یو له په زړه پورې مسایلو څخه د توابعو مطالعه ده. یعنې د دوو متحولونو تر منځ د تابعیت(پیروی) مطالعه، چې په یو وخت تغیر کوي. د علومو په زیاتره ساحو، لکه ریاضي فزیک، تخنیک، اقتصاد حتا ټولنیزو مسایلو لکه احصایو او نورو کې له همدې مسایلو سره مخ کېږو.

تعریف: تابع د دوه یا څو متغیرو تر منځ تبعي رابطې ته وایي. یا په بل عبارت، یو متغیر له بل متغیر سره د رابطې له مخې تړاو مومي. چې په دې حالت کې یو ته خپلواک متغیر او بل ته تابع متغیر وایي، کلي شکل یې $y = f(x)$ دی. په دې ځای کې x خپلواک متغیر او y د هغې تابع دی. د خپلواک متغیر په هکله ویلای شو، چې x کولای شي په خپله خوښه او خپلواکه توګه د (a,b) په فاصله کې تحول وکړي، همدارنګه تابع کولای شو په لاندې ډول توضیح او تعریف کړو:

(c) ketabton.com: The Digital Library

د دوو حقیقي اعدادو D او R دوه مجموعې په نظر کې نیسو د f یو تابع د هر حقیقي عدد تابع x ، D مجموعه یواځې یو حقیقي عدد f(x) د R مجموعې ته ربط ورکوي.

د D مجموعه د تابع د تعریف ناحیه او د R مجموعه د F تابع د قیمتونو ناحیه نومېږي. د یاد ربط د لیکلو معمولي بڼه په لاندې ډول ده.

f – function	$f : D \to R$
D - Domain	$X \to f(x)$
R - Range	

معمولا د لیکلو لاندې ډول کارول کېږي.

د لیکلو پورتنی ډول کولای شي لاندې شکل ته واوړي.

د f توری له D څخه R ته تابع را ښیي، یعنې د F په وسیله د x هر قیمت د D مربوط د f(x) یو قیمت R سره ربط ورکړل شوی دی.

په لنډه توګه تابع داسې تعریفولای شو:

تابع عبارت له یوې رابطې یا د A ا و B دوه سیټونو ترمنځ ارتباط دی، داسې چې د A د سیټ له هر عنصر سره یواځې او یواځې د B سیټ یو عنصر ربط پیدا کړي.



$y = f(x)$ یا yx دا مفهوم لري، چې y د x تابع دی.

تابع یا Function چې د لومړي ځل لپاره G.W Leibniz ترې په (1646 – 1716) ګټه اخیستې د f یو میپینګ چې د هغې د تعریف ساحه D(f) او د هغې د تصویرساحه B(F) ده د IR فرعي سیټونو تابع نومېږي او دارنګه لیکل کېږي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$f:\quad D(f) \to B(f)$

$f:\quad D(f) \to IR$

د فاصلې په اړه کېدای شي دا ډول توضیح ورکړو:

د $a,b \in R$ دوه عددونه په نظر کې نیسو، دا دوه عددونه کولای شي یوه فاصله (انټروال) شي سره د دې چې د x متغیر د{a,b} تر منځ فاصله کې واقع شوی، یعنې $a \le x \le b$ دلته کولای شو ووایو، چې x خپل حقیقي ټول مقادیر په یاده فاصله کې اختیاروي. په پورته نا مساوي کې a د فاصلې لاندې حد او b د فاصلې پورته حد نومېږي.

د انټروال ډولونه

۱- پرانیستې: که په ذکر شوې فاصله کې a او b د فاصلې جز نه وي، په دې حالت کې پرانیستې فاصله نومېږي او په لاندې ډول ښودل کېږي.

(a , b) , a< x <b

$A = \{x / x \in R , a < x < b\}$



2 - نیمه پرانیستی: په دې حالت کې یو له a او b څخه د فاصلې جز شمېرل کېږي یعنې:



$[a \cdot b),(a \cdot b]$

$a \le x < b \qquad a < x \le b$

$A = \{x / x \in IR, a \le x < b\}$

$a < x \le b$

3- تړلې فاصله: کله چې a او b دواړه هر یو د فاصلې جز وشمېرل شي، په دې حالت کې یاده فاصله تړلې ده.

$[a,b] \qquad a \le x \le b$

$A = \{x / x \in R , a \le x \le b\}$



(c) ketabton.com: The Digital Library

د تابع د تعریف ناحیه

په یوه فاصله کې د متغیرو مقادیرو مجموعه د تعریف ناحیه نومېږي. د تعریف په ناحیه کې که د مستقل متحول په هر قیمت یواځې یو قیمت د مربوط متحول لپاره په لاس راشي . دا چې رابطه د تابع ده البته د یو مقدار برعکسو تابع. د دې په څېر که د تعریف په ساحه کې د مستقل متحول په هر قیمت مربوطه متحول له یو نه زیات قېمت واخلي، په دې حالت کې ذکر شوې رابطه تابع راپېژني.

مثلاً:

$1) y = \pm\sqrt{x}$

د تعریف ناحیه $D \to [0,\infty], 0 \le x < \infty$

د پورتنۍ رابطې د تعریف د ناحیې سیټ $D = \{x / x \in R, 0 \le x < \infty\}$

$2) y = x^2$

د تعریف ناحیه $D \to (-\infty,\infty), -\infty < x < \infty$

$3) \sqrt{x-4}$

د تعریف ناحیه $D \to 4 \le x < \infty, [4,\infty]$

د توابع ګراف

څرنګه چې ګرافونه پر ریاضي سربېره په فزیک، کیمیا، بیولوژي او نورو طبعي او ټولنیزو علومو، لکه احصایه اقتصاد او نورو کې پکاربېږي، د هغو په واسطه ډېر موضوعات واضح بیانېږي.

همدارنګه تابع ډېر کله د خپل مربوطه ګراف په واسطه بیانېږي، نو د ډېر اهمیت وړ ده او پکار ده، چې د ګرافونو د رسمولو په حالت کې دقت او پاملرنه وشي او د توابعو د ګرافونو د ترسیم قوانین او اصول وپېژنو.

دا چې مختلف الجبري توابع د متفاوتو ګرافونو لرونکي دي، بناً د ګراف د لاربشود لپاره ځینې له توابعو څخه رسموو.

د توابعو د ګراف هندسي شودنه

په تحلیلي هندسه کې هر جفت مرتب د حقیقي اعدادو (x,y) په یوه نقطه یو بل ته مخامخ واقع کېږي، داسې چې د x او y عددونه نسبت د مختصاتو یو سیستم ته Cartesian

(c) ketabton.com: The Digital Library

د ذکر شوي نقطې مختصات دي.
اوس د هر تابع لپاره

$$f : D \to R$$
$$x \to f(x)$$

کولای شو مرتبې جوړې $(x, f(x))$ په نظر کې ونیسو، دا مرتبې جوړې هغه نقطې په لاس راکوي، چې د x او F(x) مختصاتو لرونکې وي.

تعریف: د هر تابع لپاره

$$f : D \to R$$
$$x \to f(x)$$

د ټولو هغو نقطو مجموعه، چې د $(x, f(x))$ مختصاتو لرونکې ده د f د تابع د ګراف هندسي ښودنه نومېږي.



څرنګه چې پورتنۍ تابع اوله درجه ده، نو د هغې ګراف پر مستقیم خط دی.
له دا ډول توابع $x \to x^m$ یا $y = f(x) = x^m$

(c) ketabton.com: The Digital Library

په پورته تابع کې m یو ناطق عدد دی، چې په دوو حالتونو کې مطالعه کېږي.
لومړی حالت m په تامو اعدادو کې شامل دی $m \in z$
دویم حالت m په نسبتي اعدادو کې شامل دی $m \in Q$
په لومړي حالت کې $y = x^m$ په څلورو فرعي حالتونو کې مطالعه کېږي.

مثبت تاق $m \to$ (C) مثبت جفت $m \to (a)$

منفي تاق $m \to$ (d) منفي جفت $m \to (b)$

دویم حالت

کسري m په P/q شکل (په داسې حال کې، چې P او q تام اعداد دي).
په پورته توګه لاندې فرعي حالتونه په نظر کې نیول کېږي.

$$a - m = \frac{P}{q} > 1$$

$$b - m = \frac{P}{q} < 1$$

$$c - 1 < m = \frac{P}{q} < 0$$

$$d - m = \frac{P}{q} < -1$$

د خصوصیاتو لنډه پېژندنه او توابعیه د دې کتاب په درسونو کې کارول کېږي.

۱- مشرح تابع او ضمني تابع: هر کله چې د تابع او مستقل متغیر تر منځ رابطه شتون ولري، چې وکولای شو تابع له هغې استخراج کړو؛ یعنې که په یاده رابطه کې تابع وتوانېږي د دې $y = f(x)$ په خبر و لیکل شي دا رابطه مشرح تابع بلل کېږي.

مثلاً $y + 2 = 3x^2$ یا $xy = x^2 - 1$ او نور ...

او که په یوه رابطه کې له متحولینو څخه د هیڅ یوه لپاره مستقل حل پیدا نه شي، دا رنګه رابطه ضمني تابع نومېږي مثلاً:

$$x + x^2y^2 + y = 0 \qquad y + x^2 + x^2y^2 = 0$$

مشرح تابع کېدای شي ناطق یا آهم وي.

$$y^2 - x = 0$$

ناطق تابع هغه دی، چې د یوه یا دوه پولینومونو له نسبت څخه لاسته راغلی وي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

لکه:

$y=\frac{3x^2+1}{2x+3}$ $y=3x^2+2x+1$

$y=\pi r^2$

آهم تابع هغه دی، چې په هغې کې یو یا څو تر جذر لاندې واقع شوي وي.

لکه:

$y=\sqrt{\frac{2x^2+5}{5x^3+x}}$ و غیره $y=2x^2+\sqrt{3x}+4$

متمادي او غیر متمادي تابع

که د $y=f(x)$ تابع یو پولینوم وي او x وکولای شي له $-\infty$ څخه تر $+\infty$ قیمتونه واخلي، داسې چې د X په ټولو قیمتونو د تابع لپاره قیمت وټاکل شي متمادي تابع ده

مثلاً:

$y=x^3-3$

$y=3x+5$

د دې برعکس که تابع ونه شي کړای د تعریف په حوزه کې د x د متحول د ځینو قیمتونو لپاره قیمت واخلي دا رنګه تابع، چې پکې قیمتونه نا ټاکلي دي متمادي نه دی.

مثلاً:

$y=\frac{x^2+3x}{x-2}$

په نومورې تابع کې لیدل کېږي، چې د $x=2$ په قیمت د تابع قیمت غیر معین دي بناً د $x=2$ په قیمت کې تابع غیر متمادي دی او یا په $y=\sqrt{3-x}$ کې $x>3$ په قیمتونو د تابع قیمت د حقیقي اعدادو په سیټ کې غیر معین دی، بناًء د $x>3$ په قیمتونو د تابع ګراف غیر متمادي دی.

متزایده تابع او متناقصه تابع

که مستقل متحول او تابع یو اړخ ته یونواخت تحول ولري متزایده تابع ورته ویل کېږي. یا په بل عبارت که تابع په یوه ټاکلې فاصله کې د سعودي یو نواخت تغیراتو لرونکې وي، داسې چې په قیمتونو دوه مقداره x_1 او x_2 ولرو $x_1<x_2$ $f(x_1)<f(x_2)$

(c) ketabton.com: The Digital Library



تابع یو نواخته نزولي ده (متناقص) په هغه حالت کې، چې $x_1 < x_2$ په قیمتونو دا $f(x_1) > f(x_2)$ قیمتونه شي.

د زوج تابع (موازي) او د فرد تابع (متناوب)

که د $y = f(x)$ تابع کې د x عدد قیمت x- ته واړوو او د y عدد په قیمت کې کوم تغیر رانه شي دارنګه تابع (جفت) موازي تابع نومېږي.

د دې برعکس که x په x- بدلوو او د y عدد قیمت y- ته واړوو، تابع ته (طاق) تابع ویل کېږي.

کثیر الحده تابع

دا تابع داسې $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n$ ده. په دې تابع کې $a_0, a_1, a_2 . a_n$ ثابت مقادیر، n کثیر الحده درجه او x د تابع مستقل متحول دی، له دې تابع څخه نورې توابع هم مشتق کېږي، یعنې په $n = 0$ ثابت تابع $n = 1$ خطي تابع $n = 2$ دویمه درجه تابع $n = 3$ درېیمه درجه تابع

(c) ketabton.com: The Digital Library

ثابته تابع

هغه تابع چې د تغیراتو حدود یې په یو حد کې شامل شوي وي. په دې ډول توابعو کې د تابع مقدار له متغیر سره تړاو نه لري لکه: $y = a$

توان لرونکي تابع

په دارنګه توابعو کې مستقل متغیر د توان یا طاقت په توګه ځای نیسي، چې د $f(x) = a^x$ په څېر ښودل کېږي، البته $a \neq 0,1$ دی، دا هغه وخت دقیقاً متزایده ده، چې کله a>0 وي او هغه وخت دقیقاً متناقصه ده، کله چې a<0 وي.

لوګارتمي تابع

دا تابع په $y = F(x) = Log_a x$ بڼه وي، چې په هغې کې $a \neq 1,0$ وي او x>0 دی.

که دا رانګه $a = e = 2.7.828$ وي په دې حالت کې به په طبیعي قاعده کې وي، چې هغه پایه پنرین نومبړي او په لاندې ډول لیکل کېږي.

$$y = f(x) = Lnx, e = \sum_{K=0}^{\infty} \frac{1}{K!}$$

که $a = e = 2.7.828$ وي، په دې حالت کې به لوګارتم په طبیعي قاعده کې وي، چې هغه نپیرین قاعده نومبړي او په لاندې ډول لیکل کېږي.

$$y = f(x) = Log_e x \qquad e = \sum_{K=0}^{\infty} \frac{1}{K!}$$

$$y = f(x) = Lnx$$

معکوسه تابع

د $y = f(x)$ تابع په نظر کې نیسو، چې په هغې کې x مستقل متغیر او y د هغه تابع ده. څرنګه چې لیدل کېږي y د x په حساب بیان شوی دی، اوس که داسې رابطه ولیکو، چې په هغې کې x تابع او y مستقل متغیر وي، یا په بل عبارت پورته رابطه د y په حساب بیان کړو؛ په دې حالت کې هغې ته معکوسه تابع ویل کېږي، چې په هغې کې به x د y تابع وي او کولای شو هغه په لاندې ډول وښایو

$$x = f(x), x = f^{-1}(x)$$

تعریف: د f د تابع پر وړاندې، چې په f^{-1} شکل ښودل کېږي د(y,x) جفتو له مجموعي

(c) ketabton.com: The Digital Library

څخه عبارت دی، داسې چې د (x,y) جفتونه په f کې قرار لري. f^{-1} یو په یو دی، کله چې F یو په یو وي.

ټولې توابع چې د یوې ټاکلې فاصلې پر مخ وي او د مستقل متحول او تابع ترمنځ یو په یو رابطه ټینګه وي یا دقیقاً نزولي یا صعودي وي او د معکوس لرونکې دي.

$f : D \to R, f$ تابع

$x \to f(x)$

یوه یو په یو تابع ده په داسې حال کې، چې د x په مختلفو قیمتونو پورې مربوط وي یعنې کله چې x_0, x_1, x_2 د D مجموعې مربوط وي او $x_0 \neq x_1 \neq x_2$ وي د $f(x) \neq f(x) \neq f(x)$ تر منځ دی.

تعریف: هر کله چې د f تابع یو په یو وي، په دې حالت کې:

$f : D \to R$

$x \to f(x)$

$f^{-1} = R \to D$

$x \to f^{-1}(x)$

$x = f(y)$

په لنډه توګه ویلی شو، چې دوه تابع ګانې یو له بلې څخه راګرځېدلې وي، معکوسې توابع ورته وایي، لکه:

$y = Log_a x \to x = a^y$

$y = \sin x \to x = \arcsin y$

$y = \cos x \to x = \arccos x$

مثال: معکوسه تابع

$f^{-1} R \to D$ $\qquad$ $f : D \to$

$x \to f^{-1}$ $\qquad$ $x \to -2x + 1$

$x = -\frac{y-1}{2}$ $\qquad$ $y = -2x + 1$

$f(y) = -\frac{y-1}{2}$ $\qquad$ $x = -\frac{y-1}{2}$

د معکوسې تابع ګراف

لومړی د f د تابع ګراف رسموو د f د هندسي شوونې د انعکاس له امله y=x عینیت ته په کتو هندسي شوونه تر f^{-1} پورې په لاس راځي.

(c) ketabton.com: The Digital Library



$y = -2x + 1$

x	0	$1/2$
y	1	0

مثال : د g تابع په پام کې نیسو.

$g_+ : D_+ \to R$

دا تابع په داسې حال کې، چې د D_+ مجموعه ټول غیر منفي عددونه دي یو په یو تابع ده او g_+^{-1}

$g_+^{-1} : R_g \to D_+$

$x \to \sqrt{x}$

د طاقت لرونکې تابع ځانګړنې

که f_a یا $x \to a^x$ په پام کې ونیسو، په دې صورت کې:

$f_a : D \to R$

$x \to a^x$

<u>د لاندې خاصیتونو درلودنکې دي:</u>

۱- د D مجموعه د ټولو حقیقي عددونو له مجموعې څخه عبارت ده؛ خو د R مجموعه ټول مثبت حقیقي عددونه دي.

۲- د x_1, x_2 په ټولو حقیقي قیمتونو کې لاندې رابطه سمه ده. $f_a(x_1 + x_2) = f_a(x_1) f_a(x_2)$

۳- د f_a تابع په $a>1$ ټول دقیقاً متزایده ده او په $0 < a < 1$ ټول متناقصه ده.

(c) ketabton.com: The Digital Library

د توابعو هندسي جوړښت $y=2^x$ او $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ په لاندې ډول لیدل کېږي. شکل ته په کتو د $a=2>1$ او $a=\frac{1}{2}<1$ پر وړاندې د f_2 او $f_{1/2}$ ورکړل شوو توابعو د 2 او 3 د رابطې خواص کولای شو په شکل کې ووینو.

که پورته توابعو ته په دقت سره وګورو، وینو چې د مستقل متحول او تابع تر منځ یو په یو رابطه موجوده ده. بناً پورته توابع د معکوس درلودونکې دي، چې کولای شو په لاندې شکل کې یې رابطې وګورو.

نو ویلای شو، چې طاقت لرونکې تابع او لوګارتمي تابع یو د بل معکوسې او سرچپه دي.

د توابعو ترکیب

کله چې f او G دوه اختیاري توابع وي؛ په دې حالت کې $(Fog)_x$ نوي تابع د $(fog)_x = f(2(x))$ په وسیله تعریفوو.

fog د f او g ترکیب نومېږي، چې د fog د تعریف ناحیه له x څخه عبارت ده. په دې حالت کې، چې x د $g(x)$ د g تعریف په ناحیه کې د f د تعریف په ناحیه کې دی.

عموما $fog \neq gof$ دی.

مثال:

$$f(x)=x^2$$
$$g(x)=x+1$$
$$(fo2)_x = f(2(x)) = f(x+1) = (x+1)^2$$
$$(2of)_x = 2(f(x)) = 2(x^2) = x^2+1$$

نو لیدل کېږي چې:

$$(x+1)^2 \neq x^2+1$$

خو اتحادي ترکیب په توابعو کې موجود دی، چې په لاندې ډول ښودل کېږي.

$(fog)oh = fo(goh) =$

تاسې کولای شئ د هغو په لرلو سره تابع تطبیق او ارزیابي کړئ.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$f(x)=x^2$

$2(x)=x+1$

$h(x)=x-1$

$(fogoh)=f(2(h(x)))$

$f(2(h(x)))=f(2(x-1)=f(x-1+1)=x^2$

$fo(2oh)=f(2(h(x)))=x^2$

$(fo2)oh=f(2(h(x)))=x^2$

$f(x)=2x^2$

$2(x)=3x+2$

$h(x)=x+1$

$fogoh=f(2(h(x)))=f(2(3(x+1)+2)=2(3x+5)^2$

مثال: د $y=|x|$ تابع رسم کړئ!

$y=x$

$y=-x$

$x>0$

$x<0$

مثال: د $y=|x^2-2x|$ تابع رسم کړئ!

د دې تابع د ترسیم لپاره لومړی د $y=x^2-2x$ تابع رسموو او د تابع د ګراف هغه برخه، چې د x تر محور لاندې ده یا په بل عبارت د $y<0$ هغه قیمتونه دي، چې د هغوی متناظر د x په محور رسموو.

$-2\le x<-1 \xrightarrow{[x]=-2} y=-2+x$

$-1\le x<0 \xrightarrow{[x]=-1} y=-1+x$

$0\le x<1 \xrightarrow{[x]=-0} y=x$

$1\le x<2 \xrightarrow{[x]=1} y=1+x$

د دوه یا څو متغیرو تابع

د دې تابع کلي شکل په لاندې ډول ښودل کېږي. $z=f(x,y)$ او یا $Z=f(x_1,x_2,x_3...x_n)$ دا رابطې ښیي، چې z د دوه یا څو متحولونو تابعیت کوي. مثلاً $z=ax+by$ داسې تابع ده، چې د دوه متغیرو x او y پیروي کوي او $z=a_0+a_1x_1+a_2x_2+.....a_nx_n$ تابع داسې تابع ده، چې د څو مستقلو متغیرو تابعیت کوي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

د دوه یا څو توابعو د تعریف د ناحیې جمع، تفریق، ضرب او تقسیم

هرکله چې F او g دوه اختیاري توابع وي، په دې حالت کې نوې تابع ګانې لکه $f \pm g$ کولای شو د لاندې معادلې په وسیله تعریف کړو. $(f \pm g)_x = f(x) \pm 2(x)$ د $(f \pm g)_x$ د تعریف ناحیه د x له ټولو عددونو څخه متشکله ده، چې د هغې پر وړاندې $F(x) \pm 2(x)$ معنی ورکوي.

یعنې د ټولو $x \in R$ عددونو مجموعه، چې دF او g په هرو دوو ناحیو کې قرار لري.

هر کله چې د A او B دوه مجموعې اختیاري وي په دې حالت کې $A \wedge B$ د $x \in R$ مجموعې ته اشاره کوي، چې په A او B کې قرار لري؛ نو کولای شو ولیکو:

$$(f \pm g)_x = f(x) \pm 2(x) \to dom$$
$$= dom(f) \wedge dom(g)$$
$$(f \cdot g)_x = f(x) \cdot 2(x) \to dom = dom(f) \wedge dom(g)$$
$$\left(f \diagup g\right)_x = \frac{f(x)}{g(x)}, domain \frac{f(x)}{2(x)} = dom(f) \wedge dom(g)$$
$$2(x) \neq 0$$

هرکله چې g تابع او C اعداد وي د C.g نوې تابع د $(C(g)_x = C \cdot g(x)$ په وسیله ښیي.

د C.g د تعریف ناحیه فقط د g د تعریف ناحیه ده.

مثال: د F او g توابع په لاندې ډول تعریف کېږي.

$f(x) = x^2 + 1$ $\quad domf(-\infty, \infty)$

$g(x) = \sqrt{x}$ $\quad domg(0, \infty)$

$(f \pm g)_x = ?$ $\quad dom(f \pm g)_x = ?$

$(f \cdot g)_x = ?$ $\quad dom(f \cdot g)_x = ?$

$\left(\mathrm{f} \diagup \mathrm{g}\right)_{\mathrm{x}} = ?$ $\quad dom\left(f \diagup g\right) = ?$

$g(x) \neq 0$

حل:

$$(f \pm g)x = f(x) \pm g(x) = x^2 + \sqrt{x} + 1$$
$$dom(f \pm g)x = [0, \infty)$$
$$(F \cdot g)_x = \sqrt{x}(x2+1), dom(f \cdot g)x = [0, \infty]$$
$$\left(f \diagup g\right)_x = \frac{x^2+1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}(x^2+1)}{x}$$
$$dom\left(f \diagup g\right) = [0, \infty]$$
$$2(x) \neq 0$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د څو مثالونو د حل نمونه:

۱- تعین کړئ، چې لاندې تابع په کومه فاصله کې ټاکلې ده؟

$y=\sqrt{x-4}$

حل: د دې لپاره چې تابع ټاکلې وي باید حدونه یې د یو مثبت عدد تر جذر لاندې وي.

$$x-4\geq 0$$
$$x-4=0$$
$$x=4$$
$$4\leq x<\infty$$

۲- د $y=\sqrt{x^2-1}$ تابع د تعریف ناحیه تعین کړئ؟

حل: د دې لپاره چې د پورته تابع د تعریف ناحیه ټاکلې وي؛ باید حدونه یې تر مثبت جذر لاندې وي.

$$x^2-\geq 0\rightarrow x^2=1$$
$$x^2>1$$
$$x=\pm 1$$
$$x\geq 1$$
$$x\leq -1$$

۳- هغه نقطې، چې پکې تابع متصله وي په لاس راوړئ؟

$$y=\frac{2x}{x^2-3x+2}$$

حل: د مخرج جذر یې پیدا کوو.

$$x^2-3x+2=0$$
$$(x-2)(x-1)=0$$
$$x=2$$
$$x=1$$

پورته تابع په ټولو نقطو کې متصله ده.

$$A=\{x/\in R\ , x\neq 2, x\neq 1\}$$

منفصلې دي. $x=2$ او $x=1$ خو دوه نقطې

(c) ketabton.com: The Digital Library

الجبري معادلې

ټولیزه موخه

د معادلو او په اقتصادي او تخنیکي مسایلو کې له معادلو نه د ګټې اخیستنې په اړه معلومات

د زده کړې موخې: د دې څپرکي په پای کې به محصلین په لاندې موضوعاتو وپوهېږي:

- د معادلو د مفهوم درک کول، د مجهولاتو له پلوه د معادلو پېژندنه.
- د معادلاتو له خواص نه خبرېدنه او د اړتیا په ټولو ساحوکې د هغې کارونه
- د یوې مسألې د خصوصیت له نظره د یوې معادلې تشکیل او تړل.
- د عبارتې مسایلو حل او د معادلې له خواصو نه په ګټه اخیستو د مجهولاتو پیدا کول.
- له معادلاتو نه په ګټه اخیستنه د اقتصادي مسایلو حل.

الجبري معادلې

هغه الجبري مساوات، چې په یو یا څو مشخصو قیمتونو، حروف مساوي وي، معادله نومېږي. مثلاً دا $5x + 2 = 2x + 8$ مساوات یوه معادله ده، ځکه د $x = 2$ په قیمت دواړه خواوې مساوي دي.

په معادله کې مجهول: هغه دی، چې د قیمت پیداکول یې مطلوب وي.

د معادلې جذر: د مجهول هغه قیمت ته ویل کېږي، چې معادله صدق کړي.

د معادلې درجه: د معادلې د مجهول تر ټولو لوی توان د معادلې درجه ده.

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثلاً.

اوله درجه $5x-10=0$

دویمه درجه $3x^2-x+2=0$

دریمه درجه $2x^3-3x^2+6=0$

(n) درجه $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+a_{n-3}x^{n-3}+...+a_1+a_0=0$

دمجهولونو د شمېر له مخې د معادلو ډولونه: یوه معادله کېدای شي د یو، دوه، درې یا n مجهولونو لرونکې وي.

مثلاً:

یو مجهوله معادله $\rightarrow 2x+4=3x-6$

دوه مجهوله معادله $\rightarrow 8x-4y=6$

درې مجهوله معادله $\rightarrow 3x-2y+6z=8$

n مجهوله معادله $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+.....+a_nx_n$

د معادلو خاصیتونه

۱- که د یوې معادلې (شرطیه مساوات) دواړو خواوو ته عدد جمع یا تفریق شي په شرطیه مساوات کې کوم تغیر نه راځي.

۲- که د مساوات دواړه خواوې په خلاف د صفر عدد کې ضرب یا تقسیم شي مساوات په خپل حال پاتې کېږي.

۳- هر کله چې د مساوات دواړه خواوې په کلي توګه له یو طرف څخه بل طرف ته انتقال شي د هغې د حدونو علامې تغیر نه کوي.

٤- که د معادلې یو جز د مساوات له یو طرف نه بل طرف ته انتقال شي، د هغې جز علامه تغیر کوي.

$4x+1=3x+22$

$4x-3x=22-1\rightarrow x=20$

اوله درجه یو مجهوله معادله

د اوله درجه معادلې کلي شکل $ax=b$ دی، b ثابت عدد او x مجهول دی او $x=\frac{b}{a}$ د ذکر شوې معادلې جذر دی.

که په اوله درجه یو مجهوله معادله کې د معادلې دواړو خواو ته څو جزه مشابه او ثابت عددونه وجود ولري؛ کولای شو مجهول عددونه د مساوات یوې خواته او معلوم اعداد د مساوات بلې خواته انتقال کړو، د ارجاع نه وروسته په $ax=b$ شکل راځي او وروسته

(c) ketabton.com: The Digital Library

مجهول پيدا کېږي.

اوله درجه يو مجهوله معادلې په لاندې شکلونو راتلای شي، چې هر يو تر مطالعي لاندې نيسو.

۱- پولينومي معادلې (کسري، غير کسري، حرفي)

۲ - اوله درجه يو مجهوله جذري معادلې

اوله درجه يو مجهوله پولينومي معادلې

$$6x+3=11+2x$$

$$6x-2x+11-3=0 \Rightarrow x=\frac{8}{4} \Rightarrow x=2$$

امتحان: په معادله کې د $x=2$ په اېښودلو بايد د مساوات دواړه طرفونه برابر شي.

$$6(2)+3=(11)+2(2) \Rightarrow 12+3=11+14$$

$$15=15$$

يو مجهوله کسري معادلې

$$\frac{4x-3}{2x}=\frac{1}{2}$$

$$2x\frac{(4x-3)}{2x}=\frac{1}{2}(2x) \Rightarrow 4x-3=$$

$$4x-x=3 \Rightarrow x=1$$

$$\frac{2}{x-1}+\frac{4}{x-1}=\frac{3}{x+1}$$

$$\frac{2+4}{x-1}=\frac{3}{x+1} \Rightarrow \frac{6}{x-1}=\frac{3}{x+1}$$

$$3(x-1)=6(x+1) \Rightarrow 3x-3=6x+6$$

$$6x-3x=-3-9$$

$$3x=-9 \Rightarrow x=-3$$

اوله درجه يو مجهوله حرفي معادلې

$$2(m-1)(x+1)=(m+2)(x-1)$$

$$(2m-2)(x+1)=(m+2))x-1)$$

$$2mx+2m-2x-2=mx-m+2x-2$$

$$2mx-mx-2x-2x=-m-2m$$

$$mx-4x=-3m$$

$$x(m-4)=-3m \Rightarrow x=\frac{-3m}{m-4}$$

$$m \neq 4$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د dx معادله $cx-\frac{4}{C}=d$ د x لپاره يې حل

$$\frac{c^2x-4}{c}=d-dx$$
$$c^2x-4=cd-dx\Rightarrow c^2x+cdx=cd+4$$
$$x=\frac{cd+4}{c^2+cd}$$
$$c^2+cd\neq 0$$
$$c\neq 0$$
$$c\neq -d$$

مناقشه وکړئ؟

د $c\neq 0, c=-d$ په استثنا د c او d ټولو قیمتونو ته پاسنۍ معادله قیمت لري، ځکه په دغو قیمتونو باندې ټاکلی حل نه لري.

لاندې پولینومي معادلې حل کړئ!

1) $2x-2=3x+6$

2) $2(5x-4)=x+13$

3) $2x(2+x)+3=x(2x+1)$

4) $-10x+3=6x+7$

5) $(x=20(x+1)=(x-2)(8x-4)$

6) $16x-5(2x-3)=23+7(6x+4)$

7) $3{,}5-0{,}5(3x-2{,}20=2{,}5x-0{,}2(5x-8)$

8) $\frac{3x+4}{2}-x=5$

9) $\frac{x(x+2)}{2(2+x)}=\frac{x}{2}$

10) $5+\frac{3x}{x-3}=\frac{9}{x-3}$

11) $\frac{9}{x+2}-\frac{8}{x}=\frac{7}{x}$

12) $\frac{x+5}{x-2}=\frac{x+3}{x+1}$

13) $\frac{2x}{5}-3=x+\frac{1}{3}$

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$14)\frac{5x-3}{4}-\frac{2x+1}{3}=\frac{4x+5}{6}-2$$

$$15)3mx-5b=2x+6, x=?$$

$$16)6abx+4ab=2ax+3ab, x=?$$

$$17-\frac{5x-3}{5}-\frac{4x-1}{2}=\frac{1-3x}{3}+2$$

$$18)\frac{m+w\sqrt{v}}{2g}=k, V=?$$

$$19)P=2I+2W, W=?$$

$$20)S=\frac{a}{I-r}, r=?$$

$$21)F=q\cdot\frac{m_2m_2}{d^2}, d=?$$

$$22)V=\frac{1}{3}\pi r^2h, h=?$$

اوله درجه یو مجهوله جذري معادلې

د هغې معادلو د حل لپاره، چې مجهول يې تر جذر لاندې وي.

اول هغه افاده، چې تر جذر لاندې قرار لري د مساوات یو طرف ته انتقالوو وروسته د معادلې دواړه خواوې د جذري درجې په توان پورته کوو په هغه صورت کې، چې بیا هم افاده جذري پاتې شوه همدا عملیه تکرارو، چې په ټولیزه توګه يې جذر له منځه لاړ شي.

$$1)2\cdot\sqrt[3]{3x-1}=4$$

$$\sqrt[3]{3x-1}=\frac{4}{2}=2\Rightarrow\left(\sqrt{3x-1}\right)^3=(2)^3$$

$$3x-1=8\Rightarrow 3x=9\Rightarrow x=3$$

$$2)\sqrt{x+14}-\sqrt{3x-10}=0$$

$$\sqrt{x+14}-\sqrt{3x-10}\Rightarrow\sqrt{(x+14)^2}=\sqrt{(3x-10)^2}$$

$$x+14=3x-10$$

$$2x=24\Rightarrow x=12$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

$2x = 24 \Rightarrow x = 12$

$3)\sqrt{5+x^2} - x = 1$

$(\sqrt{5+x^2})^2 = (x+1)^2$

$5 + x^2 = x^2 + 2x + 1$

$2x = 4 \Rightarrow x = 2$

$4)\sqrt{\sqrt{x^2-1}} = \sqrt{x-1} \Rightarrow (\sqrt{\sqrt{x^2-1}})^2 = \left(\sqrt{x-1}\right)^2$

$\sqrt{x^2-1} = x-1$

$x^2 - 1 = x^2 - 2x + 1$

$2x = 2$

$x = 1$

لاندې جذري معادلې حل کړئ؟

$1)\sqrt[3]{2x+7} = 2$

$2)\sqrt{x^2+2x} - 2 = x$

$3)\sqrt{\frac{2x+1}{x}} - \sqrt{\frac{2x1}{x+3}} = 0$

$4)\sqrt{2+\sqrt{x^2-5}} = \sqrt{x+1}$

$5)\sqrt{x-1} - 6 = -3$

$6)\sqrt[2^3]{\sqrt{x-2}} = 4$

$7)\sqrt{4x^2-16} = 2x-2$

$8)(2x-1)^{\frac{4}{3}} = 4x-2$

$9)x + \sqrt{x^2-9} = 21$

$10)\sqrt{x^2+3} = 9+x$

$11)\sqrt{x^2+5} + 1 = x$

$12)\sqrt{x+3} - \sqrt{x-1} = 1$

$13)\sqrt{x-4} + 2 = \sqrt{x+2}$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د اولې درجې یو مجهوله معادلو د مسایلو عبارتي حل

د معادلو د تشکیل طریقې: معادلې د ریاضیاتو یو مهم قسمت تشکیلوي او زیات مسائل د هغې په واسطه حل کېږي. کولای شو د دې لپاره، چې د مسائلو په حل کې له معادلو څخه سمه ګټه واخلو؛ لازمه ده، چې د پوښتنو د شرایطو مطابق الجبري جملې تشکیل کړو او وروسته د معادلې شکل ته راوړل شي. د موضوع د توضیح لپاره لاندې مثالونه په نظر کې نیسو.

مثال: د دووعددونو مجموعه 37 او تر منځ فرق یې 5 دی اعداد پیدا کړئ!

حل: د سوال د متن مطابق

کوچنی عدد $\rightarrow x$

لوی عدد $\rightarrow x+5$

د دوو عددونو مجموعه $x+x+5=37$

$$2x+5=37$$
$$2x=37-5\rightarrow 2x=32$$
$$x=16$$

مثال: د دوو عددونو د جمع حاصل 19 دی که د لوی عدد له دوه چنده څخه کوچنی عدد تفریق شي 17باقي کېږي، تاسې اعداد معلوم کړئ!

حل: نظر د سوال متن ته

کوچنی عدد $\rightarrow x$

لوی عدد $\rightarrow 19-x$

د معادلې تشکیل

$$2x-(19-x)=17$$
$$2x-19+x=17$$
$$3x=17+19$$
$$3x=36\rightarrow x=12$$
$$19-12=7$$

مثال: کوم عددونه د $\frac{3}{11}$ کسر له صورت او مخرج سره جمع کړو، چې $\frac{2}{3}$ کسر لاس ته راشي.

د سوال مطابق

$$\frac{3+x}{11+x}=\frac{2}{3}\rightarrow 22+2x=9+3x$$
$$3x-2x=22-9\rightarrow x=13$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال: یو شخص 1000 افغانۍ په ګټه کې واچولې، داسې چې د هغې یوه برخه په 3% نرخ او د هغې بله برخه په 5% نرخ تعین شوې؛ هر کله چې د هغې مجموعې ربح 46 افغانۍ شي، د سرمایې د هرې برخې د ګټې مقدار، چې مرابحې ته اچول شوی، معلوم کړئ!

حل: د سوال د متن مطابق

اوله سرمایه x

د هغې ربح $\frac{3}{100}x$

د دویمې سرمایې ربح + د اولې سرمایې ربح = 46

دویمه سرمایه $1000-x$

ربح $\frac{5}{100}(1000-x)$

$$\frac{3x}{100}+\frac{5000-5x}{100}=46$$
$$3x-5x=4600-5000$$
$$-2x=-400\rightarrow x=200$$
$$1000-200=800$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

تمرين

لاندې سوالونه حل کړئ!:

۱- د 54 عدد داسې په دوه حصو تقسیم کړئ، چې د لوی عدد څلور چنده د کوچني عدد له پینځه چندو سره مساوي شي؟

۲- د یو کیلو ګرام چایو قیمت 36 افغانۍ د یو کیلوګرام بورې له قیمت څخه زیات دی که د 10Kg چای او 12Kg بورې مجموعي قیمت 1284 افغانۍ وي، د ۍ کیلو ګرام چای او بورې قیمت معلوم کړئ؟

۳- که د پلار عمر 43 کاله وي او د زوی عمر 23 کاله وي، معلوم کړئ، چې وروسته له څو کالو د پلار عمر د زوی دو چنده کېږي؟

٤ – د فردوس درمل 400gr د سلفوریک اسید محلول او اوبه لري، چې25% د اسیدو لرونکي دي، کوم مقدار اوبو ته بړاس ورکړي، چې 50% سلفوریک اسید محلول لاسته راوړي؟

٥- څومره اوبه له هغه 300gr ګرامه محلول څخه، چې په سلو کې 2 مالګه بړاس ولري، چې داسې یو محلول ورڅخه ترلاسه شي، چې په سلو کې 3 مالګه ولري؟

٦- د دوو عددونو تر منځ فرق 12 دی او حاصل جمع یې 49 ده اعداد معلوم کړئ؟

۷- 721 افغانۍ د درې تنو تر منځ داسې ووېشئ، چې لومړي ته د دوهیم په پرتله دوه برابره او دویم ته د درېیم تن دوه برابره ورسېږي؟

اوله درجه دوه مجهوله معادلې

هغه معادلې، چې د دوو مجهولونو لرونکې وي او د مجهولونو درجه یې یو وي د اوله درجه دوه مجهوله معادلو په نوم یادېږي. یوه اوله درجه دوه مجهوله معادله بې نهایت حلونه لري

مثلاً: $x+2y=8$

$x=0$	$x=1$	$x=-1$	$x=2$	$x=4$
$y=4$	$y=\frac{7}{2}$	$y=4,5$	$y=6$	$y=2$

د اوله درجه دوه مجهوله معادلو عمومي شکل $ax+by+c=0$ دی، چې په هغې کې a,b,c د همزمانه یواځیني حل لپاره په اوله درجه دوه مجهوله معادلو کې د معادلو سیستم ته اړتیا ده، یانې دوه مجهوله په دوو معادلو کې، درې مجهوله په درېو معادلو کې او n مجهوله په n معادلو کې.

(c) ketabton.com: The Digital Library

د اولې درجې دوه مجهوله معادلو سیستم

د هغې کلي شکل

$$a_1x + b_1y = C_1$$
$$a_2x + a_2y = C_2$$

د اولې درجې دوه مجهوله معادلو حل: د دې سیستم حل په رنګارنګ شکلونو ممکن دی، چې په څو مثالونو کې یې توضیح کوو.

مثال:

$$\left.\begin{matrix}4x+2y=8\\5x-y=3\end{matrix}\right\} \rightarrow \begin{cases}4x+2=8\\5x-y=3\end{cases}$$

$$20x+10=40.....I$$
$$\pm 20x \mp 4y = \pm 12.....II$$
$$14y = 28$$
$$y = 2$$

د I معادله له II څخه منفي کوو

د Y قیمت له پورته معادلو څخه په یوې کې وضع کوو د x قیمت حاصلېږي.

$$4x+2(2)=8$$
$$4x+4=8$$
$$4x=4$$
$$x=1$$

د پورته سیستم د حل سیټ $A=\{1,2\}$

د تعویض په طریقه د اولې درجې دوه مجهوله معادلو حل

په دې حالت کې یو مجهول له یوې معادلې څخه په لاس راوړو، په بله معادله کې یې وضع کوو، د بل مجهول حل ته رسېږو.

مثال:

$$4x+3y=6.....I$$
$$5x+4y=7.....II$$

I	II
$4x+3y=6$	$4(\frac{6-3y}{4})+4y=7$
$4x=6-3y$	$30-15y+16y=28$
$x=\frac{6-3y}{4}.....III$	$y=28-30=-2$
	$y=-2$

(c) ketabton.com: The Digital Library

دا قیمت له I , II , III څخه په یوې معادله کې ږدو د x قیمت راکوي.

$$x=\frac{6-3(-2)}{4}=\frac{12}{4}=3$$

$$x=3$$

$$B=\{3,-2\}$$

۳- **د مساوات په طریقه حل:** په دې حالت مجهول په دواړو معادلو کې په نظر کې نیسو.

مثال:

$$3x-2y=1.....I$$

$$2x-y=4.....II$$

$$3x=2y+1(I)$$

$$x=\frac{2y+1}{3}$$

$$2x=y+4(II)$$

$$x=\frac{y+4}{2}$$

$$x=x$$

$$\frac{2y+1}{3}=\frac{y+4}{2}$$

$$2(2y+1)=3(y+4)$$

$$4y+2=3y+12$$

له پورته معادلو څخه په یوه کې د دې قیمت په ایښودو x پیدا کوو.

$$y=10$$

$$x=\frac{2(10)+1}{3}=\frac{21}{3}=7$$

$$x=7$$

$$C=\{7,10\}$$

د اولې درجې دوه مجهوله معادلو حل

که اوله درجه دوه مجهوله معادله د y لپاره حل کړو؛ یعنې $y=f(x), y=ax+b$ فرض کړو واضح ده، چې د x د متحول په هر قیمت سره د y د متحول قیمت سره یوشی کېږي، په دې حالت کې د (y،x) مرتبې جوړې د حقیقي اعدادو څخه لاسته راځي، که دغه مرتبې جوړې د وضعیه کمیاتو قایم ته انتقال کړو؛ نو هره مرتبه جوړه یو ټکی په ګوته کوي، د دغو ټکو د نښلولو څخه د تابع ګراف جوړېږي. دا چې پورتنۍ تابع لومړۍ درجه اوله تابع ده؛ نو ګراف یې یوه کرښه ده، نومورې تابع ته خطي تابع ویل کېږي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال: د $2y+4x=2$ ګراف داسې رسم کړئ، چې $y=f(x)$ دی.

حل: څرنګه چې پورته اوله درجه تابع ده؛ نو د هغې ګراف مستقیم خط دی، چې کېدای شي له دوه یا ډېرو نقطو څخه تشکیل شي.

x	$-1,1$
y	$3,-1$



x	$0,\ 1/2$
y	$1,0$

په محورونو باندې تقاطع

د $y=2x+1$ معادلې خطي ګراف رسم کړئ!

حل: له پورته معادلې سره سم عمل کوو.

x	$-1,1$
y	$1,3$



په محورونو باندې تقاطع

(c) ketabton.com: The Digital Library

x	$0, -\frac{1}{2}$
y	$1,0$



x	$-1,0,1$
y	$-2,0,2$

د لاندې تابع ګراف رسم کړئ!

تمرین

د لاندې توابعو ګراف رسم کړئ!

1) $2y + 4 = 8x$
2) $y = 2x - 2$
3) $3x + y = 12$
4) $x - y = 4y - \frac{2}{3}x$
5) $\frac{2}{3}y + 2x = \frac{1}{2}$
6) $4x - \frac{1}{2} = -y + 1$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د ګراف په واسطه د دوه مجهوله معادلو د سیستم حل

پوهېږو چې د اوله درجه دوه مجهوله معادلو سیستم له دوه معادلو څخه تشکیلېږي، یعني:

$$\begin{cases} a_1x + b_2y = c_2 \ldots\ldots\ldots I \\ a_2x + b_2y = c_2 \ldots\ldots\ldots II \end{cases}$$

نو هر یو مستقیم خط د وضعیه کمیاتو د مستوي د پاسه قایم تشکیلوي. په هغه حالت کې، چې دا دوه خطونه په خپلو کې یو بل قطع کړي د تقاطع نقطه یې یعني(x,y) د هغې همزمان حل دی.

مثال: د لاندې معادلو سیستم د ګراف په طریقه حل کړئ!

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x - y = -4 \end{cases}$$

حل: د یادو معادلو څخه د هرې یوې ګراف رسم کړئ!



ګرافونو ته په کتو د خطونو مشترکه نقطه (-3,-2) ده؛ یعنې د یاد سیستم $y = -2, x = -3$ همزمان حل دی.

د $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ خطونو سیستم ممکن منطبق یا موازي وي. د سیستم د موازي کېدو په حالت کې حل نه لري او د منطبق کېدو په حالت کې سیستم د لایتناهي لرونکی دی، ټاکلی حل نه لري.

د دې لپاره چې پوه شو خطونه متقاطع ، موازي که منطبق دي د سیستم د ضریبونو په منځ کې رابطې په لاندې ډول دي:

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$\frac{a1}{a2}=\frac{b1}{b2}\neq\frac{c1}{c2}$$

سيستم حل نه لري، خطونه موازي دي:

$$\frac{a1}{a2}=\frac{b1}{b2}=\frac{c1}{c2}$$

سيستم بې نهايت حل لري، خطونه منطبق دي:

$$\frac{a1}{a2}\neq\frac{b1}{b2}$$

د لومړۍ موضوع مثال:

$$\begin{cases}x-y=3.....I\\2x-2y=8....II\end{cases}$$



$$I.....\begin{array}{c|c}x & 0,3\\ \hline y & -3,0\end{array}$$

$$II.....\begin{array}{c|c}x & 0,4\\ \hline y & -4,0\end{array}$$

د دويمې موضوع مثال:

$$\begin{cases}2x-4y=6.....I\\x-2y=3.....II\end{cases}$$



$$I.....\begin{array}{c|c}x & 0,3\\ \hline y & -\frac{3}{2},0\end{array}$$

$$II.....\begin{array}{c|c}x & 0,4\\ \hline y & -\frac{3}{2},0\end{array}$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

سوالونه

د ضرایبو د جوړولو په طریقه د لاندې د وه مجهوله معادلو سیستم حل کړئ!

1) $\begin{cases} x+2y=2 \\ x-4y=1 \end{cases}$ $\begin{cases} 3a+b=a \\ 4b=22-5a \end{cases}$ $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$

$\begin{cases} 3x+4y=18 \\ 5x-y=7 \end{cases}$ $\begin{cases} 4x+3y=3 \\ 6x+15y=-2 \end{cases}$ $\begin{cases} 2x+y=3a+b \\ 3x-y=2a+4b \end{cases}$

په تعویضی طریقه یې حل کړئ :

$\begin{cases} y=2x \\ x+y=6 \end{cases}$ $\begin{cases} x+6y=2 \\ \frac{2}{3}x-4y=7 \end{cases}$ $\begin{cases} x=2-2y \\ 2x-3y=25 \end{cases}$

د مساوات په طریقه یې حل کړئ:

$\begin{cases} x-2y=5 \\ 5x=y-2 \end{cases}$ $\begin{cases} 4x-5y=17 \\ 2x+3y=3 \end{cases}$ $\begin{cases} 3a-2b=-19 \\ 2a+5b=0 \end{cases}$

لاندې عبارتي مسایل حل کړئ:

۱- د دوو عددونو د جمع حاصل 5 او د تفریق حاصل یې 3 دی، عددونه پیدا کړئ!

۲- دوه عددونه پیدا کړئ، چې د لوی عدد دوه چنده د کوچني عدد له درې چنده څخه د 10 په اندازه لوی او $\frac{1}{5}$ حصه د لوی عدد له $\frac{1}{3}$ حصه د کوچني عدد څخه د 20 په اندازه کوچنۍ وي ؟

۳- د دوو عددونو د مربعاتو د تفریق حاصل 56 او د تفریق حاصل یې 4 دی، عددونه پیدا کړئ!

۴- احمد دوه رقمه پسته لري؛ یو ډول پسته یو کیلو ګرام په 90 افغانۍ او دویم ډول یو کیلوګرام 60 افغانۍ قیمت لري. هغه غواړي 56 کیلو ګرامه مخلوط جوړکړي، د هر کیلو ګرام پستې څخه څو کیلو ګرامه په کار ده ؟

۵- کچر او خر هر یو څو کیلو ګرامه وزن انتقالوي. که چېرې د کچر بار 100 کیلو ګرامه د خره د بار له وزن نه زیات شي، د خره د بار دوه چنده د کچر بار کېږي او که د خره د بار وزن 100 کیلو ګرامه د کچر د بار له وزن څخه زیات شي، د کچر د بار وزن څوچنده د خره د بار د وزن کېږي ؟

۶- یو دهقان څو کورني چرګان او څو سویان لري. که چېرې چرګان او سویان50 سرونه او 140 پښې ولري ؟

(c) ketabton.com: The Digital Library

د اولې درجې درې مجهوله معادلو د حل سيستمونه

د اوله درجه درې مجهوله معادلو عمومي شکل:

$$a_1x+b_1t+c_1z=d_1$$
$$a_2x+b_2y+c_2z=d_2$$
$$a_3x+b_3y+c_3z=d_3$$

په پورته سيستم کې x,y,z مجهولات دي او a_1,a_2,a_3 ، b_1,b_2,b_3 او c_1,c_2,c_3 ثابتې معادلې دي. اوله درجه درې مجهوله معادلې د افنا د طريقې پواسطه د اوله درجه دوه مجهوله معادلو په ځير تعويضي حل کولای شو. په دې ځای کې غواړو څو مثالونه په افنا او تعويضي طريقه حل کړو.

مثال : دغه سيستم په تعويضي طريقه حلوو .

$$x+6y+3z=4.....I$$
$$2x+y+2z=3.....II$$
$$3x-2y+z=0.....III$$

حل: د x قيمت له I معادلې نه د y او z له جنس څخه په لاس راوړو .

$$x=-6y-3z+4.....IV$$

د x قيمت په II او III معادله کې ځای پر ځای کوو.

$$2(-6y-3z+4)+y+2z=3$$
$$-12y-6z+8+y2z=3$$
$$-11y-4z=-5.....V$$

د x قيمت په III معادله کې ځای پر ځای کوو.

$$3(-6y-3z+4)-2y+z=0$$
$$-20y-8z=-12.....IV$$

V او VI معادلې د y او z له جنس څخه د دوه مجهوله معادلو يو سيستم جوړوي.

$$-11y-4z=-5.....V$$
$$-20y-8z=-12.....VI$$

د پورته سيستم د حل لپاره د يو مجهول قيمت فرضاً z له V معادلې څخه په لاس راوړو او هغه په VI کې وضع کوو.

$$-11y-4z=-5\rightarrow -4z=-5+11y$$
$$z=\frac{-5+11y}{-4}=\frac{-11+5}{4}.....VI$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

اوس کولای شو ولیکو چې:

$$-20y-8\left(\frac{-11y+5}{4}\right)=-12\Rightarrow -20y+22y-10=-12$$

$$2y=-2$$

$$y=-1$$

د y قیمت په VIمعادله کې وضع کوو او د z قیمت پیدا کوو.

$$z=\frac{-11y+5}{4}=\frac{-11(-1)+5}{4}=\frac{11+5}{4}=\frac{16}{4}=4$$

که د y او z قیمتونه په IV معادله کې وضع کړو؛ د x قیمت پیدا کېږي.

$$x=-6y-3z=4.....IV$$

$$x=6-12+4=-2$$

$$x=-2$$

په نتیجه کې د پورته معادلو د حل سیستم عبارت دی له $x=-2, y=-1, z=4$.

د افنا په طریقه حل

د اوله درجه درې مجهوله معادلو د سیستم په حل کې له مجهولاتو څخه یو افنا کېږي. وروسته د اوله درجه دوه مجهوله معادلو د سیستم په څېر عمل کېږي او مجهولات پیدا کېږي.

سوالونه: لاندې سیستمونه په افنا او تعویضي طریقه حل کړئ .

1) $\begin{cases}2x-y+2z=-6\\x+2y-3z=9\\3x-y-4z=3\end{cases}$

2) $\begin{cases}2x-2y+4z=0\\-x+2y-3z=1\\2x-2y-z=-3\end{cases}$

3) $\begin{cases}x-2y+3z=10\\2x+3y+4z=-16\\3x-4y+5z=6\end{cases}$

4) $\begin{cases}2x-y+3z=5\\x+2y+z=-2\\3x+2y-2z=7\end{cases}$

5) $\begin{cases}x+2y-z=-3\\2x+3y+4z=-16\\3x-4y+5z=16\end{cases}$

6) $\begin{cases}y-3z=-7-2x\\4y-x=-7-z\\3x=4+2y+2z\end{cases}$

(c) ketabton.com: The Digital Library

دویمه درجه یو مجهوله معادلې

$a \neq 0, ax^2+bx+c=0$ د دې معادلو عمومي شکل دی، داسې چې a,b,c ثابت اعداد، x دویمه درجه مجهول او متحول دی.

خصوصي حالتونه

۱- که چېرې a=0 وي معادله $bx+c=0$ د اولې درجې شکل غوره کوي، البته د اولې درجې یو مجهوله معادلو په حل پوهېږئ.

۲- که b=0 وي معادله دا $ax^2+c=0$ شکل اختیاروي، چې په دې حالت کې معادله د دوه حقیقي مخالف الاشاره جذرونو لرونکې ده.

۱ مثال

$$4x^2-100=0 \rightarrow 4x^2=100 \rightarrow x^2=\frac{100}{4}=25$$
$$x^2=25 \rightarrow x=\pm 5$$

۳- که چېرې c=0 وي معادله د $ax^2+bx=0$ شکل لري، چې په دې حالت کې معادله د دوه حقیقي جذرونو لرونکې ده، یو له هغو څخه صفر اوبل یې $x_2=-\frac{b}{a}$ دی.

مثال

$$2x^2+5x=0 \rightarrow x(2x+5)=0$$
$$x=0$$
$$2x+5=0 \rightarrow 2x=-5$$
$$x=\frac{-5}{2}$$

د دویمې درجې یو مجهوله معادلو حل

۱- د تجزیې په طریقه حل

د پولینومونو له تجزیې نه په استفادې، چې له هغې سره بلد یاست، هرکله چې یوه دویمه درجه یو مجهوله معادله د تجزیې قابل وي؛ کول‌ای شو د هغې جذرونه پیدا کړو.

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثالونه

$x^2-3x+2=0$
$x-1=0$
$x=1$
$x-2=0$
$x=2$

$\sqrt{x^2-5x}=6$
$x^2-5x=36$
$x^2-5x-36=0$
$(x-9)(x+4)=0$
$x-9=0$
$x=9$
$x+4=0$
$x=-4$

لاندې معادلې د تجزيې په طريقه حل کړئ؟

$1-3x^2-10x=0$
$3-x^2-16=0$
$5-x^2-x-56=0$

$2-x^2-\frac{3}{4}x+\frac{1}{8}=0$
$4-2(x^2+20)=21x$
$6-26=31x+5x^2$

له تکميل مربع نه په ګټه اخيستو تجزيه حل کړئ؟

$1-3x^2-8x=0$
$3-2x(x+10=15+x$
$5-4x+1+3x=0$

$2-x^2+\frac{3}{4}x-\frac{1}{8}=0$
$4-18+5x^2+33x$
$6-2x^2+3x-1=0$

د محمد بن موسي خوارزمي د فورمول په طريقه حل

پوهېږو، چې د دريمه درجه يو مجهوله معادلو عمومي شکل $ax^2+bx+c=0$ دی، البته $a\neq 0$ وي له تکميل مر بع نه په ګټه اخيستو:

$x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$
$x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{c}{a}-\left(\frac{b}{2a}\right)^2=0$
$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\left(b^2-4ac\right)=0$
$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$

$x+\frac{b}{2a}=\pm\sqrt{\frac{b^2-4ac}{2a}}$
$x=\frac{-b}{2a}\pm\sqrt{\frac{b^2-4ac}{2a}}$
$x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
$x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د عملیاتو د اسانتیا لپاره $\Delta = b^2 - 4a$ وضع کوو (Δ) ممیزه یا قایمه نومېږي، چې لاندې امکانات په کې شاملېږي.

۱- که $\Delta > 0$ وي معادله د دوو مختلفو حقیقي جذرونو لرونکې ده، یعنې:

$$x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}, x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

۲- هر کله چې $\Delta = 0$ وي معادله د یو مضاعف جذر لرونکې ده، یعنې:

$$x_1, x_2 = \frac{-b}{2a}$$

۳- که چېرې $\Delta < 0$ وي، معادله حقیقي جذر نه لري. په دې حالت کې معادله د دوه مختلط جذرونو لرونکې ده.

که چېرې $\Delta > 0$ او $a > 0$ وي، د $y = ax^2 + bx + c$ ترینوم ګراف د x محور په دوه نقطو کې قطع کوي.

د لاندې معادلو جذرونه د محمد بن موسی د فورمول پواسطه پیدا کړئ:

$1) x^2 + x - 6 = 0 \qquad a = 1, b = 1, c = -6$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4(-6).1 = 25$$

$$x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1+\sqrt{25}}{2(1)} = \frac{-1+5}{2} + \frac{4}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-11\sqrt{25}}{2\cdot 1} = \frac{-1-5}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

د حل سیټ $A = \{x_1 = 2, x_2 = -3\}$

$2) x^2 + 6x + 9 = 0 \qquad a = 1, b = 6, c = 9$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0$$

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 \pm 0}{2} = -3$$

$$x_1 = x_2 = -3$$

دوېمه درجه یو مجهوله جذري معادلې

د هغې معادلو د حل لپاره چې مجهول تر جذر لاندې واقع وي، اول هغه افاده، چې د جذر لاندې ده یو طرف ته انتقالوو، وروسته د معادلې دواړه خواوې د جذر د درجې په توان پورته وړو، چې په دې حالت کې جذر له منځه ځي او د معادلې ځواب په لاس راوړو. که اړتیا وي، کولی شو څو ځله د معادلې اطراف د جذر د درجې په توان پورته یوسو.

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال: د لاندې معادلو جذرونه په لاس راوړئ!

$$1-\sqrt{3x+10}=x+4$$
$$(\sqrt{3x+10})^2=(x+4)^2$$
$$3x+10=x^2+8x+16$$
$$x^2+5x+6=0$$
$$(x+2)(x+3)=0$$
$$x+2=0, x_1=-2$$
$$x+3=0, x_2=-3$$

$$2-\sqrt{x}\sqrt{2x-3}=3$$
$$(\sqrt{x}\sqrt{2x-3})^2=(3)^2$$
$$x(2x-3)=9$$
$$2x^2-3x=9$$
$$2x^2-3x=9$$
$$2x^2-3x-9=0$$
$$2x^2-6x+3x-9=0$$
$$2x(x-30+3(x-3)=0$$
$$(x-3)(2x+3)=0$$
$$x-3=0, x=3$$
$$2x+3=0, x=-\frac{2}{3}$$

نوټ: باید ووایو، چې په جذري معادلو کې حاصل شوي جذرونه حتماً امتحان کړو؛ ځکه په دې ډول معادلو کې په لاس راغلي ځینې جذرونه د قبول وړ نه دي.

لاندې عبارتي مسایل حل کړئ؟

۱ - د دوو عددونو د جمع حاصل 16 او د ضرب حاصل یې 63 دی، عددونه لاس ته راوړئ؟

۲ - د دوو طاقو مسلسلو عددونو د ضرب حاصل 323 دی، اعداد پیدا کړئ؟

۳ - د یو مثلث قاعده نظر ارتفاع ته 4cm زیاته ده معلومه کړئ، چې ارتفاع باید کومه اندازه وي؛ تر څو د مثلث مساحت 10.5Cm2 شي ؟

٤ - که د یوه عدد مربع پینځه چنده د هماغه عدد مساوي په 36 شي، اعداد پیدا کړئ؟

٥ - د یو قایم الزاویه مثلث یوه ضلع 7Cm اوبله نیمه قایمه ضلعه د 13 په اندازه له وتر نه کمه ده، د مثلث مساحت پیدا کړئ؟

٦ - د یو مستطیل طول نظر د هغې عرض ته 3m لوی دی، د مستطیل عرض داسې تعین کړئ، چې د هغې مساحت $40m^2$ شي ؟

۷ - په $2x^2-4x+1=0$ معادله کې x داسې تعین کړئ، چې:

a- معادله دوه حقیقي جذرونه ولري.

b- معادله یواځې یو حقیقي جذر ولري.

c- معادله هېڅ حقیقي جذر نه لري.

(c) ketabton.com: The Digital Library

۸ - احمد ۵ کاله له محمود نه لوی دی. د عمر حاصل ضرب يې 100 کېږي، د هر يوه عمر پيدا کړئ؟

۹ - د دوو عددونو مجموعه 7 او د مربعاتو مجموعه يې 25 ده، عددونه کوم دي ؟

درېيمه درجه معادلې

$a_3x^2 + a_2x^2 + a_1x + \infty = 0$ د درېيمه درجه معادلو عمومي شکل دی، چې a_3, a_2, a_1, a_0 ثابت حقيقي او x د معادلې مجهول دی. البته $a_3 \neq 0$

$a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$ $\quad a_3x^3 + a_2x^2 = 0 \quad a_1 = 0, a_0 = 0$

$a_3x^3 + a_2x^2 + a_0 = 0, a_1 = 0$ $\quad a_3x^3 + a_2x^2 = 0, a_1 = 0$

$a_3x^3 + a_1x + a_0 = 0, a_2 = 0$ $\quad a_3x^3 + a_1x + a_0 = 0 \rightarrow a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$

$a_3x^3 + a_0 = 0$

پورته معادلو ته مکعبي معادلې هم وايي.

څرنګه چې $a_3 \neq 0$ دی؛ نو کولای شو مکعبه معادله په a_3 تقسيم کړو، چې لاندې شکل اختياروي.

$$x^3 + \frac{a_2}{a_3}x_2 + \frac{a_1}{a_3}x + \frac{a_0}{a_3} = 0$$

د درېيمې درجې معادلو حل: له دويمه درجه معادلو څخه پوهېږو، چې د معادلې د جذرونو او ضريبونو ترمنځ رابطه شتون لري.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

په همدې ترتيب د درېيمه درجه معادلو د جذرونو او ضريبونو ترمنځ هم رابطه وجود لري.

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{a_2}{a_3}$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = \frac{a_2}{a_3}$$

څرنګه چې د معادلو تيوري حکم کوي هغه معادلې، چې تاق درجه لري، حد اقل د يوه حقيقي جذرلرونکې دي؛ نو درېيمه درجه معادلې حد اقل د يوه حقيقي جذرلرونکې دي،

(c) ketabton.com: The Digital Library

چې کولای شو د معادلې د جذرونو او ضریبونو ترمنځ رابطې څخه یې پیدا کړو. څرنګه چې پورته یادونه وشوه، کولی شو له $\frac{a_a}{a_3}$ حقیقي جذرونو له فکتورنو څخه درېیمه درجه معادلې پیدا کړو

مثال: د مکعبي معادلې $6x^3-29x^2+14x+24=0$ حقیقي جذر پیدا کړئ!

$$6x^3-29x^2+14x+24=0$$

حل: د 24 عدد فکتورونه عبارت دي له:

$$\pm1,\pm,2,\pm,3\pm,4\pm,8\pm,12\pm,24$$

د 6 فکتورونه عبارت دي له:

$$\pm,1,\pm,2\pm,3\pm,6$$

ممکنه نسبي جذرونه عبارت دي له:

$$\frac{1}{1},\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6},\frac{2}{1},\frac{2}{2},\frac{2}{3},\frac{2}{6},\frac{3}{1},\frac{3}{2},\frac{3}{3},\frac{3}{6},\frac{4}{1},\frac{4}{2},\frac{4}{3},\frac{4}{6},\frac{8}{1},\frac{8}{2},\frac{8}{3},\frac{8}{6},\frac{12}{1},\frac{12}{2},\frac{12}{3},\frac{12}{6}$$
$$,\frac{24}{1},\frac{12}{2},\frac{24}{3},\frac{24}{6}$$

دا شمېر عددونه زیات دي، سربېره پر دې اول تام عددونه امتحانوو، پس له امتحانه لیدل کېږي، چې 4 عدد یو د یادې معادلې له جذرونو څخه دی، چې لاندې لیدل کېږي.

6	−29	+14	+24	4
	24	−20	−24	
6	−5	−6	0	

له ترکیبي تقسیم څخه نتیجه اخلو، چې د پورته مکعبې معادلې دویم فکتور:

$6x^2-5x-6=0$ دی.

$$(2x-3)(3x+2)=0$$

$$x_1=\frac{3}{2},x_2=-\frac{2}{3}$$

د حالیه سیټ په منځ کې یاده مکعبه معادله:

حالیه سیټ $A=\left\{4,\frac{3}{2},-\frac{2}{3}\right\}$

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال: د $x^3 - x - 6 = 0$ معادلې حقیقي جذرونه

د 6 عدد فکتورونه عبارت دي له:

$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

وروسته له امتحانه لیدل کېږي، چې د یادې مکعبې معادلې حقیقي جذر2 دی.

6	0	−1	−6	2
	2	4	6	
1	2	3	0	

د $x^2 + 2x + 3$ پورته مکعبې معادلې دویم فکتور دی.

$$x_1, x_2 = \frac{-2 \pm \sqrt{4-12}}{2}$$

نو یاده مکعبه معادله د یوه حقیقي او دوه مختلطو جذرونو لرونکې ده.

درېمه درجه تابع

ښکاري، چې $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ درېیمه درجه تابع ده، چې a,b,c او d ثابت عددونه، x مستقل متحول او y تابع متحول دی. د هغو نیمګړې بڼې هم د $y = f(x)$ ډول بیانوي.

د درېیمې درجې تابع د ګراف رسمول

د درېیمې درجې تابع د ګراف د رسمولو لپاره له ټولو نه مخکې د تابع صفري نقطې پیدا کوو، ځکه صفري قیمتونه د ګراف د رسمولو لپاره اسانتیا پیدا کوي. وروسته له دې د جذر لاندې او د جذرونو نه د باندې مناسب قیمتونه ټاکو، چې د تابع قیمتونه له هغې څخه پیدا شي.

له (x,y) څخه جوړې شوې مرتبې جوړې د محورونو د پاسه انتقالوو، د تابع ګراف رسمېږي.

نوټ: له دې څخه د درېیمه درجه توابعو ګراف له ډېرو دقیقو مشتقاتو نه په ګټه اخیستنې رسمولای شو. د اوس لپاره له مستقیمې قیمت ګذاری څخه په مناسبو قیمتونو د

(c) ketabton.com: The Digital Library

درېيمه درجه تابع ګراف رسموو، چې چندان دقيق نه دی.

مثال: د $y=-x^3$ تابع ګراف رسم کړئ!

x	-2	-1	0	1	-2
y	8	1	0	-1	-8



د درېيم څپرکي پوښتنې

د لاندې درېيمه درجه معادلو جذرونه پيدا کړئ، هغه تجزيه کړئ او وروسته د معادلې ګراف رسم کړئ؟

$1)2x^3-5x^2-14x+8=0$

$2)2x^3+3x^2-45x+54=0$

$3)x^3-9x^2+26x-24=0$

$4)6x^3+2x^2-x-4=0$

$5)30x^3-x^2-76x+15=0$

$6)x^3-6x^2+11x-6=0$

(c) ketabton.com: The Digital Library

ردیفونه او سلسلې

ټولیزه موخه

پر ترادف او سلسله او د هغو پر ډولونو باندې پوهیدل او په ا قتصادي مسایلو کې له هغوڅخه ګټه اخیستل.

د زده کړې موخې: محصلین به د دې څپرکي په پای کې په لاندې موضوعاتو وپوهېږي:

- د ردیف او سلسلې د مفهوم درک او د ردیفونو او سلسلو په ډولونو پوهېدنه.
- د ردیفونو او سلسلو د قوانینو او اصولو په اړه پوهه او د عمومي ردیفونو او سلسلو د جمعې پیدا کول.
- د سلسلو د حاصل جمع لپاره د فورمولونو زده کول او د مسایلو په حل کې د هغې کارول.
- د سلسلو د ډول پیدا کولو په هکله پوهه او د سلسلو د جنس د ټاکلو په هکله د پوهانو د نظرونو کارول او د هغو تحلیل.

ردیفونه او سلسلې

هغه عددونه، چې تر یوې ټاکلې قاعدې لاندې یو پر بل پسې ترتیب شوي وي؛ ردیف نومېږي، **مثلاً:**

$a_1, a_2, a_3, a_4 \ldots\ldots\ldots\ldots a_n \ldots\ldots I$

$2,4,8,16 \ldots\ldots\ldots\ldots 2^n \ldots\ldots II$

$1,1,\frac{3}{4},\frac{4}{8},\ldots\ldots\ldots\ldots\frac{n}{2^{n-1}}\ldots\ldots\ldots\ldots III$

پورته ترتیبونه ردیفونه تشکیلوي او هر جز یې د ردیف یو حد دی.

(c) ketabton.com: The Digital Library

که په یوه ردیف کې د هغې حدونه محدود وي؛ ټاکلی (معین) ردیف ورته ویل کېږي، مثلاً:

$$\frac{1}{1},\frac{1}{4},\frac{1}{16},\frac{1}{64},\frac{1}{256}$$

هغه ردیف، چې حدونه یې محدود نه وي؛ نا ټاکلی (غیرمعین) ردیف ورته ویل کېږي، مثلاً:

$$1,3,5,7,9,11.....,2^{n-1}$$

$$1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}.....\frac{1}{n}$$

د هرn لپاره له طبیعي عددونوڅخه یو ردیف ټاکل کېږي دا چې د عددونو شمېر لایتناهي دی؛ نو د ردیفونو د حدونو شمېر لایتناهي شو؛ بناً د هغې اخري حد نه شو ټاکلی. د یوه ردیف عمومي جمله، یعنې a_n د یوه فورمول پواسطه تعریفېږي او د n=1,2,3,..... لپاره د هغې حدود لاسته راځي.

مثال: یو ردیف، چې د هغې عمومي جمله $a_n=\frac{1}{n^2}$ ده او $n\in N$ دی لیکو.

$$1,\frac{1}{2^2},\frac{1}{3^2},\frac{1}{4^2},\frac{1}{5^2},.....\frac{1}{n^2}$$

په لاندې بڼه هم وړاندې کېږي.

$$1,\frac{1}{4},\frac{1}{9},\frac{1}{16},\frac{1}{25},.....\frac{1}{n^2}$$

د یوه ردیف عمومي حد ټاکل a_n

مثال: د n ام حد ردیف .....1,2,4,8,16 د عمومي حد د پیدا کېدو لپاره، لومړی باید د دوو متعاقبو دوو حدونو ترمنځ روابط مطالعه کړو. په پورته ردیف کې ښکاري، چې د دوو متعاقبو حدونو خارج قسمت 2 دی.

$a_1=1=2^0$

$a_2=2=2^1$ $\qquad a_5=16=2^4$

$a_3=4=2^2$

$a_4=8=2^3$ $\qquad a_n=2^{n-1}$

حسابي او هندسي ردیفونه

حسابي ردیفونه: د دې $a_1,a_2,a_3,a_4.....a_n$ په څېر یو ردیف ته حسابي ردیف ویل کېږي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

داسې چې د هغې هر حد نظر خپل مخکيني حد ته د يوه مشخص او ثابت تفاضل لرونکی وي.

مثال: 1,4,7,10,13,16.....

3=4-1 د پورتني رديف تفاضل دی.

د 7-=2-5- رديف تفاضل دی.....19- , 12- , 5- ,2

په عمومي شکل حسابي رديف د لاندې ترتيب لرونکی وي.

$a_1,a_1+d , a_1+2d , a_1+3d , a_1+4d .....a_1+(n-1)d$

په پورته رديف کې n طبيعي عدد دی، d د رديف د دوه متعاقبوحدونو تر منځ مشترک تفاضل دی، په دې ځای کې d کولی شي مثبت، منفي او صفر وي.

$a_n = a_1 + (n-1)d$ د ياد شوي رديف عمومي جمله ده.

تمرين: د لاندې رديفونو مشترک تفاضل پيدا کړئ او د هغې عمومي جمله وليکئ!

1) $-11,-7,-3,1,5,.....$

2) $22,19,16,13,...$

3) $25,(24,5),24,(23,5),....$

$a_{20} = ? \; a_{200} = ?$

4) $2,-1,-4,-7,...$

$a_n = -94, n = ?$

۵- که چېرې د يوه رديف درېيم حد 7 وي او اووم حد يې 15 وي، پنځم حد يې پيدا کړئ!

۶- د پنځم سوال رديف وليکئ!

۷- دشپږم سوال 99 ام حد رديف وليکئ!

هندسي رديفونه

يو رديف ته هغه وخت هندسي ويل کېږي، چې د دوه متعاقبو حدونو ترمنځ نسبت يې مشخص او ثابت وي.

مثلاً: دا $a_1,a_1r,a_1r^2,a_1r^3,....,a_1r^{n-1}$ رديف يو هندسي رديف دی.

مثال: $3,6,12,24,48,.....3r^{n-1}$

$3,3\cdot 2^1,3\cdot 2^2,3\cdot 2^3,3\cdot 2^4,.....,3\cdot 2^{n-1}$

د رديف له عمومي شکل او پورته مثال څخه په لاس راځي، چې د يوه هندسي رديف n ام حد عبارت دی له:

$a_n = \left(a_1 r^{n-1}\right) n \in IN$

(c) ketabton.com: The Digital Library

تمرين

د ردیفونو عمومي جملي درکړل شوې دي؛ ردیفونه ولیکئ!

۱- $a_n = \frac{1}{n+1}$ او $n \in N$ دی اته اول حدونه یې ولیکئ!

۲- $a_n(1+(-1)^n)$, $n \in N$ د یوه ردیف عمومي جمله ده، ذکر شوی ردیف ولیکئ!

۳- هغه ردیفونه، چې n ام حدونه یې درکړل شوی ولیکئ!

$a^n = \left(1+(-1)^n\right)^n n \in N$ $\quad$ $a^n = \left(1-\frac{1}{n}\right) \right) n \in N$

$a^n = \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n}\right) n \in N$ $\quad$ $a^n = \left(\frac{\sqrt{2}}{n+1}\right) \right) n \in N$

$a^n = \left(\frac{1}{(3n-1)^2}\right) n \in N$ $\quad$ $a^n = \left(\frac{1}{n}(\frac{1}{5})^n\right) n \in N$

٤- که چېرته د یوه هندسي ردیف حد 4 او مشترک نسبت یې 4 وي، اتم حد په کار دی.

٥- که چېرته اول حد ½ او مشترک نسبت یې ½ وي په کار ده د هغې یوولسم حد او ردیف ولیکئ.

٦- اول حد 2 اودویم حد 6 اوa_n=486 ، n مطلوب دی.

۷- اول حد 3اودویم حد 6 او a_n=96 n مطلوب دی.

سلسلې

د تطبیقي ریاضي په ساحه، اقتصاد، صنعت او نورو کې وروسته د ردیفونو د حدونو د جمعې حاصل ته اړتیا وي؛ نو لازمه ده، چې په اړه یې معلومات حاصل کړو.

د $a_1,a_2,a_3,a_4,\ldots,a_{n-1}$ ردیف په نظر کې نیسو، د ردیف قسمي حاصل جمع عبارت دی له:

$s_1 = a_1$

$s_2 = a_1 + a_2$

$s_3 = a_1 + a_2 + a_3$

$s_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$

$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \ldots\ldots + a_{n-1} + a_n$

دا چې د یوه ردیف حدونه ډېر زیات دي؛ نو کولای شو د هغې د جمعې حاصل په پراخه او لنډ ډول ولیکو، له یوناني توري؛ سګما څخه ګټه اخلو.

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \ldots\ldots + a_{n-1} + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

له Σ دې بڼکته او پورته علامې ښیي، چې k ټول تام اعداد له یوه څخه تر n ، K د اندکس په نامه یادېږي، کولای شو دې ته ورته n,j,I او له نورو هم ګټه واخلو.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$\sum_{k=1}^{n} 2k = \sum_{i=1}^{n} 2I = \sum_{j=1}^{n} 2j = 2\cdot 1 + 2\cdot 2 + 2\cdot 3 + ...2n$$

$$\sum_{k=1}^{n} 5^k = 5^1 + 5^2 + 5^3 + ...5^n$$

$$J = I = K = 1,2,3....n$$

مثال: دلاندې سلسلې د جمع حاصل د Σ په شکل وليکئ!

$1+3+5+7+\ldots..2^{n-1}$

حل: دا چې 2n-1 د پورته سلسلې عمومي جمله ده؛ نو ليکلی شو:

$$1+3+5+7+.....2n-1 = \sum_{k=1}^{n} 2k-1$$

حل: د $1+4+9+16+\ldots..+n^2$ سلسلې د جمع حاصل د $\sum$ په شکل وليکئ!

$$1+4+16+.....+(n-1)^2+n^2 = \sum_{j}^{n} j^2$$

$\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ د سلسلې د جمع حاصل بې نهايت دی، a1,a2,a3,….an اعداد د سلسلې حدونه دي او an د سلسلې عمومي جمله نومېږي.

هر کله چې $\sum_{k=1}^{n} a_k$ او $\sum_{k=1}^{n} b_k$ دوه سلسلې او c ثابت عدد وي، لاندې خاصيتونه يې د قسمي مجموعو لپاره سم دي.

$$\sum_{k=1}^{n} c = nc, \sum_{k=1}^{n} ca_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k$$

$$c\sum_{k=1}^{n}(ak+bk) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$$

نوټ: د سګما مفهوم او قواعد د دې کتاب په لومړۍ څېړکې کې تفصيلي وړاندې شول.

تمرين: لاندې مجموعې پيدا کړئ!

$$\sum_{k=1}^{3} \frac{2}{k+1} \quad , \quad \sum_{j=1}^{4} j^2 \quad , \quad \sum_{k=1}^{10} 2 \quad , \quad \sum_{I=1}^{6} 3i$$

$$\sum_{j=1}^{5} \frac{j-1}{j+1} \quad , \quad \sum_{n=1}^{6} \frac{n^2+1}{n} \quad , \quad \sum_{k=1}^{i} (n+\frac{1}{n})$$

حسابي سلسله

که يو حسابي رديف په نظر کې ونيسو.

$a_1, a_1+d, a_1+2d, a_1+3d, \ldots. a_1+(n-1)d$

د پورتني رديف مجموعه يوه حسابي سلسله ده.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 + (a-1)d = a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d + ... + a_1 + (n-1)d$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د یادې سلسلې قسمي مجموعې:

$$s_1 = a_1$$
$$s_2 = a_1 + a_1 + d$$
$$s_3 = a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d$$
$$s_n = a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d + a_1 + 3d + ... + a_1 + (n-1)d$$

د حاصل جمع لپاره د فورمول د لاسته راوړلو په خاطر یوه حسابي سلسله S_n په دوه طریقو لیکلی شو:

$$Sn = a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d + a_1 + 3d + ...a_1 + (n-1)d$$
$$Sn = a_1 + (n-1)d + a_1 + (n-2)d + a_1 + (n-3) + ... + a_1$$

پورتنۍ رابطې خوا په خوا جمع کوو.

$$2S_n = 2a_1 + (n-1)d + 2a_1 + (n-1)d + ... + 2a1 + (n-1)d$$
$$2S_n = n(2a1 + (n-1)d$$
$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$
$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 = a_1 = (n-1)d)$$
$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 = a_1 = (n-1))$$
$$S_n = \frac{n}{2}(1+n) = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

د مسلسلو طبیعي اعدادو د جمعې حاصل

که په یوه حسابي سلسله کې $d>0$ وي، سلسله متزایده ده، که چېرې $d<0$ وي، متناقصه سلسله ورته ویل کېږي.

پوهېږو چې د یوې حسابي سلسلې اخري حد:

$$L = a + (n-1)d$$
$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

په حسابي تصاعد کې د جملو جوړونه

که په یوه حسابي سلسله کې اول او اخر حد معلوم وي، د d د قیمت په اړبودو کولی شو سلسله پوره کړو.

(c) ketabton.com: The Digital Library

a.....L

جملهm

د سلسلې د جملو شمېر $n = m + 2$

$$L = a + (n-1)d \Rightarrow (n-1)d = L - a \Rightarrow$$
$$d = \frac{L-a}{n-1} \Rightarrow d = \frac{L-a}{m+1}$$

مثال: په یوه حسابي سلسله کې، چې اول حد یې 7 او اخري حد یې 9- دی، درې جملې جوړې او سلسله ولیکئ!

$$d = \frac{L-a}{m+1}$$
$$d = \frac{-9-7}{3+1} = \frac{-16}{4} = -4$$

متناقصه سلسله 9 – 5 - 1 – 3 + 7

د حسابي سلسلې د مسلسلو جفتو اعدادو د جمعې حاصل
پوهېږو چې مسلسل جفت عددونه په حسابي سلسله کې په لاندې ډول دي.

$$2 + 4 + 6 + 8 + ... + 2n$$
$$S = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$
$$S = \frac{n}{2}(4 + 2n - 2) \Rightarrow S = \frac{n}{2}(2 + 2n)$$
$$S_n = n(1+n)$$

د حسابي سلسلې د مسلسلو طاقو اعدادو د جمعې حاصل
پوهېږو چې مسلسل طاق اعداد په سلسله کې په لاندې ډول دي.

$$1 + 3 + 5 + 7 + ... + 2n - 1$$
$$S = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$
$$S = \frac{n}{2}(2 + (n-2)2) \Rightarrow S = \frac{n}{2}(2 - 2 + 2n)$$
$$S = n^2$$

که په حسابي تصاعد کې د جملو تعداد طاق وي، مجموعه یې عبارت ده له:
N د سلسلې د جملو شمېر دی:

(c) ketabton.com: The Digital Library

وسطي جمله S = n

مثال:

5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21

S = 9·13 = 117

که د m جملې اوله مجموعه او د m جملې اخره مجموعه معلومه وي، د اولې او اخري مجموعې د ټاکلو لپاره په حسابي تصاعد کې د لاندې رابطې څخه ګټه اخیستل کېږي.

$$a_1 + a_n = \frac{\text{د m مجموعې اخره جمله+ m اوله مجموعه}}{M}$$

په یوه حسابي تصاعد کې، چې 9 جملې لري، د اولو دوو جملو مجموعه یې 12 او د اخرو دوو جملو مجموعه یې 40 ده، د دې تصاعد د جملو مجموعه پیدا کړئ!

$n = 9$

$a_1 + a_n = \frac{12 + 40}{2} = 26$

$S = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S = \frac{9}{2}(26) = 9 \cdot 13 = 117$

د څلورم څېرکي پوښتنې:

۱- د ټولو تامو عددونو مجموعه د 10 څخه تر 500 پورې، چې د دوو مسلسلو عددونو ترمنځ فرق یې 14 دی، پیدا کړئ؟

۲- په یوه حسابي سلسله کې a1=3، d=5 ده، څو حدونه ورسره جمع شي، چې مجموعه یې 255 شي؟

۳- که په یوه حسابي سلسله کې $a_1=6$, d=3 وي $a_{12}=?$, $S_{12}=?$

٤- د لاندې جفتو او طاقو مسلسلو اعدادو د سلسلې د جمعې حاصل پیدا کړئ؟

1+2+3+4+5+…..+83

٥- 72 ام حد د تصاعد M+3r , M+2r , M+r پیدا کړئ؟

(c) ketabton.com: The Digital Library

لوګارتم

ټولیزه موخه:
په پیچلو محاسبو او اقتصادي مسایلو کې د لوګاریتم په اړه پوهیدل او د هغه کارول

د زده کړې موخې: ددې څپرکي په پای کې به محصلین په لاندې مواردو وپوهیږي:

- د لوګارتم د مفهوم درک او د هغه معادل د لوګارتم په قوانینو پوهېدنه.
- په محاسبو کې د لوګارتم د قوانینو کارونه، په ځانګړې توګه په اقتصادي محاسباتو کې، لکه مرکبه ربح.
- د لوګارتم په قاعدې پوهېدنه، په یو او بل د لوګارتم د قاعدو بدلول، طبیعي او معمولي لوګارتم.
- د لوګارتم د جدول ترتیبول، اهمیت او له جدول څخه ګټه اخیستل.
- لوګارتم د ریاضي یو لوی بحث دی، چې د ضرب، تقسیم عملیې او لوی توان لرونکي اعداد څو ځله لنډوي او اسانوي.

د مثال په ډول: $(3.035)^{50}, (13.052)^{2003}, \sqrt[97]{3.54}$ او نور په مستقیم ډول ډېرې ستونزې لري؛ خو د لوګارتم د عملیې په واسطه په اسانه او دقیق ډول حل کېږي.

لوګارتم په کال 1614 د Jan napair انګلیسي عالم په واسطه کشف شو.

که د اکسپونانسیلي $a^x = N$ معادله په نظر کې ونیسو، داسې چې N یو مثبت عدد او a یو مثبت او $a \neq 0.1$ وي. په دې حالت کې x د N لوګارتم په قاعده د a نومېږي او داسې لیکل کېږي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$x = Logarith_a N = Log_a N$

پورتنۍ رابطې ښيي چې:

سره معادل دي. $x = Log_a N, N = a^x$

مثال: $3^2 = 9$ معادله او لوګارتمي شکل يې $Log_3 9 = 2$

$Log_2 8 = 3$ شکل $8 = 2^3$

تمرين: لاندې افادې په لوګارتمي شکل وليکئ!

$5^a = 1$ $\quad 2^5 = 32$ $\quad \frac{1}{x} = e^{-i}$

$10^3 = 1000$ $\quad \frac{1}{10^3} = 10^{-3}$ $\quad a^{-b} = 1002$

لاندې افادې د هغې په معادل شکل وليکئ!

$Log_5 5 = 1$ $\quad Log_a \frac{1}{10^6} = y$ $\quad Log_m 100 = n$

$Log_5 625 = 4$ $\quad Log_n m = d$ $\quad Log_a 2^{-b} = n$

د معادل کېدو نه په ګټه اخيستو د اکسپوناسيل معادله او a,y,x لوګارتم په لاندې مساوات کې پيداکوو.

مثال:

$Log_3 y = 6$ $\quad y = 3^6 \Rightarrow y = 729$

$Log_a \sqrt{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{4} = a^{1/2} \Rightarrow a = 2$

تمرين: د n,m او b قيمتونه له لاندې دوه رابطو څخه ټاکو.

$Log_{10} 100000 = n$ $\quad Log_5 10^{-5} = m$ $\quad Log_b \sqrt[3]{64} = \frac{1}{3}$

$Log_y y = m$ $\quad Log_m x = 1$ $\quad Log_b 81 = 4$

د لوګارتم خاصيتونه

څرنګه چې $y = a^x, Log_a y = x$ يو له بل سره معادل دي؛ نو کولی شو، چې د لوګارتم خواص د $y = a^x$ تابع له خواصو څخه په لاس راوړو.

اول خاصيت: (۱) لوګارتم د b په هرې مثبتې قاعده داسې، چې $b \neq 1$ وي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$Log_b 1 = 0 \Rightarrow 1 = b^0$

دویم خاصیت: د هر عدد لوګارتم په خپله قاعده له یوه سره مساوي دی.

هر کله چې (b) یو مثبت عدد او $b \neq 1$ وي.

$b = b^1 \Rightarrow Log_b b = 1$ $\quad$ $\text{Log}_{0.05} 0.05 = 1$

درېیم خاصیت: هر کله چې $b \neq 1, b > 0$ وي؛ نو د هر (r) لپاره لرو چې:

$b^r = b^r \Rightarrow Log_b b^r = r$ $\quad$ $\text{Log}_b \text{b}^{\text{r}} = \text{r}$

$7^{-6} = 7^{-6} \Rightarrow Log_7 7^{-6} = -6$

تمرین: لاندې لوګارتمونه محاسبه کړئ!

1) $Log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} = ?$ $\quad$ $Log_{10} 0.0001 = ?$

2) $Log_8 8^{-3}$ $\quad$ $\text{Log}_4 16 = ?$

3) $\text{Log}_{100}(100)0 = ?$ $\quad$ $\text{Log}_5 25 = ?$

4) $\text{Log}_3 \sqrt{3} = ?$ $\quad$ $\text{Log}_4 \frac{1}{16} = ?$

څلورم خاصیت: $Log_b m \cdot n = Log_b m + Log_b n$

ثبوت: که $Log_b n = y, Log_b m = x$ فرض شي، پورتنۍ رابطې خوا په خوا سره ضرب کوو.

$m \cdot n = b^x \cdot b^y \Rightarrow m \cdot n = b^{(x+y)}$

اطراف د لوګارتم په قاعده نیسو.

$Log_b mn = Log_b b^{x+y}$

نظر درېیم خاصیت ته لرو.

د x او y قیمتونو په اړښودلو لرو چې: $Log_b mn = Log_b m + \log_b n$

مثال:

$Log_8 8x = Log_8 8 + Log_8 x$

$= 1 + Log_8 x$

مثال:

$Log_5 \frac{4y}{5x} + Log_5 \frac{5x^2}{y} = Log_5 \frac{4y}{5x} \cdot \frac{5x^2}{y} = Log_5 4x$

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال:

$$Log_{10}10x^2y = Log_{10}10 + Log_{10}x^2 + Log_{10}y = 1 + Log_{10}x^2 + Log_{10}y$$

تمرین

$Log_5 25\cdot 125 = ?$ $\quad$ $\mathrm{Log}_3 \frac{3x^2}{y} + Log_3 \frac{y^2}{3x} = ?$

$Log_4 16\cdot x\cdot 64y^2 = ?$ $\quad$ $\mathrm{Log}_5 25m^2n^{-4} + \mathrm{Log}_5 5\frac{n^3}{m^4}$

پنځم خاصیت: $Log_b \frac{m}{n} = Log_b m - Log_b n$

ثبوت: پوهېږو چې $m = \frac{m}{n}\cdot n$ دی. د پورتني مساوات له اطرافو څخه د b په قاعده لوګارتم نیسو.

$$Log_b m = Log_b \frac{m}{n}\cdot n \Rightarrow Log_b \frac{m}{n} + Log_b n$$

$$Log_b \frac{m}{n} = Log_b m - Log_b n$$

مثال:

$$Log_5 \frac{120}{210} = Log_5 120 - Log_5 210 => Log_5 \frac{4}{7} = Log_5 4 - Log_5 7$$

مثال:

$$Log_y 10y^2x - Log_y 2xy = Log_y \frac{10y^2x}{2xy}$$

$$= Log_y 5y = Log_y 5 + Log_y y = Log_y 5 + 1$$

څلورم او پنځم خاصیت: راښیي، چې کولای شو د هغې پو سیله د جمعې او تفریق مسایل په ضرب او تقسیم او برعکس بدل کړو.

شپږم خاصیت: د هر r لپاره لاندې رابطه سمه ده.

$$Log_a m^r = rLog_a m$$

ثبوت: فرضاً $x = Log_a m$ دی؛ نو د هغې $m = a^x$ معادله کیدای شي.

د معادل رابطې دواړه خواوې د r په توان پورته وړو

$$m^r = \left(a^x\right)^r$$

د دې رابطې له دواړو خواو څخه د a په قاعده لوګارتم نیسو.

$$m^r = a^{\boldsymbol{x}}$$

$$Log_a m^r = Log_a a^{\boldsymbol{x}} \rightarrow \boldsymbol{x} = rLog_a m$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال: لاندې لوګارتمونه حساب کړئ!

$Log_2 64 = ?$ $\quad Log_2 64 = Log_2 2^6 = 6Log_2 2 = 6$

$Log_5 125 = ?$ $\quad Log_5 125 = Log_5 5^3 = 3Log_5 5 = 3$

$Log_{10} 0.0001 = ?$ $\quad Log_{10} 10^{-4} = -4Log_{10} 10 = -4$

$Log_{10} \frac{1}{1000} = ?$ $\quad Log_{10} 10^{-3} = -3Log_{10} 10 = -3$

تمرین: لاندې لوګارتمونه حساب کړئ!

$Log_3 \frac{1}{9} = ?$ $\qquad Log_4 \frac{1}{16} = ?$ $\qquad Log_4 \sqrt{256} = ?$

$Log_{10} (100)^{\frac{3}{2}} = ?$ $\qquad Log_3 (27)^{\frac{1}{3}} = ?$ $\qquad Log_3 3^5 \cdot 21 = ?$

اووم خاصیت

$$Log_{a^b} m = \frac{1}{b} Log_a m$$

ثبوت: فرضوو، چې $Log_a bm$ دی نو د هغې معادله رابطه ده:

$m = (a^b)^x$

$m = (a^x)^b$

b ام جذر د پورته رابطې $m^{1/b} = a^x$ د دې رابطې له اطراف څخه د a په قاعده لوګارتم نیسو.

$Log_a m^{1/b} = Log_a a^x$

د شپږم خاصیت نه په ګټه اخیستو کولای شو ولیکو.

$\frac{1}{b} Log_a m = x Log_a a$

$\frac{1}{b} Log_a m = x \Rightarrow Log_{a^b} m = \frac{1}{b} Log_a m$

مثال:

$$Log_{16} 4 = Log_{4^2} 4 = \frac{1}{2} Log_4 4 = \frac{1}{2}$$

مثال:

$$Log_{25} 125 = Log_{5^2} 125 = Log_{5^2} 5^3 = \frac{3}{2} Log_5 5 = \frac{3}{2}$$

تمرین: د لوګارتم د اووم خاصیت نه په ګټه اخیستو ځوابونه ولیکئ!

$Log_{\frac{1}{9}} 27 = ?$ $\qquad Log_8 4 = ?$ $\qquad Log_{\frac{1}{9}} 5^{-2} = ?$

$Log_{\frac{1}{16}} 8 = ?$ $\qquad Log_{64} 16 = ?$ $\qquad Log_{\frac{1}{5}} 5 = ?$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د لوګارتم د قاعدې د بدلولو فورمول

که چېرې $b \neq 1, a \neq 1, x > 0, a > 0$ وي؛ نو لرو چې:

$$Log_b x = \frac{Log_a x}{Log_a b}$$

د پورته فورمول نه په ګټه اخیستو، کولی شو لوګارتم له یوې قاعدې څخه بلې قاعدې ته واړوو.

ثبوت: فرض کوو، چې $Log_b x = y$ او د هغې معادل $x = (b)^y$ دی.

د معادلې رابطې له دواړو خواوو څخه د a په قاعده لوګارتم نیسو.

$$Log_a x = Log_a b^y = y Log_a b$$

$$Log_a x = Log_b x \cdot Log_a b$$

$$Log_b x = \frac{Log_a x}{Log_a b}$$

په رابطه کې د y قیمت ږدو.

یاده دې وي، چې د a په قاعده د عددونو لوګارتم لرو.

که چېرې x په a عوض کړو، رابطه لاندې شکل نیسي.

$$Log_b a \cdot Log_a b = 1$$

مثال: $Log_9 27$ محاسبه کړئ!

$$Log_9 27 = \frac{Log_3 27}{Log_3 9} = \frac{Log_3 (3)^3}{Log_3 3^2} = \frac{3 Log_3 3}{2 Log_3 3} = \frac{2}{3}$$

مثال: $Log_5 100$ حساب کړئ، په هغه صورت کې، چې $Log_{10} 5 = 0.7$ وي.

د فورمول نه په ګټه اخیستو:

$$Log_5 100 = \frac{Log_5 100}{Log_{10} 5} = \frac{Log (10)^2}{Log 5} = \frac{2}{0.7} = \frac{20}{7}$$

تمرین: لاندې لوګارتمونه حساب کړئ!

$Log_{64} 16 = ?$ $\quad$ $Log_{16} 32 = ?$ $\quad$ $Log_{0.01} 0.0001 = ?$

$Log_{121} 14641 = ?$ $\quad$ $Log_{100} 0.001$ $\quad$ $Log_{0.01} 1000 = ?$

معمولي لوګارتم او طبیعي لوګارتم

لکه څنګه چې پوهېږو، هر مثبت عدد خلاف د یوه لوګارتم قاعده کېدای شي، ولې هغه قاعدې، چې په عمل کې په کار وړل کېږي، د e عدد او 10 عدد دی، e یو غیر نسبتي عدد دی، چې تقریبي قیمت یې $e = 2.718281828$ دی.

(c) ketabton.com: The Digital Library

هغه لوګارتم، چې قاعده يې e ده د طبيعي لوګارتم په نوم يادېږي، په لاندې ډول ښودل کېږي.

$$Lnx = Log_e x$$

هغه لوګارتم، چې قاعده يې 10 ده، د معمولي لوګارتم په نوم يادېږي او په لاندې ډول دی.

$$Logx = Log10x$$
$$Log0.0001 = Log10^{-4} = -4$$
$$Log1000 = Log10^{3} = 3$$
$$Log_e e \cdot e \cdot e \cdot = Log_e e^{3} = 3$$
$$Lne \cdot e \cdot e \cdot = Lne^{3} = 3$$
$$Ln\frac{1}{ee} = Ln\frac{1}{e^{2}} = Lne^{-2} = -2$$
$$Ln\frac{1}{e^{-3}} = Lne^{3} = 3$$
$$Log100000 = Log10^{5} = 5$$

نوټ: لوګارتمي تابع او د هغې معادل په اصل کې د يو بل معکوس دي، کولی شو موضوع په لاندې ګراف کې ښه درک کړو.



(c) ketabton.com: The Digital Library

د عدد لیکلو علمي طریقه

په ساینس او ریاضیاتو کې داسې ډېر ځایونه شته، چې له لویو او کوچنیو عددونو سره سروکار لري، لکه:

1- یو نوري کال تقریباً 500.000.000.000 میله فاصله ده.

2- په متریک سیستم کې یو ملي مکرون 0.000.000.001 متر دی.

3- د یو مالیکول اکسیجن وزن 0.00000000000000000000053 ګرامه دی.

دا عددونه کولی شو په لنډ ډول ولیکو:

$$500000000000 = 5 \cdot 10''m$$

$$0.00000000000000000053 = 5.3 \cdot 10^{-22} gr$$

$$0.000000000001 = 10^{-12}$$

یو عدد په علمي طریقه لیکل شوی، که لاندې شکل ولري:

که چېرې $1 < a < 10$ وي او n تام عدد وي.

تمرین: لاندې عددونه د لیکلو علمي روش تطه راوړئ!

$0.000452 = ?$	$0.102 = ?$
$245000000 = ?$	$235.03 = ?$
$4300000 = ?$	$3004.001 = ?$
$502000000 = ?$	$0.000000000000000402 = ?$

کرکټرستیک او مانتیس (مشخصه او مانتیسه)

د هر عدد لوګارتم په عمومي توګه له دوو برخو جوړ وي. کرکټرستیک او مانتیس، چې کرکټرستیک صحیح برخه او مانتیس د لوګارتم اعشاري برخه ده.

مشخصه د دوو لاندینیو اصلونو په اساس تعینېږي.

۱- که چېرې N له یوه څخه لوی وي، د یوه عدد د لوګارتم مشخصه د یوه په اندازه د اعشاري علامې د چپ طرف د ارقامو د تعداد څخه کمه وي، یعنې که د چپ طرف د رقمونو شمېر K وي.

نو $k-1 =$ مشخصه ده.

۲- که چېرې N له یوه څخه کوچنی وي، د N عدد لوګارتم مشخصه منفي ده، البته د لوګارتم اعشاري برخه د اعدادو د لوګارتم له جدول څخه اخیستل کېږي، بناءً د مکملو اعدادو لوګارتم عبارت دی له:

(c) ketabton.com: The Digital Library

مانتیسه + مشخصه = LogN

دا چې مانتیسه هر وخت مثبته وي، باید (-K) مشخصه په 10 – K – 10 شکل ولیکل شي.

د مثال په ډول: که 0.57325 د یوه عدد د لوګارتم مانتیسه وي؛ نو که مشخصه یې په دې حالت کې 2 , 1 , 0 , 1 - , 2 - وي، په دې حالت کې یې لوګارتم په لاندې ډول لیکل کېږي.

8.57325 – 10 , 9.57325 – 10 , 0.57325 , 1.57325

مثال: د لاندې عدد د لوګارتم کرکټرستیک پیدا کړئ!

$Log 1000.0$

څرنګه چې د چپ طرف د اعشاري رقمونو شمېر 4 دی؛ نو د ذکر شوي عدد کرکټرستیک $K-1=4-1=3$ دی.

له یوه نه د کوچنیو عددونو د لوګارتم کرکټرستیک د منفي علامې لرونکی دی، که د صفرونو تعداد د اعشاري علامې نه وروسته n وي، د دې اعشاري کسر کرکټرستیک (n+1) – دی.

مثال: د 0.00025 عدد د لوګارتم کرکټرستیک وټاکئ!

څرنګه چې د اعشاري علامې څخه وروسته 3 صفرونه دي؛ نو $-(3+1)=-4$

تمرین: د لاندې لوګارتم کرکټرستیک وټاکئ!

Log 0.1 , Log0.005 , Log23005

$Log2.3 \cdot 10^{-5}$, $Log232 \cdot 10^{2}$, $Log0.02 \cdot 10^{-3}$

Log 45.3 , Log3000.0 , $Log200 \cdot 10^{3}$

مانتیس او د یوه عدد د لوګارتم د مانتیس ټاکل

لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه، د یوه عدد د لوګارتم مانتیس د هغه عدد د لوګارتم اعشاري برخه تشکیلوي، چې هر وخت یو اعشاري عدد مثبت وي او د اعدادو د لوګارتم د جدول څخه اخیستل کېږي، لکه:

$$Log_{10}20 = Log_{10}2 \cdot 10 = Log_{10}10 + Log_{10}2$$
$$Log\,20 = 1 + 0.30103 = 1.30103$$

0.30103 اعشاري کسر د 20 عدد د لوګارتم د مانتیس په نامه یادېږي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$Log300 = Log100 \cdot 3 = Log100 + Log3 = 2 + 0.4771$$
$$Log300 = 2.4771$$

مثال: د 0.002 عدد لوګارتم پیدا کوو.

$$Log0.002 = Log10^{-3} \cdot 2 = Log10^{-3} + Log2 = -3 + 0.30103$$

دا چې د سوال په حل کې مانتیس منفي دی، کولی شو په لاندې ډول یې ثبت کړو.

مثال:

$$1)1 - 0.30103 = 0.69897$$

مثال:

$$LogN = -3.23403 = -3 - 0.23406$$
$$= -3 - 0.23403 + 1 - 1 = 4 + 0.76597 = -44.766597$$

د یادولو وړ ده، چې د یوه عدد د لوګارتم مانتیس په قاعدې پورې تړلی وي، که ذکر شوی عدد لس یا لس چنده لوی یا کوچنی کړو، د یاد عدد د لوګارتم په مانتیس کې تغیر نه راځي.

مثال:

$$Log_{10}583 = 2.76567$$
$$Log58300 = Log583 \cdot 100 = Log583 + Log100 = 4.76567$$
$$Log0.00583 = Log583 \cdot 10^{-5}$$
$$Log583 + Log10^{-5} = 2.76567 + (-5) = -3.76567$$
$$Log0.0000583 = Log583 \cdot 10^{-7} = Log583 + Log10 - 7$$
$$= 2,765667 - 7 = -576567$$

د لوګارتم له جدول نه د ګټې اخیستنې طریقه

لکه څنګه چې د لوګارتم په حسابي معادلو کې د 10 قاعده د استعمال زیات موارد لري، غواړو، چې د 10 قاعدې د لوګارتم له جدول څخه د ګټې اخیستنې طریقه زده کړو.

$$Log397 = ?$$
$$Log397 = Log3.97 \cdot 10^2 = Log3.97 + Log10^2$$
$$= 0.5988 + 2 = 2.5988$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

په لسمه قاعده کې د لوګاريتمي اعدادو جدول

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,0	0,0000	0,0043	0,0086	0,0128	0,0170	0,0212	0,0253	0,0294	0,0334	0,0374
1,1	0,0414	0,0453	0,0492	0,0531	0,0569	0,0607	0,0645	0,0682	0,0719	0,0755
1,2	0,0792	0,0828	0,0864	0,0899	0,0934	0,0969	10000,	0,1038	0,1072	0,1106
1,3	0,1139	0,1173	0,1206	0,1239	0,1271	0,1303	0,1335	0,1367	0,1399	0,1430
1,4	0,1461	0,1492	0,1523	0,1553	0,1584	0,1614	0,1644	0,1673	0,1703	0,1732
1,5	0,1761	0,1790	0,1818	0,1847	0,1875	0,1903	0,1931	0,1959	0,1987	0,2014
1,6	0,2041	0,2068	0,2095	0,2122	0,2148	0,2175	0,2201	0,2227	0,2253	0,2279
1,7	0,2304	0,2330	0,2355	0,2380	0,2405	0,2430	0,2455	0,2480	0,2504	0,2529
1,8	0,2553	0,2577	0,2601	0,2625	0,2648	0,2672	0,2695	0,2718	0,2742	0,2765
1,9	0,2788	0,2810	0,2833	0,2856	0,2878	0,2900	0,2923	0,2945	0,2967	0,2989
2,0	0,3010	0,3032	0,3054	0,3075	0,3096	0,3118	0,3139	0,3160	0,3181	0,3201
2,1	0,3222	0,3243	0,3263	0,3284	0,3304	0,3324	0,3345	0,3365	0,3385	0,3404
2,2	0,3424	0,3444	0,3464	0,3483	0,3502	0,3522	0,3541	0,3560	0,3579	0,3598
2,3	0,3617	0,3636	0,3665	0,3674	0,3692	0,3711	0,3729	0,3747	0,3766	0,3784
2,4	0,3802	0,3820	0,3838	0,3856	0,3874	0,3892	0,3909	0,3927	0,3945	0,3962
2,5	0,3979	0,3997	0,4014	0,4031	0,4048	0,4065	0,4082	0,4099	0,4116	0,4133
2,6	0,4150	0,4166	0,4183	0,4200	0,4216	0,4232	0,4249	0,4265	0,4281	0,4298
2,7	0,4314	0,4330	0,4346	0,4362	0,4378	0,4393	0,4409	0,4425	0,4440	0,4456
2,8	0,4472	0,4487	0,4502	0,4518	0,4533	0,4548	0,4564	0,4569	0,4594	0,4609
2,9	0,4624	0,4639	0,4654	0,4669	0,4683	0,4698	0,4713	0,4728	0,4742	0,4757
3,0	0,4771	0,4786	0,4800	0,4814	0,4829	0,4843	0,4857	0,4871	0,4886	0,4900
3,1	0,4914	0,4928	0,4942	0,4955	0,4969	0,4983	0,4997	0,5011	0,5024	0,5038
3,2	0,5051	0,5056	0,5079	0,5092	0,5105	0,5119	0,5132	0,5145	0,5159	0,5172
3,3	0,5185	0,5198	0,5211	0,5224	0,5237	0,5250	0,5263	0,5276	0,5289	0,5302
3,4	0,5315	0,5328	0,5340	0,5353	0,5366	0,5378	0,5391	0,5403	0,5416	0,5428
3,5	0,5441	0,5453	0,5465	0,5478	0,5490	0,5502	0,5514	0,5527	0,5539	0,5551
3,6	0,5563	0,5575	0,5587	0,5599	0,5611	0,5623	0,5635	0,5647	0,5658	0,5670
3,7	0,5682	0,5694	0,5705	0,5717	0,5729	0,5740	0,5752	0,5763	0,5775	0,5786
3,8	0,5898	0,5809	0,5821	0,5832	0,5843	0,5855	0,5866	0,5877	0,5888	0,5899
3,9	0,5911	0,5922	0,5933	0,5944	0,5955	0,5966	0,5977	0,5988	0,5999	0,6010
4,0	0,6021	0,6031	0,6042	0,6053	0,6064	0,6075	0,6085	0,6096	0,6107	0,6117
4,1	0,6128	0,6138	0,6149	0,6160	0,6170	0,6180	0,6191	0,6201	0,6212	0,6222
4,2	0,6232	0,6243	0,6253	0,6263	0,6274	0,6284	0,6291	0,6304	0,6314	0,6325
4,3	0,6335	0,6345	0,6355	0,6365	0,6375	0,6385	0,6395	0,6405	0,6415	0,6425
4,4	0,6435	0,6444	0,6454	0,6464	0,6474	0,6484	0,6493	0,6503	0,6513	0,6522
4,5	0,6532	0,6542	0,6551	0,6561	0,6571	0,6580	0,6590	0,6599	0,6609	0,6618
4,6	0,6628	0,6637	0,6646	0,6656	0,6665	0,6675	0,6684	0,6693	0,6702	0,6712
4,7	0,6721	0,6730	0,6739	0,6749	0,6758	0,6767	0,6776	0,6785	0,6794	0,6703
4,8	0,6812	0,6821	0,6830	0,6839	0,6848	0,6857	0,6866	0,6875	0,6884	0,6893
4,9	0,6902	0,6911	0,6920	0,6928	0,6937	0,6946	0,6955	0,6964	0,6972	0,6981
5,0	0,6990	0,6998	0,7007	0,7016	0,7024	0,7033	0,7042	0,7050	0,7059	0,7067
5,1	0,7076	0,7084	0,7093	0,7101	0,7110	0,7118	0,7126	0,7135	0,7143	0,7152
5,2	0,7160	0,7168	0,7177	0,7185	0,7193	0,7202	0,7210	0,7218	0,7226	0,7235
5,3	0,7243	0,7251	0,7259	0,7267	0,7275	0,7284	0,7292	0,7300	0,7308	0,7316
5,4	0,7324	0,7332	0,7340	0,7348	0,7356	0,7364	0,7372	0,7380	0,7388	0,7396
5,5	0,7412	0,7412	0,7427	0,7427	0,7435	0,7443	0,7451	0,7459	0,7466	0,7474
5,6	0,7482	0,7490	0,7497	0,7505	0,7513	0,7520	0,7528	0,7536	0,7543	0,7551

(c) ketabton.com: The Digital Library

په لسمه قاعده کې د لوګاريتمي اعدادو جدول

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5,7	0,7559	0,7566	0,7574	0,7582	0,7589	0,7597	0,7604	0,7612	0,7619	0,7627
5,8	0,7634	0,7642	0,7649	0,7657	0,7664	0,7672	0,7679	0,7689	0,7694	0,7701
5,9	0,7709	0,7716	0,7723	0,7731	0,7738	0,7745	0,7752	0,7760	0,7767	0,7714
6,0	0,7782	0,7789	0,7769	0,7803	0,7810	0,7718	0,7825	0,7732	0,7839	0,7846
6,1	0,7853	0,7860	0,7868	0,7875	0,7882	0,7889	0,7896	0,7903	0,7910	0,7917
6,2	0,7924	0,7931	0,7938	0,7945	0,7952	0,7959	0,7966	0,7973	0,7980	0,7987
6,3	0,9793	0,8000	0,8007	0,8014	0,8021	0,8028	0,8035	0,8041	0,8048	0,8055
6,4	0,8062	0,8069	0,8075	0,8082	0,8089	0,8096	0,8102	0,8109	0,8116	0,8122
6,5	0,8129	0,8136	0,8142	0,8149	0,8156	0,8162	0,8169	0,8176	0,8182	0,8189
6,6	0,8195	0,8202	0,8209	0,8215	0,8229	0,8228	0,8235	0,8241	0,8248	0,8254
6,7	0,8261	0,8267	0,8274	0,8280	0,8287	0,8293	0,8299	0,8306	0,8312	0,8319
6,8	0,8325	0,8331	0,8338	0,8344	0,8351	0,8357	0,8363	0,8370	0,8376	0,8328
6,9	0,8388	0,8395	0,8401	0,8407	0,8414	0,8420	0,8426	0,8432	0,8439	0,8445
7,0	0,8451	0,8457	0,8463	0,8470	0,8476	0,8482	0,8488	0,8494	0,8500	0,8506
7,1	0,8513	0,8519	0,8525	0,8531	0,8537	0,8543	0,8549	0,8555	0,8561	0,8567
7,2	0,8573	0,8589	0,8585	0,8591	0,8597	0,8603	0,8609	0,8615	0,8621	0,8627
7,3	0,8633	0,8639	0,8645	0,8651	0,8657	0,8663	0,8669	0,8675	0,8681	0,8686
7,4	0,8692	0,8698	0,8704	0,8710	0,8716	0,8722	0,8727	0,8733	0,8739	0,8745
7,5	0,8751	0,8756	0,8762	0,8768	0,8774	0,8779	0,8785	0,8791	0,8797	0,8802
7,6	0,8808	0,8814	0,8820	0,8825	0,8831	0,8837	0,8842	0,8848	0,8854	0,8859
7,7	0,8865	0,8871	0,8876	0,8882	0,8887	0,8893	0,8899	0,8904	0,8910	0,8915
7,8	0,8921	0,8927	0,8932	0,8938	0,8943	0,8949	0,8954	0,8960	0,8965	0,8971
7,9	0,8976	0,8983	0,8987	0,8993	0,8998	0,9004	0,9009	0,9015	0,9020	0,9025
8,0	0,9031	0,9036	0,9042	0,9047	0,9053	0,9058	30,906	0,9069	0,9074	0,9079
8,1	0,9085	0,9090	0,9096	0,9101	0,9106	0,9112	0,9117	0,9122	0,9128	0,9133
8,2	0,9138	0,9143	0,9149	0,9154	0,9159	0,9165	0,9170	0,9175	0,9180	0,9186
8,3	0,9196	0,9199	0,9201	0,9206	0,9212	0,9217	0,9222	0,9227	0,9232	0,9238
8,4	0,9243	0,9248	0,9253	0,9258	0,9263	0,9269	0,9274	0,9279	0,9284	0,9289
8,5	0,9294	0,9299	0,9304	0,9309	0,9315	0,9320	0,9325	0,9330	0,9335	0,9340
8,6	0,9345	0,9350	0,9355	0,9360	0,9365	0,9370	0,9375	0,9380	0,9385	0,9390
8,7	0,9395	0,9400	0,9405	0,9410	0,9415	0,9420	0,9425	0,9430	0,9435	0,9440
8,8	0,9445	0,9450	0,9455	0,9460	0,9465	0,9469	0,9474	0,9479	0,9484	0,9489
8,9	0,9494	0,9499	0,9504	0,9509	0,9513	0,9518	0,9523	0,9528	0,9533	0,9538
9,0	0,9542	0,9547	0,9552	0,9557	0,9562	0,9566	0,9571	0,9576	0,9581	0,9586
9,1	0,9590	0,9595	0,9600	0,9605	0,9609	0,9614	0,9619	0,9624	0,9628	0,9633
9,2	0,9638	0,9643	0,9647	0,9652	0,9657	0,9661	0,9666	0,9671	0,9675	0,9680
9,3	0,9685	0,9689	0,9694	0,9699	0,9703	0,9707	0,9713	0,9717	0,9722	0,9727
9,4	0,9731	0,9736	0,9741	0,9745	0,9750	0,9754	0,9759	0,9763	0,9768	0,9773
9,5	0,9777	0,9782	0,9786	0,9791	0,9795	0,9800	0,9805	0,9809	0,9814	0,9818
9,6	0,9823	0,9827	0,9732	0,9836	0,9841	0,9845	0,9850	0,9854	0,9859	0,9863
9,7	0,9868	0,9872	0,9877	0,9881	0,9886	0,9890	0,9894	0,9899	0,9903	0,9908
9,8	0,9912	0,9917	0,9921	0,9926	0,9930	0,9934	0,9939	0,9943	0,9948	0,9952

(c) ketabton.com: The Digital Library

له پورتني جدول څخه دوه لومړي رقمونه 39 د N له ستون څخه او 7 عدد په N سطر کې پیدا کوو، هغه عدد چې د سطر او ستون په تقاطع کې واقع دی، د 397 عدد د لوګارتم مانتیس دی.

انتي لوګارتم

د 117 عدد لوګارتم عبارت دی له 2.0682 څخه؛ نو 117 عدد د2.0682 د انتي لوګارتم په نوم یادیږي؛ نو ویلی شو، چې هر عدد د هماغه عدد انتي لوګارتم دی.

مثال: $Logx = 2.5988$ دی؛ نو x به څو وي؟

حل: لکه څنګه چې x د 2.5988 انتي لوګارتم دی، د کرکټرستیک په نظر کې نیولو او له جدول څخه په ګټې اخیستنې $x = 397$ دي.

کو لوګارتم

د تعریف له مخې کو لوګارتم د هماغه عدد له معکوس لوګارتم څخه عبارت دی.

$$CoLogN = Log\frac{1}{N} = Log1 - LogN = -LogN$$

$$CoLogN = -LogN$$

مثال: که $Log35.7 = 1.55230$ وي، د ذکر شوي عدد کو لوګارتم وټاکئ!

$$Log35.7 = 1.55267$$

$$CoLog35.7 = ?$$

حل: پوهېږو چې $CoLogN = Log\frac{1}{N}$ دی.

$$CoLog35.7 = Log\frac{1}{35.7} = Log1 - Log35.7 = 1010 - 1.55267 = 8.44733 - 10$$

0.30103 اعشاري کسر ته د 20 د عدد د لوګارتم مانتیس وایي.

$$Log300 = Log100 \cdot 3 = Log100 + Log3 = 2 + 0.4771$$

$$Log300 = 2.4771$$

د ذکر شوي عدد اعشاري کسر، د 300 د لوګارتم مانتیس دی.

مثال: د 0.002 عدد لوګارتم پیدا کوو.

$$Log0.002 = Log10^{-3} \cdot 2 = Log10^{-3} + Log2 = -3 + 0.30103 = -2,69897$$

که د سوال په حل کې مانتیس منفي راغی، کولی شو په لاندې طریقه یې مثبت کړو.

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال:

$$Log_{10}\frac{1}{2} = Log_{10}1 - Log_{10}2 = 0 - 0.30103$$

د دې لپاره چې مثبت مانتيس په لاس راشي، د 1 عدد له هغه سره جمع او منفي کوو.

$$1 - 1 - 0.30103 = \bar{1}.69897$$

مثال:

$$LogN = -3.23403 = -3 - 0.23403 = -3 - 0.23403 + 1 - 1 = -4 + 0.76597$$
$$= -3,23463$$

انټرپولېشن Inter polation

د څلور رقمي عدد د لوګارتم مانتيس په څلور رقمي جدول کې او د پينځه رقمي عدد د لوګارتم مانتيس له پينځه رقمي جدول څخه په لاس راځي. مګر ځينې وخت د داسې عددونو سره مخامخ کېږو، چې د نوموړو عددونو د لوګارتم مانتيس په جدول کې نه وي، د داسې عددونو د مانتيس د پيدا کولو لپاره دې عدد ته د ډېر نږدې عددونو له مقايسې (يو لوی او بل کوچني) څخه د تناسب د عملیې په مرسته لاسته راوړو، دا عمليه، چې يوه دقيقه برخه ده انټر پولېشن نومېږي.

موضوع په مثال سره توضېح کوو.

مثال: 24357 لوګارتم په لاس راوړو.

حل: د پورتني عدد مشخصه 4 ده، د دې عدد مانتيس په جدول کې نشته؛ خو د 24360 او 24350 مانتيس په جدول کې شته.

$$10\begin{bmatrix}24350\\24357\\24360\end{bmatrix}7$$

$$\begin{vmatrix}0.38650\\?\end{vmatrix}\begin{vmatrix}x\\0.3866\end{vmatrix}\begin{vmatrix}0.00018\end{vmatrix}$$

د ورکړل شوي عدد ترمنځ توپير او 7 له دې څخه کوچنی.

د ورکړل شوي عدد ترمنځ توپير او 10 لوی له دې څخه.

د ورکړل شوي عدد د مانتيس په منځ کې توپير او X د هغه څخه د کوچني مانتيس

(c) ketabton.com: The Digital Library

د کوچني عدد د مانتيس په منځ کې فرق او 0.00018لوی له ورکړل شوي عدد څخه.
لکه څنګه چې پورتنۍ رابطې مستقیم تناسب جوړوي؛ نو کولی شو د پورتنیو اعدادو تناسب ترتیب کړو.

$$\frac{10}{7}=\frac{0.00018}{x}$$

د x قیمت د کوچني عدد له مانتيس سره جمع کوو او یا دا د لوی عدد له مانتيس څخه منفي کوو.

$$10x=0.00126$$

لاسته راغلې نتیجه د ورکړل شویو اعدادو مانتيس دی.

$$x=0.00013$$
$$0.38650$$
$$\underline{0.00013}$$
$$0.38663$$

په کوم مخ کې چې د اعدادو د لوګارتم مانتيسونه لټوو، ښي لور ته یې واړه جدولونه شته، چې د Poroportional په نامه یادېږي.
په دې جدول کې د چپ طرف په ستون کې له 1 څخه تر 9 پورې صحیح عددونه او د چپ طرف په ستون کې د اعدادو مانتيس د $\frac{1}{10}$ په تناسب لیکل شوی، لکه: که د 1.472.85 لوګارتم د لوګارتم د جدول نه په ګټه اخیستو لاسته راوړو؛ نو داسې عمل کوو.

	9
1	0.9
2	1.8
3	2.7
4	3.6
5	4.5
6	5.4
7	6.3
8	7.2
9	8.1

حل: د یاد شوي عدد کرکټرستیک 2 دی، د مانتيس د پیدا کولو لپاره داسې عمل کوو.
$x=4728.5$ د ورکړل شوي عدد مانتيس

(c) ketabton.com: The Digital Library

$4728 = 0.67468$ مانتيس

$47229 = 0.67477$ مانتيس

0.00009 د مانتيس فرق د ۱ عدد فرق

د دې مخ په کوچني جدول کې د 5 عدد مقابل ته، چې له 4728.5 عدد څخه په لاس راځي. د 4.5 مانتيس ليکل شوی دی، هر کله چې د 4.5 مانتيس د کوچني عدد د مانتيس له اخيرو ارقامو سره جمع کړو د مطلوب عدد مانتيس په لاس راځي.

$$\begin{array}{cccccccc} 0. & 6 & 7 & 4 & 6 & 8 & & \\ & & & & & 4 & 5 & \\ \hline 0. & 6 & 7 & 4 & 7 & 2 & 5 \end{array}$$

$Log 472.85 = 2.67472$

د ۴۷۲,۸۵ لوګارتم د انټرپوليشن له طريقې نه په ګټه اخيستو په لاس راوړو.

$$10\left[5\begin{bmatrix} 47280 = 0.6746 \\ 47285 = 7 \\ 47290 = 0.67477 \end{bmatrix} x\right] 0.0009$$

د کوچني عدد له مانتيس سره جمع کېږي.

$$\begin{array}{cccccccc} 0. & 6 & 7 & 4 & 6 & 8 & & \\ & & & & & 4 & 5 & \\ \hline 0. & 6 & 7 & 4 & 7 & 2 & 5 \end{array}$$

$$\frac{5}{10} = \frac{x}{0.00009} \Rightarrow 10x = 0.00045 \Rightarrow x = 0.000045$$

تمرين: د لاندې عددونو د لوګارتم مشخصه او مانتيسه د جدول نه په ګټه اخيستو پيدا کړئ!

$Log 24546$	$Log 0.012353$
$Log 10012$	$Log 0.000021314$
$Log 10135$	$Log 43256$
$Log 0.0034521 \cdot 10^{-3}$	$Log 42341 \cdot 10^{-6}$

د لوګارتم د جدول ترتيب

د هغو سلسلو د عددونو د لوګارتم د مانتيس د لاسته راوړلو په خاطر، چې د تايلور له فورمول نه په ګټه اخيستو ترتيب شوی، کار اخلو.

$$Ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + ...I$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

که x په x− عوض کړو.

$$Ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - .....II$$

دویمه رابطه له لومړۍ څخه منفي کوو.

$$Ln(1-x) - Ln(1-x) = 2x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{5}x^5 + ...$$

$$Ln\frac{1+x}{1-x} = 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + ...\right)$$

دارنګه $x = \frac{1}{2n+1}$ وضع کوو.

$$Ln\frac{n+1}{n} = 2\left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{3(2n+1)^3} + \frac{1}{5(2n+1)^5} + ...\right)$$

که اوس n = 1 شي Ln2 په لاس راځي.

$$Ln2 = 2\left\{\frac{1}{3} + \frac{1}{3(3)^3} + \frac{1}{5(3)^5} + \frac{1}{7(3)^7} + ...\right\}$$

$$Ln2 = 0.693147180$$

د هغې دقت تر 9 رقم دی.

کولای شو Ln2 په قاعده د 10 بدل کړو.

$$LogN = m \cdot LnN$$

$$m = 0.43429$$

$$Ln2 = 0.434294 \cdot 0.693147 = 0.30103$$

په همدې ترتیب که n = 2 وي، Ln3 حاصلېږي.

$$Ln3 = 1.0986022$$

$$Ln4 = Ln2 \cdot 2 = Ln2 + Ln2$$

په همدې ترتیب د مرکبو اعدادو لوګارتم د لوګارتم له خاصیتونو نه په ګټه اخیستو په لاس راوړلای شو او د اولیه اعدادو لوګارتم مستقیماً د فورمول په واسطه په لاس راوړلای شو.

تمرین: د لاندې عددونو طبیعي لوګارتم له فورمول نه په ګټه اخیستو پیداکړئ! وروسته یې د 10 په قاعده بدل کړئ!

$Ln5 = ?$	$Ln6 = ?$	$Ln7 = ?$	$Ln8 = ?$
$Ln9 = ?$	$Ln10 = ?$	$Ln11 = ?$	$Ln12 = ?$
$Ln_{10}5 = ?$	$Ln_{10}6 = ?$	$Ln_{10}7 = ?$	$Ln_{10}8 = ?$

د پورته اعدادو د لوګارتم جدول ترتیب کړئ!

(c) ketabton.com: The Digital Library

د x عددونه	Lnx	$Log_{10}x$

لوګارتمي افادې

عددي افادې يا برخې، چې په هغې کې لوګارتم موجود وي، لوګارتمي افادي ورته ويل کېږي، چې کولی شو د لوګارتم له خواصو نه په ګټه اخيستو هغه ساده او په نظر کې نيولی قيمت پيدا کړو.

د مثال په توګه :

$$1-Log_2\sqrt[4]{32}=Log_2\sqrt[4]{32}=Log_2 2^{\frac{4}{5}}=\frac{4}{5}Log_2 2=\frac{4}{5}$$

$$2-og50+Log2-Log\sqrt[3]{100}=Log50\cdot 2-Log10^{2/3}=Log100-\frac{2}{3}Log10$$

$$=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$$

لوګارتمي معادلې

د لوګارتمي معادلو د حل لپاره د لوګارتم له قوانينو نه په ګټه اخيستو هغه ساده کېږي، چې د اړوند مجهول قيمت پيدا شي.

مثالونه: له لاندې لوګارتمي معادلو څخه د مجهول قيمت پيدا کړئ!

$$1-Log2+Log3=Logx=Log(2\cdot 3)=Logx=Log6=Logx$$

$$x=6$$

$$2-Log_{\sqrt{2}}x=Log_{\sqrt{2}}3+Log_{\sqrt{2}}6=Log_{\sqrt{2}}x=Log_{\sqrt{2}}(3\cdot 6)=Log_{\sqrt{2}}x=Log_{\sqrt{2}}18$$

$$x=18$$

$$3-\frac{Log_{\sqrt{2}}r}{Log_{\sqrt{3}}S}=Log_x r=>Log_x r=Log_S r$$

$$x=S$$

$$4-Log(x^2-1)=3=>x^2-1=2^3$$

$$x^2=8+1$$

$$x^2=9$$

$$x=\pm 3$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

مترکس او دیترمینانت

ټولیزه موخه

په مترکس او دیترمینانت پوهېدنه او د خطي معادلو د مسایلو په حل او د خطي معادلو د مجهولاتو په موندلو کې د هغو کارونه

د زده کړې موخې: ددې څپرکي په پای کې به محصلین لاندې موضوعات زده کړي:

- د مترکس او دیترمینانت په مفهوم او د هغه په ډولونو پوهېدل.
- د خطي معادلو د سیستم له ضرایبو څخه د مترکس ترتیب او په ستونونو او سطرونو کې لومړني بدلونونه.
- پر مترکسونو باندې اساسي عملیې او د معکوس مترکس پیدا کول.
- د خطي معادلو د سیستم د مجهولاتو پیدا کول.
- د مترکسونو په واسطه د ضرایبو ترتیب او د خطي معادلو د سیستم ثابتونه.

د خطي معادلو سیستمونه، مترکسونه او د یترمینانتونه

په ریاضي، میخانیکي، تخنیکي او اقتصادي علومو کې ډېرې ستونزې د خطي معادلو د سیستم په حل پورې اړه لري. همدارنګه د شوونځي په دوران کې د لاندې مسایلو سره اشنا شوي یاست:

مثال: د ثریا، ظاهر او نفیسې د عمر مجموعه 60 ده، د نفیسې د عمر له درې چنده څخه د ظاهر د عمر دوچنده منفي کوو، د ثریا عمر حاصلېږي. د هغو هر یو څو کلن دی، د مسألې د حل لپاره د ثریا عمر په C، د ظاهر عمرپه Z او د نفیسې عمر په N شیو؛ نو کولی شو ولیکو:

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$\left.\begin{array}{l} Z+N+C=60 \\ 2Z+N+3C=120 \\ -2Z+3N=C \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} Z+n+C=60 \\ 2Z+N+3C=120 \\ -2Z+3N-C+0 \end{array}\right\}$$

په پورته مثال کې لیدل کېږي، چې له ضرایبو سره درې معادلې او درې مجهوله شته، په همدې ترتیب که n مجهول او m معادله په لاندې ترتیب ولرو.

$$a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3+.....+a_{1n}x_n=b_1$$
$$a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3+.....a_{2n}x_n=b_2$$
$$a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+a_{m3}x_3+.....+a_{mn}x_n=b_m$$

په دې توګه ویلی شو، چې د n مجهوله ورکړل شویو خطي معادلو m سیستم، چې $x_1,x_2,....,x_n$ مجهولونه او $a_{11},a_{12},...a_{1n},...a_{mn}$ د سیستم ضریبونه $b_1,b_2,b_3,...b_m$ ثابت اعداد په سیستم کې ورکړل شوي دي.

که د ذکر شوو معادلو سیستم د حل لرونکی وي، د ساز ګار سیستم په نوم او که سیستم د حل لرونکی نه وي، د ناسازګار سیستم په نوم یادېږي.

د خطي معادلو د سیستم د حل نه موخه په اول قدم کې د سیستم سازګارېدل او یا نا ساز ګارېدل دي. که چېرې سیستم سازګار وي، باید هغه حل کړو. د خطي معادلو د سیستم په تیوري کې وړاندې شول، چې د هغې په واسطه د خطي معادلو هر سیستم حل کولای شو.

د خطي معادلو د سیستمونو معادل کېدل او په سیستم کې لومړنی بدلون

که د خطي معادلو یو یا څو سیستمونه ورکړل شوي وي، چې په عین مجهولونو د مساوي حل لرونکي وي، له یو بل سره معادل دي او یا په بل عبارت که یو یا دوه سیستمونه د خطي معادلو له یو بل سره معادل وي، د هغوې حل یوله بل سره مساوي دی.

مثال: د خطي معادلو سیستمونه یو له بل سره معادل دي، ځکه چې:

حل:

$$\begin{cases} 2x-y=-3 \\ x+2y=6 \end{cases} \wedge \begin{cases} x+y=3 \\ -2x-y=-3 \end{cases}$$

یواځینی $(x,y)=(0,3)$ دی

مثال: د خطي معادلو سیستمونه یو له بل سره معادل دي.

$$\begin{cases} x+y=2 \\ -x-y=-3 \end{cases} \wedge \begin{cases} 2x+y=4 \\ -2x-y=-3 \end{cases}$$

دا ځکه چې دواړه سیستمونه ناسازګار دي، یعنې د هغې د حل سیټ خالي دی.

(c) ketabton.com: The Digital Library

په خطي معادلو کې لومړني بدلونونه

۱- په ورکړل شوي سيستم کې د دوو معادلو د محل تعويض کول

۲- يوه له معادلو څخه په يوه حقيقي د صفر خلاف عدد کې ضربول

٤- د معادلو له سيستم يو څخه د سيستم له بلې معادلې سره جمع کول، چې په حقيقي عدد کې ضرب شوی وي.

۵- له سيستم څخه د معادلې ګرځېدنه، چې مطابقت جوړوي.

د اجرا کولو په نتيجه کې هر يو له لومړنيو بدلونونو څخه د ورکړ شوو خطي معادلو په سيستم کې د نوو خطي معادلو سيستم حاصلېږي، چې له لومړني سيستم سره معادل دی.

د مجهولونو د تدريجي حذف کولو په طريقه د خطي معادلو د سيستم حل د Gauss ميتود

يو له تر ټولو اسانه ميتودونو څخه د حقيقي عددونو له ضريبونو سره د خطي معادلو د سيستم حل د Gauss له ميتود څخه عبارت دی، يعني د مجهولونو د تدريجي حذف کولو طريقه ده.

که د لومړنيو بدلونونو په جريان کې د خطي معادلو په سيستم کې معادله لاندې شکل ونيسي، هغه له سيستمه ليرې کوو.

$$ox_1 + ox_2 + ox_3 + \ldots\ldots + ox_n = o \ldots . I$$

که د خطي معادلو په سيستم کې د بدلون په جريان کې معادله لاندې شکل ولري، ورکړ شوی سيستم ناسازګار دی، يعنې حقيقت نه لري.

$$ox_1 + ox_2 + ox_3 + \ldots\ldots + ox_n = b = b \neq o$$

اوس دلته د ګاوس ميتود تر مطالعې لاندې نيسو. فرض کوو، چې د ورکړل شويو خطي معادلو په سيستم کې پورته 1 او 2 شکل وجود نه لري.

$$a_1 x_1 + a_1 x_2 + \ldots . + a_{1n} x_n = b_1$$
$$a_2 x_1 + a_2 x_2 + \ldots . . + a_{2n} x_n = b_2$$

$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \ldots . . + a_m x_n = b_m$$

د پورته سيستم اوله معادله د اول حد په ضريب تقسيموو.

$$x_1 + \frac{a_{12} x_2}{a_{11}} + \ldots . + \frac{a_{1n} x_n}{a_{11}} = b_1$$
$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \ldots . . + a_{2n} x_n = b_2$$

$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \ldots . . + a_{mn} x_n = b_m$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

اوس لومړۍ معادله په $a_{31}-$ کې ضربوو او له دويمې معادلې سره يې جمع کوو، وروسته د درېيمې معادلې د اول حد ضريب، يعنې $a_{31}-$ په اوله معادله کې ضربوو او له درېيمې معادلې سره يې جمع کوو، په همدې طريقه تر اخره د اولې معادلې ضريب په $a_{m1}-$ کې ضربوو او له اخرې معادلې سره يې جمع کوو او دې ته ورته طريقې ته تر هغې دوام ورکوو، چې سيستم لاندې شکل خپل کړي.

$$x_1 + c_{12}x_2 + ... + c_{1n}x_n = d_1$$
$$0 + c_{22}x_2 + ... + c_{2n}x_n = d_2$$
$$0 + 0 + ... + c_{3n}x_n = d_3$$
$$0 + 0 + 0 + ... + c_{mn}x_n = d_m$$

پورته عمليات ليدل کېږي، چې تر اصلي قطر لاندې ټول حدونه صفر شوي، بناً له اخرې معادلې څخه $x_n = \frac{d_n}{c_{nn}}$ حاصلېږي، دا قيمت په (n-1) ام معادله کې وضع کوو، د x_{n-1} مجهول قيمت حاصلېږي، په همدې ترتيب د $x_1, x_2, ..., x_n$ مجهولونو قيمتونه لاسته راځي.

مثال: لاندې سيستم د ګاوس له ميتود نه په ګټه اخيستو حل کړئ!

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1$$
$$x_2 - x_3 = 2$$
$$2x_1 - x_2 + x_3 = -3$$

حل

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & -7 & -5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -12 & 5 \end{pmatrix}$$

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1$$

$$0 + x_2 + x_3 = 2 \Rightarrow -12x_3 = 5 \to x_3 = -\frac{5}{12}$$

$$0 + 0 - 12x_3 = 5$$

$$x_2 + \frac{5}{12} = +2 \to x_2 = 2 - \frac{5}{12} = \frac{19}{12}$$

$$x_1 + 2\left(\frac{19}{12}\right) + 4\left(\frac{-5}{12}\right) = 1 \to x_1 = -\frac{1}{2}$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

نو د حل سيټ يې عبارت دی له:

$$A=\{x_1,x_2,x_3\}=\left\{\frac{1}{2},\frac{19}{12},\frac{-5}{12}\right\}$$

د مترکسونو ډولونه Tupes of Matrix

۱- سطري مترکس: هغه مترکس، چې یواځې یو سطر لري.

$$[2],[2\quad 1],[1\quad 0\quad -3]$$

۲- **ستوني مترکس:** هغه مترکس، چې د یوه ستون لرونکی وي.

$$\begin{bmatrix}2\\-4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix}$$

۳- مربعي مترکس: هغه مترکس چې د سطرونو شمېر یې د ستون له شمېر سره مساوي وي.

$$A=\begin{bmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{bmatrix}$$

٤- مستطيلي مترکس: هغه مترکس چې د سطرونو شمېر یې د ستونونو له شمېر سره مساوي نه وي.

$$A=\begin{bmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\end{bmatrix}$$

٥- صفري مترکس: هغه مترکس چې ټول عناصر یې صفر وي.

$$\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

٦- مساوي مترکسونه: هغه مترکسونه چې د هغې د سطر اوستونو ټاکلي عناصر تر الجبري عملیاتو وروسته مساوي شي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$A=\begin{bmatrix}3 & 4\\ 2 & 5\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}3 & 2+2\\ 3-1 & 2+3\end{bmatrix}\Rightarrow A=B$$

د دويم او درېيم ترتيب ديترمينانتونه

په تېرو بحثونو کې مو د خطي معادلو د سيستم د حل تيوري مطالعه کړه. البته ذکر شوی ميتود پيچلی نه دی، ولې د اجراکولو تقاضا يې يو رنګه عملیې ورکوي، چې د هغې د الګورتيم تهيه د کمپيوټري ماشين د پروګرام لپاره امکان لري. ولې يو عمومي فورمول د خطي معادلو د ټولو سيستمونو د حل لپاره نه شو طرحه کولای. معلومه ده چې د عمومي فورمولونو طرح کول د خطي معادلو د ضريبونو او ثابتو پواسطه په بله طريقه امکان لري. د بحث دا طريقه د ديترمينانت د تيوری پر بنسټ ولاړه ده.

مخکې له دې چې د ديترمينانتونو عمومي تيوري مطالعه کړو، لومړی د دوه مجهوله او درې مجهوله خطي معادلو په ځانګړو سيستمونو خبرې کوو.

$$\begin{bmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2\end{bmatrix}.....I$$

پورته سيستم د ګاوس په ميتود حلوو، که $a_{11}\neq 0$ وي؛ نو د 1سيستم له لاندې سيستم سره معادل دی.

$$\begin{bmatrix}x_1+\dfrac{a_{12}}{a_{11}}x_2=\dfrac{b_1}{a_{11}}\\ \left(a_{22}-\dfrac{a_{12}}{a_{11}}\right)x_2=b_2-\dfrac{b_1a_{21}}{a_{11}}\end{bmatrix}$$

البته که چېرې $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$ وي، د اصلي مترکس پواسطه ۱ سيستم وړاندې کولی شو.

واقعاً ليدل کېږي، چې $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ افاده د مترکس د فرعي او اصلي قطر د حاصل ضرب له حاصل تفريق څخه عبارت دی.

تعريف: $D=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$ د مترکس د ديترمينانت په نامه يا د دويم ترتيب د

(c) ketabton.com: The Digital Library

دیترمینانت په نامه یادوو . ذکر شوی دیترمینانت په لاندې ډول ښودلی شو.

$$D=\begin{pmatrix} a_{11}a_{12} \\ a_{21}a_{22} \end{pmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$$

هغه عددونه، چې د فورمول د کسرونو په صورت کې قرار لري، هم د دوو د ترتیب دیترمینانتونه دي، یعنې د x_1 فورمول لپاره لرو.

$$D=\begin{pmatrix} b_1a_{12} \\ b_2a_{22} \end{pmatrix}=b_1a_{22}-b_2a_{21}$$

لیدل کېږي، چې د هغه عدد پیدا کول، چې د کسر په صورت کې د x_1 د ټاکلو لپاره قرار لري، د مترکس له دیترمینانت څخه عبارت دی، چې د اول ستون د تعویض په نتیجه کې د ثابتونو سیستم په وکتور ورکړل شوی، یعنې $\vec{b}=(b_1,b_2)$ حاصل شوی همدارنګه د x_2 لپاره لرو چې:

$$D_2=\begin{pmatrix} a_{11}b_1 \\ a_{21}b_2 \end{pmatrix}=a_{11}b_2-a_{12}b_1$$

D2 د مترکس له دیترمینانت څخه عبارت دی، چې د دویم ستون د تعویض په نتیجه کې په $\vec{b}=(b_1,b_2)$ وکتور دی، په حاصل شوي مترکس کې لاندې قضیه په دې ترتیب ثبوتوو.

قضیه: که د دوه مجهوله خطي معادلو د سیستم د اصلي مترکس د یترمینانت د صفر خلاف وي؛ نو د ورکړل شوي سیستم حل د لاندې فورمول په واسطه وړاندې کولی شو.

$$x_1=\frac{D_1}{D}\wedge x_2=\frac{D_2}{D}$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال: د لاندې خطي معادلو سيستم حل کړئ!

$$3x_1 + 4x_2 = -9$$
$$5x_1 + 7x_2 = -17$$

حل:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 21 - 20 = 1$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} -9 & 4 \\ -17 & 7 \end{vmatrix} = 63 + 68 = 5$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 3 & -9 \\ 5 & -17 \end{vmatrix} = -51 + 45 = -6$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{5}{1} = 5 \qquad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-6}{1} = -6$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د توابعو لمټ او مشتقات

ټولیزه موخه

په عالي ریاضیاتو او اقتصادي موضوعاتو کې د لمټ له کارونې سره بلدتیا

د زده کړې موخې: ددې څپرکي په پای کې محصلین لاندې موضوعات زده کولای شي:

- د مجاورت مفهوم، د تابع لمټ او د مستقل متحول لمټ.
- له مبهمو اشکالو نه خبرېدنه، په لمټ کې د هغې مفهوم پیژندل او د مبهمو شکلونو رفع.
- له عالي ریاضیاتو سره د توابعو د لمټ د ارتباط په اړه معلومات.

د یوې تابع لمټ

څرنګه چې د مستقل متحول او تابع له مفهوم سره پوره بلدتیا لرو، اوس که په یوه رابطه کې x مستقل متحول او y د هغې تابع قبول کړو، که چېرې x تحول وکړي، Yهم تحول کوي، په دې تحولاتو کې کله داسې راځي، چې د تابع څرنګوالی د مستقل متحول قیمت ته په نږدې مجاورت کې مطالعه کېږي، کله چې دا قیمت a وي او x تحول تر کومه چې ممکن وي a ته نږدې کوو.

$x \to a$

په دې ځای کې لازم دي لومړی د یوې تابع د لمټ د مفهوم په اړه بحث د لمټ تعریف ته پرېږدو. که $y = f(x)$ په نظر کې ونیسو، هغه وخت چې x ټاکلی عدد a ته تقرب کوي، y د b خواته تقرب کوي، چې دې قیمت ته د تابع لمټ ویل کېږي. البته کله داسې هم پېښېږي، چې تابع لمټ نه لري. ځکه د تابع او د متحول په تحولاتو او ماهیت پورې اړه لري.

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال: $y = 3x + 5$ تابع په نظر کې نیسو، کله چې د x متحول 2 ته ډېر نږدې قیمتونه اختیار کړي، یعنې د 2 طرف نږدې شي، یعنې $x \approx 2$ او $y \approx 11$ دا حقیقت لاندې جدول ته په کتو درک کولای شو.

X	1.5	1.9	1.95	1.99	2	2.09	2.1
Y=3x+5	10.4	10.7	10.9	10.97	11	11.27	11.3

په $y = 3x + 5$ کې که چېرې x 2 قیمت واخلي، تابع مساوي په 11 کېږي، مګر په یو شمېر توابعو کې کله چې مستقل متحول د یوه ثابت عدد خواته تقرب کوي، د تابع قیمت ناټاکلی (نامعین) کېږي.

څرنګه چې په $y = 3x + 5$ تابع کې $(x \to 2)$ د تابع قیمت $(x \to 11)$ کېږي.

کولای شو ووایو، چې د یادې تابع لمټ هغه وخت، چې x د 2 طرف ته تقرب کوي په طرف د 11 تقرب کوي. د افادې دا طرز په سمبولیکه بڼه لیکلی شو.

$$Limit(3x+5) = 11$$
$$x \to 2$$
$$\lim(3x+5) = 11$$
$$x \to n$$

مثال:

$$\lim_{x \to 2} = \frac{2x}{x+1} = \frac{2(-2)}{-2+1} = \frac{-4}{-1} = 4$$

مبهم شکلونه (ناټاکلي)

ډېر کله له داسې توابعو سره مخامخ کېږو، چې د متحول په ځینو قیمتونو غیر متمادي دي یا کاملاً ځان ته ناټاکلی شکل اختیاروي، لکه:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty, -\infty, 1^{\infty}, \infty^{0}, 0^{\infty}, 0 \cdot \infty$$

له لمټ نه په ګټه اخیستو کولای شو د پورته شکلونو لپاره د حد قیمت پیدا کړو. له پورته شکلونو څخه هر یو د ابهامو په خاصه شیوه رفع کېږي.

۱- **د $\frac{0}{0}$ مبهم شکل رفع:** که د $\frac{f(x)}{2(x)}$ تابع نسبت د a په قیمت $\frac{0}{0}$ ناټاکلی شکل اختیاروي، یعنې.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$\lim_{x\to a} f(x) = 0$$
$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$$
$$\lim_{x\to a} g(x) = 0$$

د ابهامو د رفعې لپاره تابع تر ټولو اسانه شکل ته راوړو. له دې ځایه چې د x=a په قیمت صورت او مخرج صفر کېږي؛ نو صورت او مخرج د مشترک فکتور لرونکی دی، چې اختصار کېدای شي او د تابع د حد قیمت پیداکېږي.

مثال:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{x^2-1} = ?$$

حل: ځرنګه چې د x=1 په قیمت $\frac{0}{0}$ شکل اختیاروي؛ نو د هغې د حد قیمت پیداکوو.

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{x^2-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)}{(x-1)(x+1)} = Lim \frac{1}{x+1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

د ابهامو رفع $\frac{\infty}{\infty}$

که چېرې توابع د نسبت $\frac{f(x)}{g(x)}$ شکل ولري، داسې چې.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{F(x)}{g(x)},$$
$$\lim_{x\to a} g(x) = \infty$$
$$\lim_{x\to a} \mathrm{F(x)} = \infty$$

په دې حالت کې د ابهامو د رفع لپاره صورت او مخرج په هغه متحول تقسیموو، چې تر ټولو لوړ توان لرونکی وي. البته په درو حالتونو کې مطالعه کېږي:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{ax^3 = bx^2 + c}{ax^2 + bx + c} = ?$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{ax^3/x^3 + bx^2/x^3 + c/x^3}{ax^2/x^3 + bx/x^3 + c/x^3} = \lim_{x\to\infty} \frac{a + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x^3}}{\frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x^3}} = \frac{a}{0} = \infty$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{ax^2 + bx}{ax^3 + bx} = ?$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{ax^2}{x^3} + \frac{bx}{x^3}}{\frac{ax^3}{x^3} + \frac{bx}{x^3}} = Lim \frac{\frac{a}{x} + \frac{b}{x^2}}{a + \frac{b}{x^2}} = \frac{0}{a} = 0$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$\lim_{x\to\infty}\frac{ax^2+bx}{ax^2+bx}=?$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{ax^2+bx}{ax^2+bx}=Lim\frac{\frac{ax^2}{x^2}+\frac{bx}{x^2}}{\frac{ax^2}{x^2}+\frac{bx}{x^2}}=Lim\frac{a+\frac{b}{x}}{a+\frac{b}{x}}=\frac{a}{a}=1$$

$(\infty-\infty)$ د ابهامو رفع

کله چې $g(x),f(x)$ دوه تابع وي، داسې چې:

$$\lim_{x\to\infty}g(x)=\infty$$

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$$

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-g(x)]=\infty-\infty$$

په دې حالت کې هغه په $\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}$ دې شکلونو راوړو، وروسته د ابهامو په رفع اقدام کوو:

مثال:

$$\lim_{x\to1}\left(\frac{9}{x-1}-\frac{8x+10}{x^2-1}\right)$$

حل:

$$\lim_{x\to1}\left(\frac{9}{x-1}-\frac{8x+10}{x^2-1}\right)=\lim_{x\to1}\frac{9(x+1)-8x-1}{x^2-1}=\lim_{x\to1}\frac{(9x+9-8x-10)}{x^2-1}$$

$$\lim_{x\to0}\frac{x-1}{x^2-1}=Lim\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د تابع تزاید او مشتقات

ټولیزه موخه

په اقتصادي او تخنیکي مسایلو کې د مشتق د کارونې په موخه د هغو توضیح.

د زده کړې موخې: ددې څپرکي په پای کې محصلین لاندې موضوعات زده کولای شي:

- د مستقل متحول په تزاید، د تابع په تزاید پوهېدل او د هغوی تر منځ رابطه.
- د الجبري او هندسي مشتق تعریف او د هغه د مفهوم درک.
- د مشتق د قضیو نه په ګټه اخیستو د الجبري او مثلثاتي توابعو د مشتق تطبیق.
- په اقتصاد، صنعت او نورو کې له مشتق نه ګټه اخیستل.
- د مشتق په مرسته د توابعو د پېچلو لمټونو پیدا کول.
- تعریف او د قسمي مشتقاتو پیدا کول.

د تابع تزاید او مشتقات

کله چې $y = F(x)$ تابع په نظر کې ونیسو، که x متحول د Δx په اندازه زیات شي د y تابع هم د Δy په اندازه زیاتوالی کوي، چې کولای شو دا زیاتوالی داسې پیدا کړو.

$$y = F(x)$$
$$y + \Delta y = F(x + \Delta x)$$
$$\Delta y = F(x + \Delta x) - y$$
$$\Delta y = F(x + \Delta x) - F(x)$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال: د $y = 3x^2$ تابع زیاتوالی پیدا کړئ!

$$y + \Delta y = 3(x + \Delta x)^2$$
$$\Delta y = 3(x + \Delta x)^2 - y$$
$$\Delta y = 3(x + \Delta x)^2 - 3x^2$$
$$\Delta y = 3\left(x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2\right) - 3x^2$$
$$\Delta y = 3x^2 + 6x\Delta x + 3\Delta x^2 - 3x^2$$
$$\Delta y = 6x\Delta x + 3\Delta x^2$$

مثال: د لاندې تابع تزاید پیدا کړئ!

$$y = 6 + x$$
$$y + \Delta y = 6 + x + \Delta x$$
$$\Delta y = 6 + x + \Delta x - y$$
$$\Delta y = 6 + x + \Delta x - 6 - x$$
$$\Delta y = \Delta x$$
$$y = 7$$
$$y + \Delta y = 7$$
$$\Delta y = 7 - y$$
$$\Delta y = 7 - 7$$
$$\Delta y = 0$$

تمرین:

۱- په $y = 2x + 5$ تابع کې به د x قیمت څو وي، که چېرې $\Delta x = 0.007, x_o = 4$ وي.

۲- د $y = 3x^2 - 5x + 4$ تابع تزاید پیدا کړئ!

۳- په $y = \frac{1}{x}$ تابع کې د Δy قیمت پیدا کړئ، که چېرې $\Delta x = 0, x_0 = 9$ وي؟

٤- په $y = x^2$ تابع کې د Δy او Δx تزاید پیدا کړئ!

(c) ketabton.com: The Digital Library

مشتقات

د مشتق الجبري تحليل او د هغه تعريف

فرض کوو چې $y=f(x)$ تابع د (a,b) په څېر فاصله کې یوه متمادي تابع ده، که x_o د متحول لومړنی قیمت x او x_1 بل قیمت، چې x_o ته ډېر نږدې دی، یعنې $x_1=x_o+x$ وي، په دې حالت کې به د پورته تابع قیمت y_1,y_o وي.

څنګه چې $y_1=y_o+y$ دی، په دې ځای کې به $\Delta y=y_1-y_o,\Delta x=x_1-x_o$ وي. کولی شو $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ نسبت یې تشکیل کړو. هغه وخت چې $\Delta x\to 0$ وي، په دې حالت کې $\Delta y\to 0$ کوي، بنا $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ نسبت د $\frac{0}{0}$ په طرف ځي، چې دا یو مبهم حالت دی او کولی شو د تابع د حد قیمت محاسبه کړو او د ابهامو رفع وکړو، په نتیجه کې کولی شو مشتق دارنګه تعریف کړو:

لمټ د تابع تزاید د متحول پر تزاید هغه وخت، چې د متحول تزاید د صفر طرف ته تقرب کوي، عبارت د تابع له مشتق څخه دی، چې هغه درانګه لیکل کېږي.

$$y=f(x)$$
$$y+\Delta y=f(x+\Delta x)$$
$$\Delta y=f(x+\Delta x)-F(x)$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$
$$Lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=Lim\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$\bar{y}=Lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

د تابع مشتق نظر x ته عموماً په $y'=f(x),\frac{\Delta y}{\Delta x}$ یا y'_x شودل کېږي.

مثال: د $y=2x-3$ تابع په نظر کې نیول شوی، په الجبري تحلیل د هغې مشتق پیدا کړئ!

$$y=2x-3$$
$$y+\Delta y=2(x+\Delta x)-3$$
$$\Delta y=2x+2\Delta x-3-2x+3$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{2\Delta x}{\Delta x}\to \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=2$$
$$y=2$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د مشتق هندسي تحليل

فرضاً د $y = f(x)$ تابع د (a,b) په انتروال کې متمادي ده. د دې تابع د منحني د پاسه دوه نقطې $P_o(x_o,y_o)$ او $P_o(x_1,y_1)$ په نظر کې نیسو، د L قاطع چې له P_o او P نقطې تېرېږي د x محور له مثبت جهت سره ∞ زاویه جوړوي.

که د P نقطه P_o ته بې نهایت نږدې شي، د L قاطع په یوه حدي حالت کې د P_o په نقطه کې د ذکر شوې تابع په منحني باندې مماس وي. د پورته شکل له قراره د L قاطع د L په حالت کې راځي، چې د x محور له مثبت جهت سره زاویه تشکیلوي.



$$Tan\alpha = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_o} = m = L$$

$$Tan\alpha = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_o} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = m = L$$

په حدي حالت کې یعنې په هغه وخت کې، چې P د P_o طرف ته تقرب کوي د α زاویه عوض کېږي.

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = Tag\theta = L = m$$

نو نتیجه اخلو، چې د تابع د منحني په یوه نقطه کې د مماس میل د منحني په هغه نقطه کې د تابع د مشتق له قیمت څخه عبارت دی.

(c) ketabton.com: The Digital Library

د الجبري توابعو مشتقات

قضيه: د ثابتې تابع مشتق $y = C$ صفر دی.

ثبوت: پوهېږو چې:

$$y + \Delta y = C$$
$$\Delta y = C - y \rightarrow \Delta y = C - C$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C - C}{\Delta x} \rightarrow \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$$

مثال:

$$1 - y = 7 \Rightarrow y = 0$$
$$2 - y = Log25 \Rightarrow y = 0$$
$$3 - y = Sin30^{\circ} \Rightarrow y = 0$$

۲ قضيه: په طاقت لرونکې افاده کې مشتق مساوي دی په:

$$y = ax^n \Rightarrow y = anx^{n-1}$$
$$y + \Delta y = a(x + \Delta x)^n$$
$$\Delta y = a(x + \Delta x)^n - ax^n = a\left[(x + \Delta x)^n - x^n\right]$$
$$\Delta y = a\left[(x + \Delta x - x)(x + \Delta x)^{n-1} + (x + \Delta x)^{n-2}\right]x + ... + x^{n-1}$$
$$\Delta y = a\left[\Delta x(x + \Delta x)^{n-1} + (x + \Delta x)^{n-2}x + ... + ^{n-1} +\right]$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = a\left[(x + \Delta x)^{n-1}x + (x + \Delta x)^{n-2}x + ... + ^{n-1} +\right]$$
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = a \lim_{\Delta x \to 0}\left[(x + \Delta x)^{n-1} + (x + \Delta x)^{n-2}x + ... + x^{n-1}\right]$$

$$y = a(xn - 1 + xn - 1 + ... + xn - 1)$$
$$y = anx^{n-1}$$

N ځلې x^{n-1} جمع کېږي، پورته قضيه د منفي، کسري طاقتونو لپاره هم سمه ده.

د مرکبو توابعو مشتق يا د تابع د تابع مشتق

الجبري قاعده Chain Rule

که y د u تابع او u د x تابع وي، په دې صورت کې y د x تابع تابع ده.

يعنې که $y = f(u)$ او $u = g(x)$ وي؛ نو د $(fog)_x = f(g(x))$ هغې مشتق:

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$(fog)_x = f(g(x))\cdot g(x)$$
$$\Delta y = \Delta y$$
$$\Delta y\cdot\Delta u = \Delta y\cdot\Delta u \Rightarrow \Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\Delta u$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}$$
$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x} \Rightarrow \begin{bmatrix} y = y_a\cdot u_x \\ y = f(u)\cdot u(x)\end{bmatrix}$$

که څو متغيره يو د بل تابع وي، مثلاً $y = F(u)$ او u د V تابع او V د W تابع او Wد X تابع وي، په دې صورت کې کېدای شي ولرو:

$$y_x = y_u\cdot u_v\cdot V_w\cdot W_x$$

مثال: د $F(x)=(x^3+3x)^5$ تابع مشتق پيدا کړئ!

حل: کله چې $x^3+3x = g(x)$ وټاکل شي، نو بيا $F(x)=F(g(x))$

$$(fog)x = F(g(x))$$
$$f(x)=F(g(x))\cdot g(x)$$
$$f(x)=5(x^3+3x)(3x^2+3)$$
$$y=\left(\frac{2x^2-6x+3}{x-1}\right)^7$$

د مثلثاتي توابع مشتقات

قضيه: د $y = Sinx$ مشتق عبارت دی له $y=\cos x$ څخه.

ثبوت:

$$y+\Delta y = Sin(x+\Delta x)$$
$$\Delta y = Sin(x+\Delta x)-Sinx$$

د مثلثاتي فورمولونو په اساس

$$SinA-SinB = 2Cos\frac{A+B}{2}\cdot Sin\frac{A-B}{2}$$
$$\Delta y = 2Cos\frac{x+\Delta x+x}{2}\cdot Sin\frac{x+\Delta x-x}{2}$$
$$\Delta y = 2Cos\frac{2x+\Delta x}{2}\cdot Sin\frac{\Delta x}{2}$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = Cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\frac{Sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}}$$

$$\Delta y = L(x+\Delta x)-Lx$$
$$\Delta y = L\left(\frac{x+\Delta x}{x}\right)$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x}L\left(\frac{x+\Delta x}{x}\right)$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د لوړو مرتبو مشتقونه

که f متمادي تابع او مشتق منونکې وي، کولای شو لومړی، دویم، درېیم او n ام مشتق یې پیدا کړو. په داسې حال کې، چې د تابع درجه n وي، (n+1) یې صفر دی.

لاندې رابطې د مشتقاتو د مراتبو ښودونکې دي.

$$\frac{dy}{dx}=f(x),\frac{d^2y}{dx^2}=f(x),\frac{d^3y}{dx^3}=f(x)....\frac{d^ny}{dx^n}=f(x)$$

مثال: د $y=5x^3-2x^2+Log5$ تابع درېیم او څلورم مشتق پیداکړئ!

$$f(x)=\frac{dy}{dx}=45x^2-4x+0$$

$$f(x)=\frac{d^2y}{dx^2}=90x-4$$

$$f(x)=\frac{d^3y}{dx^3}=90, f(x)=\frac{d^4y}{dx^4}=0$$

د لوګارتمي تابع مشتقات

د $y=Lx$ لوګارتمي تابع په نظر کې نیسو، نظر تزاید ته لرو.

$$y+\Delta y=L(x+\Delta x)$$

د لوګارتم د قاعدو څخه په ګټه اخیستو لیکلای شو.

$$\Delta y=L(x+\Delta x)-Lx$$

$$\Delta y=L\left(\frac{x+\Delta x}{x}\right)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{\Delta x}L\left(\frac{x+\Delta x}{x}\right)$$

که Δx صفر شي، پورته رابطه د $\frac{0}{0}$ مبهم شکل اختیاروي، د ابهام د رفع کولو لپاره فرض کوو، چې $\frac{\Delta x}{x}=a$ نو $\Delta x=ax$.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{ax}\cdot L(1+a)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{x}\cdot L(1+a)^{1/a}$$

د لوګارتم د قاعدو په اساس لیکلای شو.

کله چې Δx صفر ته تقرب وکړي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{x}\lim(1+a)^{1/a}$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{x}Le=\frac{1}{x}$$

$$y=\frac{1}{x}$$

که د لوګارتم قاعده پرته له e کوم بل عدد وي، لکه a، په دې صورت کې لرو چې:

$$y=Log_a x\Rightarrow$$
$$y=\frac{1}{x}Log_a e=\frac{1}{x}\cdot\frac{Log_a e}{Log_e a}$$
$$y=\frac{1}{x\cdot La}$$

هرکله $y=Logu$ وي او u د x تابع وي؛ نو لرو چې:

$$y=Logu=Lu$$
$$\bar{y}=\frac{\bar{u}}{u}$$

مثال: د لاندې تابع څخه نظر x ته مشتق ونیسئ!

$$y=Log_a x+Log_x a$$

حل: کولای شو د قاعدو د تبدیلې پر اساس ولیکو.

$$y=Log_a x+\frac{1}{Log_x a}$$
$$y'=\frac{1}{xLa}+\frac{1}{x\cdot La(Log_a x)^L}$$

مثال: $f'(x)=?, f(x)=L(x^2+1)$

حل:

$$u=x^2+1\Rightarrow f(x)=Lu$$
$$u'=2x$$
$$\bar{y}=\frac{\bar{u}}{u}Le$$
$$f'_{(x)}=\frac{2x}{x^2+1}$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د الجبري توابعو د مشتقاتو جدول

تابع (y)	مشتق $(\overline{y})$
$y = a$	$y' = 0$
$y = u$	$y' = u'$
$y = au$	$y' = u'$
$y = u + v + w$	$y' = u' + v' + w'$
$y = u \cdot v$	$y' = u'v + v'u$
$y = \frac{u}{v}$	$y' = \frac{u'v + v'u}{v'}$
$y = au^n$	$y' = nau^{n-1}$
$y = a^u$	$y' = e^u$
$y = e^u$	$y' = \frac{u'}{}$
$y = Lu$	
$y = Log_a u$	$y' = \frac{\overline{u'}}{uLa}$
$y = \sqrt[n]{u}$	$y' = \frac{\overline{u'}}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$
$y = f(x)$	$x = \frac{1}{=}$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د مثلثاتي توابعو د مشتقاتو جدول

تابع (y)	مشتق $(\overline{y})$
$y = Sinu$	$y' = u'Cosu$
$y = Cosu$	$y' = -u'Sinu$
$y = Logu$	$y' = \overline{u}\left(1 + Tag^2 u\right)$
$y = Cotagu$	$y' = -\overline{u}\left(1 + Cotg^2 u\right)$
$y = Secou$	$y' = Secou \cdot \overline{u}tagu$
$y = ArcSinu$	$\overline{y'} = -Cu\sec u \cdot \overline{u}Cotgu$
$y = ArcCosu$	$y' = \pm\dfrac{\overline{u}}{\sqrt{1-u^2}}$
$y = Arctagu$	$y' = -\dfrac{\pm\overline{u}}{\sqrt{1-u^2}}$
$y = ArcCotgu$	$y' = \dfrac{\overline{u}}{1+u^2}$
$y = ArcSecou$	$y' = -\dfrac{\overline{u}}{1+u^2}$
$y = Arc\cos ecu$	$y' = \dfrac{\overline{u}}{u\cdot\sqrt{u^2-1}} = -\dfrac{u'}{u\cdot\sqrt{u^2-1}}$

(c) ketabton.com: The Digital Library

په اقتصادي مسایلو کې د مشتقاتو کارونه

په عام ډول مشتق او د مشتق اخیستل په ځینو اقتصادي بحثونو کې، چې په مقداري ډول تر ارزونې لاندې نیول کېږي، فوق العاده اهمیت لري. په دې ترتیب چې د ګټې د مینیمم او مکزیمم کولو او همدارنګه د مکزیمم او مینیمم د شرایطو ټاکل د ګټې او موخې په مقصد او همدارنګه د ناچاري له مخې د ټولو مقادیرو د محاسبې لپاره د مشتق څخه ګټه اخلو.

دلته په لنډ ډول د مشتق محدوده کارونه په اقتصادي مسایلو کې په کار وړو. پوهېږو چې د یوې تولیدي موسسې ګټه عبارت ده د ټولو لاسته راغلو او ټول مصرف ترمنځ له توپیر څخه؛ نو په دې اساس که د ټولو لاسته راغلو او ټول مصرف توابعو په ترتیب سره په لاندې ډول وښیو.

د ټول عاید تابع $TR = R(Q)$

د ټول لګښت تابع $TC = C(Q)$

که تابع شي، عبارت ده له:

$$TT = TR - TC$$
$$TT = R(Q) - C(Q)$$

اوس که د مکزیمم کولو مقصد ګټه وي؛ نو مقادیر باید له محصول څخه تولید کړي؛ څو ګټه حد اکثر ته ورسېږي. د ګټې لوړ حد ته د رسولو لپاره لازمي شرط دا دی، چې د ګټې تابع نسبت د مقدار محصول (Q) ته مشتق ونیول شي، وروسته دا مساوي له صفر سره شي؛ څو د Q مقدار چې د ګټې کچه حد اکثر یا حد اقل ته رسوي، لاس ته راشي.

کله چې د Q مقدار مشخص شي، باید تحقیق وکړو، چې آیا د Q لاسته راغلي مقدار ګټه مکزیمم ته رسوي که مینیمم ته. د دې کار د سرته رسولو په خاطر باید د Q مقدار مشتق د دویمې مرتبې تابع ګټه فرض شي. که د دویمې مرتبې مشتق د Q قیمت ته منفي شو، په دې وخت کې به د Q مقدار ګټه مکزیمم ته ورسوي او که برعکس د دویمې مرتبې مشتق علامه منحني شي، په دې وخت کې به د Q مقدار ګټه کم حد ته ورسوي.

د مطلب د وضاحت په خاطر لاندې مثال په نظر کې نیسو.

مثال: د یوې تولیدي موسسې د ټول عاید او لګښت توابع په لاندې ډول راغلې دي:

$$R(Q) = 1000G - 2Q^2$$
$$C(Q) = Q^3 - 59Q^2 + 1315Q + 2000$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د محصول هغه مقادیر، چې ګټه لوی ته رسوي مشخصه کړئ!

حل: پورته توابعو ته په کتو د ګټې تابع تشکیلوو:

$$\pi = RQ - C(Q)$$
$$\pi = -Q^3 + 57Q^2 - 315Q - 2000$$

او د ګټې د ماکزیمم او منیمم معلومولو لپاره لازمي شرط عبارت دی له:

$$\frac{d\pi}{dQ} = -3Q^2 + 114Q - 315 = 0$$
$$Q_1 = 3$$
$$Q_2 = 35$$

اوس باید تحقیق وکړو، چې کوم یو د محصول Q_1 او Q_2 څخه ګټه مکزیمم ته رسوي، چې د دې کار لپاره باید د ګټې د دویمې مرتبې مشتق تشکیل کړو.

$$\frac{d^2\pi}{dQ^2} = -6Q + 144$$

$$Q_1 = 3 \Rightarrow \frac{d^2\pi}{dQ^2} = -6Q + 144 > 0$$

$$Q_2 = 35 \Rightarrow \frac{d^2\pi}{dQ^2} = -6(35) + 144 < 0$$

لکه چې لیدل کېږي، موسسه د $Q = 3$ په تولید سره خپله ګټه حد اقل او د $Q = 35$ په تولید سره خپله ګټه اعظمي حد ته رسولی شي.

وروستی عاید او وروستی لګښت

که د ټول عاید او ټول لګښت تابع مشخصه وي، کولای شو د هغوی څخه په مشتق نیولو سره د نهایي توابعو د محصول د پارامتر نسبت او نهایي لګښت مشخص کړو. که د ټول عاید تابع او د ټول لګښت تابع په لاندې ډول په نظر کې ونیسو.

$$TR = R(Q)$$
$$TC = C(Q)$$

په دې وخت کې د نهایي عاید او نهایي لګښت توابع به په ترتیب سره مساوي شي په:

د نهایي عاید تابع $\rightarrow \frac{dTR}{dQ} = R(Q) = MR$

د نهایي لګښت تابع $\rightarrow \frac{dTC}{dQ} = C(Q) = MC$

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال: د ټولو عوايدو او ټولو لګښتونو توابعو ته په پام سره په لومړي مثال کې په نهايي سره او نهايي لګښت به عبارت وي له:

$$MR = 1000 - 4Q$$
$$MC = 3Q^2 - 48Q + 1315$$

د ګټې د ماکزيمم او مينمم کولو شرطونه

لکه څنګه چې مخکې وليدل شول، د يوه توليد کوونکي له نظره مهمه مسأله دا ده، چې د خپل محصول څومره برخه توليد کړي؛ څو ځان ماکزيمم ته ورسوي، د رياضي له نظره کولای شو د رابطې يا روابطو تر عنوان لاندې د ګټې د ماکزيمم يا منيمم کولو شرطونه بيان کړو.

فرضوو چې د يوه توليدونکي د ټول عايد او ټول لګښت توابع په لاندې ډول وي.

$$TR = R(Q)$$
$$TC = C(Q)$$

په دې حالت کې د ګټې تابع عبارت ده له:

$$\pi = R(Q) - C(Q)$$

لازم شرط د ګټې د ماکزيمم يا منيمم کولو لپاره:

$$\frac{d\pi}{dQ} = 0 \Rightarrow R(Q) - C(Q) = 0$$
$$R(Q) = C(Q)$$
$$MR = MC.....I$$

نو توليدوونکی بايد د خپلې ګټې د مکزيمم لپاره تر هغه وخته توليد ته ادامه ورکړي، چې د هغه وروستي لګښتونه له وروستۍ ګټې سره مساوي شي.

قيمت $P = MR = MC$

لوړ حد ته د رسولو لپاره کافي شرط:

$$\frac{d^2\pi}{dQ} < 0 \Rightarrow R''(Q) - C''(Q) < 0$$
$$R''(Q) < C''(Q)$$

په پورتني نامساوي $R''(Q)$ کې د ننوتلي منحني ميل او $C''(Q)$ د نهايي قيمت د منحني ميل دی.

ميل $MR < MC$

په بل عبارت که کافي شرط د حد اکثر لپاره وي، دا چې د MC منحني ميل د MR منحني له ميل څخه زيات وي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

تمرين: د لاندې توابعو د هر يوه جزوي مشتقات لاسته راوړئ!

$5x_1^3 - 2x_1^2x_2 + 7x_2^2 = y$

$y = 7x_1 + 16x_1x_2^2 + 4x_2^3$

$y = (2x_1 + 3)(x_2 - 2)$

$z = F\left(\frac{x}{y}\right)$

$z = F\left(\frac{y}{z}\right)$

$y = f(x^2 + y^2 + z^2)$

انتيګرالونه

تعريف: د توابعو د عکس عمل مشتق اخيستلو ته د توابعو انتيګرال وايي، په بل عبارت که تابع $y = F(x)$ په نظر کې ونيسو، پوهېږو چې د دې تابع مشتق عبارت دی له:

$y' = f'_{(x)} = f(x)$

په دې صورت کې د $F(x)$ تابع ته اولې تابع د $f(x)$ وايي، لکه څنګه چې ملاحظه کېږي، که $F(x)$ معلوم وي، د انتيګرال په نيولو سره کولای شو $F(x)$ ته ورسېږو، د $f(x)$ انتيګرال د ښودلو لپاره د $\int$ نښې څخه ګټه اخلو.

$\int f(x)dx = F(x)$

په پورتنۍ رابطه کې dx د دې مطلب ښودونکی دی، چې د $f(x)$ تابع څخه د x په نسبت انتيګرال نيول شوی، اوس لاندې دوه رابطې په نظر کې نيسو.

$[F(x)] = f(x)$

$[F(x) + C] = f(x)$

لکه څنګه چې ليدل کېږي د $F(x)$ مشتق له $F(x) + C$ مشتق سره برابر دی، په دې اساس تر C د پورته دواړو توابعو ترمنځ فرق مشخص کوي؛ نو ويلی شو چې د $f(x)$ هره تابع کولای شي بېنهايته اوليه توابع ولري او يوازې هغه عامل د دې باعث کېږي، چې اولي توابع په خپلو کې سره فرق ولري، هماغه د C ثابت مقدار دی؛ نو د انتيګرال اخيستو په وخت کې بايد C ثابت ته په هغه کې ځای ورکړل شي.

$\int f(x)dx = F(x) + C$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د $f(x)dx$ عبارت ته تحت انتیګرال وایي.

د $\int f(x)dx$ انتیګرال ته غیر معین انتیګرال وایي، ځکه چې د عددي معین مقدار لرونکی نه دی.

د انتیګرالونو حل

د $y = f(x)$ تابع په نظر کې نیسو، فرضوو چې دا تابع د $a \le x \le b$ په فاصله کې معینه او پیوسته تابع وي.

لکه څنګه چې د انتیګرال په تعریف کې ورته اشاره وشوه، انتیګرال اخیستل د مشتق نیولو عکس عمل دی او په دې هم پوهېږو، چې مشتق اخیستل له توابعو لاندې رابطو او د خاصو فورمولونو څخه پیدا کېږي. نو په دې اساس دا نتیجه لاسته راځي د توابع د انتیګرال محاسبه هغه وخت ترسره کېږي، چې هغه توابع مشخصې توابع وي، یعنې معلومې وي، چې هغوی د کومو توابعو مشتقات دي، په دې صورت کې له دې پرته د اولې تابع محاسبه امکان نه لري.

مثلاً: د مشتق د لاندې فورمول څخه یو توان لرونکې تابع:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n$$

$$x \neq -1$$

کولای شو دا نتیجه واخلو، چې $\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)$ اصلي تابع (اولیه تابع) ده، د xn تابع مشتق لپاره؛ نو د مشتق د تابع د پېژندلو لپاره، چې څه ډول تابع ده، کولای شو اولیه تابع یا په پام کې نیول شوی تابع انتیګرال محاسبه کړو، د پورته مثال په اړه به یې ولرو.

$$\int x^n \cdot dx = \frac{1}{n+1}x^{n-1} + C$$

$$n \neq -1$$

د انتیګرال اخیستلو مهمه طریقه

د $\int F(x)dx$ متغیر انتیګرال د تغیر طریقه په نظر کې نیسو، فرض کوو چې دا انتیګرال د پېژندل شویو صورتونو جز نه وي، که په دې پېژندل شویو صورتونو کې تبدیلي وکړو، انتیګرال د حل وړ دی او نوموړې طریقې ته د متغیر د تغیر طریقه وایي.

په دې طریقه کې لاندې ټکي په پام کې نیول کېږي او مراعات کېږي:

(c) ketabton.com: The Digital Library

۱- لومړی د x متغیر (یا هر بل متغیر) یا یوه برخه د دې نه د $F(t)$ سره مساوي کوو؛ خو باید دقت وشي، چې $F(t)$ حتماً باید دوه لاندې خاصیته ولري.

الف- $F(x)$ تغیر باید د انټیګرال لپاره یو مناسب متغیر وي، په دې معنی، چې د تغیر د عمل څخه وروسته باید په مشخص شوي انټیګرال بدل شي؛ څو د انټیګرال اخیستو جوګه شي.

ب- د $F(t)$ متغیر تغیر تغیرات باید مجاز وي، یعنې د متغیر x د تغیراتو حوزه باید د $F(t)$ تغیر له میدان سره اړیکه ولري.

۲- باید د تابع دیفرانسیل داسې وي:

$$x = F(t)$$
$$dx = \overline{f}(t) \cdot dt$$

نو د x او dx دوه انټیګرالو پر ځای د هغوی مقادیر ځای پر ځای کوو، یعنې:

$$\int f(x) \cdot dx = \int F(f(t))\overline{f}(t) \cdot dt$$

انټیګرال چې په دې ترتیب لاسته راځي، د t متغیر په اساس وي. اوس که د مناسب متغیر تغیر ټاکل شوی وي، لاسته راغلی انټیګرال به د محاسبې وړ وي.

پس د لاسته راغلي انټیګرال د محاسبې څخه باید د t متغیر پر ځای د هغې مقدار د x په اساس حساب کړو او د انټیګرال په ځواب کې ځای ورکړو.

$$f(t) + C = f(x) + C$$

له هغه ځایه چې په دې طریقه کې د متغیر د تغیر لپاره مناسب دي، په انټیګرالونو کې د خاص اهمیت لرونکي دي، په نتیجه کې په دې ځای کې ځینې د متغیرونو د تغیر څخه د انټیګرالونو د حل د اسانۍ او کومک په خاطر راوړو.

1- که انټیګرال $\int u = F(u)du$ شکل ولري، باید د متغیر تغیر په لاندې شکل وي. $u = F(t)$ یا $u = t$

2- د $\int \sqrt{a^2 - x^2} \cdot dx$ انټیګرال لپاره، باید متغیر ته $x = aSin(t)$ تغیر یا $x = aCos(t)$ ورکړو.

3- که لاندې انټیګرال ولرو، $\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx$ متغیر ته یې باید $x = aTag(t)$ تغیر ورکړو.

4- د لاندې انټیګرال د حل لپاره

$$\int \frac{1}{(a^2 + x^2)n} \cdot dx$$

باید متغیر ته $x = aTag(t)$ تغیر ورکړو.

(c) ketabton.com: The Digital Library

مثال: د لاندې انتیګرال محاسبه مطلوب ده.

$$\int (x^2 - x + 1)^2 (2x - 1) \cdot dx$$

$$u = x^2 - x + 1$$

$$du = (2x - 1)dx$$

$$\int u^2 \cdot du = \frac{1}{3}u^3 + C = \frac{1}{3}(x^2 - x + 1)^3 + C$$

د جزء په جزء طریقه

دا طریقه د دوه توابعو د ډیفرانشیل د حاصل د فورمول په بنا ده، په دې معنی چې د دوه غیر همجنسو توابعو حاصل $g(x), f(x)$ په نظر کې نیسو.

اوس دا انتیګرال په مستقیم ډول امکان پذیر نه دی، د داسې انتیګرالونو د حل لپاره د $\int F(x) \cdot g(x)dx$ روش څخه کار اخیستل کېږي، چې جزء په جزء روش نومېږي.

په دې طریقه کې که $u = g(x), u = f(x)$ په پام کې ونیول شي، د دیفرانیسل د فورمولونو په اساس به ولرو:

$$d(u \cdot v = udv + vdu)$$

اوس د پورته رابطې د دواړو خواوو څخه انتیګرال نیسو.

$$\int d(uv) = \int udv + \int vdu$$

$$uv = \int udv + \int vdu$$

$$\int udv + uv - \int vdu$$

$$\int F(x)g(x)dx = F(x) \cdot g(x) - \int f(x)g(x)dx$$

پورتنۍ رابطې ته جزء په جزء رابطه وایي، د رابطې څخه دا مهمه نتیجه په لاس راځي، چې د دا ډول انتیګرالونو د حل لپاره د تحت انتیګرال عبارت په دوه برخو په پام کې ونیول شي، یوه برخه مساوي له u سره او بله برخه مساوي له dv سره او وروسته له دې څخه فورمول څخه ګټه واخیستل شي.

وروستۍ رابطې ته په کتو، لرو چې:

$$u = f(x)$$

$$dv = g(x) \cdot dx$$

د لومړۍ تابع څخه du او د دویمې رابطې څخه V په لاس راځي.

(c) ketabton.com: The Digital Library

$$du = f(x)dx$$
$$\int dv = \int g(x)\cdot dx \Rightarrow v = \int g(x)\cdot dx$$

د دې لپاره چې څه وخت له دې طریقې څخه ګټه اخیستل کېږي، باید وویل شي دا طریقه عموماً د هغو انټیګرالونو لپاره په کار وړل کېږي، چې د انټیګرال تحت د ضرب د حاصل په شکل وي او یو له هغو عواملو نه یې مشتق دی، چې اولیه تابع یې معلومه وي.

د دې طریقې د کارولو لپاره لاندې ټکي مراعت کړئ!

۱- هر وخت باید کوشش وشي، چې dx د dv په قسمت کې ځای ونیسي.

۲- ورکړل شوی دیفرانیسل باید په دوه عواملو u او dv تقسیم شي.

۳- باید وکولای شو dv انټیګرال کړو.

مثال: د لاندې انټیګرال محاسبه مطلوب ده.

$$\int x\cdot Cosx\cdot dx$$
$$u = x$$
$$dv = Cosx\cdot dx$$
$$du = dx$$
$$v = \int Cosx\cdot dx = \int udv$$
$$\int udv = uv - \int vdu$$
$$= xSinx - Cosx + C$$

ستنډرد انټیګرالونه او د هغو کارونه

په مخکې مثالونو کې مو نوی تغیر، لکه u د تابع د عنوان x پېژندلی او وروسته د انټیګرال اخیستنې فورمولونو نه مو کار واخیست، دا چې دا طریقه ډېر وخت په کار وړل کېږي. ښه به وي چې ځینې د دې فورمولونو څخه په یاد کې وساتو، په دې فورمولونو کې u د مستقل تغیر په توګه تر مستقل متغیر تابع پېښنهاد شوی او du د u دیفرانیسل دی.

(c) ketabton.com: The Digital Library

د اساسي فورمولونو جدول

$$I.\int u^n \cdot du = \frac{u^{n+1}}{n+1} = C, n \neq -1$$

$$II.\int \frac{du}{u} = Lnu + C$$

$$III.\int e^u \cdot du = e^u + C$$

$$IV.\int a^u \cdot du = \frac{a^u}{Lna} + C$$

$$V.\int Cosudu = Sinu + C$$

$$VI.\int Sinudu = -Cosu + C$$

$$VII.\int \frac{du}{Cos^2 u} = Tagu + C$$

$$VIII.\int \frac{du}{Sin^2 u} = -Cotgu + C$$

$$IX.\int \frac{du}{1+u^2} = arcTangu + C$$

$$X.\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = arcSinu + C$$

$$1-\int Cos5x \cdot dx$$

حل: Cos5x مرکب تابعیت ساده تابع ته د بدلولو لپاره، له 5 فورمول نه له کار اخیستو څخه داسې فرض کوو چې:

$$5x = u$$

$$5dx = du \rightarrow dx = \frac{du}{5}$$

$$Cos5x = Cosu$$

$$\int Cos5x \cdot dx = \int Cosu \cdot du = \frac{1}{5}\int Cosu \cdot du = \frac{1}{5} Sinu + C$$

$$2-\int \frac{dx}{Sin^2 3x}$$

حل: د 8 فورمول د کارونې لپاره داسې فرض کوو.

$$3x = u$$

$$3dx = du \Rightarrow dx = \frac{du}{3}$$

$$\int \frac{dx}{Sin^2 3x} = \frac{1}{3}\int \frac{dx}{Sin^2 u} = -\frac{1}{3} Cotu + C = -\frac{1}{3} Cot3x + C$$

(c) ketabton.com: The Digital Library

د مشتق د برخې پوښتنې

1) $5x_1^{\,3} - 2x_1^{\,2} + 7x_2^{\,2} = y$

2) $y = 7x_1 + 16x_1x_2^2 + 4x_2^3$

3) $y = (2x_1 + 3)(x_2 - 2)$

4) $y = \dfrac{2x_1 + 3}{x_2 - 2}$

5) $f(x, y) = (x^2 - 7x)(x - y)$

6) $z = 25xy + y^2 - 3x^2$

7) $z = f\left(\dfrac{x}{y}\right)$

8) $z = f\left(\dfrac{y}{x}\right)$

9) $y = f(x^2 + y^2 + z^2)$

10) $y = f\left(x, \dfrac{x}{y}\right)$

11) $z = 2x^2y^2 + xy + x^3$

د انټیګرالونو د برخې پوښتنې

1) $\int x^3 \cdot dx$

2) $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x}}$

3) $\int (x^4 - 3x^2 + x)dx$

4) $\int \sqrt[3]{x} \cdot dx$

5) $\int \dfrac{dx}{x\sqrt{x}}$

6) $\int \dfrac{(x+2)^2}{x} \cdot dx$

7) $\int (1 - 2x)(1 + 3x) \cdot dx$

8) $\int (nx)^{\frac{1-n}{n}} \cdot dx$

9) $\int Sin^2x \cdot Cosx \cdot dx$

10) $\int \dfrac{x}{x^2 - 1} \cdot dx$

11) $\int e^x \cdot dx$

12) $\int e^{-2x} \cdot dx$

13) $\int Sin2ax \cdot dx$

14) $\int \dfrac{1}{x} dx$

14) $\int \dfrac{dx}{Cos^2x}$

15) $\int \dfrac{dx}{Sin^2x}$

16) $\int \dfrac{dx}{9x^2 - 4}$

17) $\int \dfrac{dx}{x^2 - 9}$

18) $\int \dfrac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}$

19) $\int \dfrac{dx}{\sqrt{9 + x^2}}$

20) $\int 13e^x dx$

21) $\int \dfrac{5}{x^2 + 6} dx$

22) $\int \dfrac{7x^2 \cdot dx}{1 + x^3}$

23) $\int 10x^{-3} \cdot dx$

24) $\int x^2 \cdot e^{ax} \cdot dx$

(c) ketabton.com: The Digital Library

سرچينې او اخيستنې:

۱- تحلیل ریاضیات پوهاند دکتور عبدالغفار کاکر

۲- ریاضیات مهدی صفر

۳- انالیز (یک) پوهندوی داکتر موهین لعل مهرا پوهنمل گل محمد

۴- انالیز (دو) داکتر موهن لعل مهرا پوهنمل گل محمد

۵- ریاضیات پیش دانشگاهی مولف اس - تی - هو

(c) ketabton.com: The Digital Library

د ښوونيز نصاب د پراختيا د رياست پيغام

د پوهنې وزارت د تخنيکي او مسلکي زده کړو معينيت دښوونيز نصاب د انکشاف رياست د ټولنې دعيني او ښکاره ضرورت په درک کولو سره چې د محصلينو او شاګردانو د درسي کتابونو په برخه کې يې تخنيکي او مسلکي رشتې درلودې او لري يې، په لومړي سرکې يې تصميم ونيو، چې په ښوونيزو پلانونو او درسي مفرداتو باندې بياکتنه وکړي او ورپسې بيا د شاګردانو او محصلينو د درسي کتابونو د تاليف لپاره مبادرت او کوښښ وکړي. د خدای(ج) په فضل او مرحمت سره او د ادارې او حسابداری ځانګې د ښوونکو په ميړانې او همت سره د ادارې او حسابداری درسي کتابونه تاليف شول تر څو په وړيا ډول د شاګردانو او محصلينو په واک او اختيار کې ورکړل شي.

د علم او معرفت له ټولو لوستونکو، علاقمندانو، د ادارې او حسابداری د مکاتبو له ښوونکو، ګرانو شاګردانو او د تخنيکي او مسلکي زده کړو د چارو له متخصصينو او همدا شان له ټولو څېړونکو او شنونکو څخه صميمانه هيله کيږي، چې د دې کتابونو په مطالعې سره چې په لومړي ځل د ښوونکو او د ادارې او حسابداری ځانګې د مسلکي غړو له لوري تاليف او تدوين شوي دي. د مسلکي، تخنيکي او علمي مطالبو او مفاهيمو د څرګندوالي په هکله خصوصاً د هغوی املايي او انشايي اشتباهاتو په اړهمونږ ته لارښوونه وکړي، ترڅو په راتلونکي کې وکړای شو، په همدې او نورو برخوکې ګرانو شاګردانو ته له دې څخه ښه، غوره، ګټور او ارزښتناکه موضوعات وړاندې کړو.

همدا شان له ګرانو شاګردانو او محصلينو څخه هيله کوو ترڅو د دې کتابونو د مطالعې او استفادې پر مهال د هيواد اقتصادي ستونزې، فقر او وروسته پاتې والی په نظرکې ونيسي او د کتابونو په ساتنه کې کوښښ او زيار وباسي، ترڅو د ډېرو شاګردانو او محصلينو د ګټې وړ وګرځي.

پته: دپوهنې وزارت – دتخنيکي او مسلکي زده کړو معينيت د تعليمي نصاب د انکشاف رياست – دکتابونو د تاليف او د درسي ممدو موادو د برابرولو عمومي مديريت.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library